

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



S114 Soc. 1996 d. 234 J. Room.

•

•

• -

# A T T I DELLA REALE ACCADEMIA

. • 

# A T T I

# DELLA REALE ACCADEMIA

DELLE SCIENZE E BELLE-LETTERE

# DINAPOLI

DALLA FONDAZIONE SINO ALL'ANNO MDGGLXXXVII.





IN NAPOLI) ( MDCCLXXXVIII.

PRESSO DONATO GAMPO STAMPATORE DELLA REALE ACCADEMIA, Multum adhuc restat operis, multumque restabit, nec ulli nato post mille saccula praecludetur occasio aliquid adhuc adjiciendi.

Seneca Epift, LXIV.



# ALLA MAESTA DI FERDINANDO IV.

RE DELLE SICILIE, DI GERUSALEMME &c.

# ANTONIO PIGNATELLI PRESIDENTE DELLA R. A.

DELLE SCIENZE E BELLE LETTERE.

SIGNOR, E.

E le scienze dalle amene lettere abbellite purificano i

costumi, ingentiliscono le maniere e rendono le nazioni illustri e siorenti; se propagasi per esse

l'amor del giusto e dell'onesto e si scema la somma degli errori e dei delitti, sia perchè ne somministrano avvisi e precetti salutari, sia perchè per loro mezzo l'energia delle passioni dirigesi alla tranquilla investigazione del vero; dell'ordine amica e della giustizia sida compagna; se ciò, dico, è l'opera grande e'l primo oggetto del sapere, tutto, S. R. M., tutto all'augusto vostro Genio si ascriva il vanto di questa a gran passi già sorgente virtù, coltura e selicità delle Sicilie.

Tra tante utili e gloriose novità, voleste, o SIRE, nella stessa nobil sede, onde con aureo freno i vostri dominj moderate, con una Reale Accademia di scienze e belle lettere ergere un tempio dedicato al migliosamento e alla selicità dei popoli. La bell'opera è incominciata, e la vostra Accademia sinora cheta e modesta, fralle ombre quasi a somiglianza delle provvide sormiche lavorando, ha cercato secondar le alte mire d tanto eccelso FONDATORE. Ma perchè aver potrebbe ormai sembianza d'indolenza un più lungo circos petto silenzio, colti al sine dal tenue suo campo comunque lavorato alcuni pochi dei

men volgari fiori, viene a spargerli a piè del TRONO, sperando che le primizie in questo volume raccolte e per mia mano rispettosamente umiliate alla M. V. in omaggio, abbiano a meritare benigni sguardi e paterno compatimento dal suo SOVRANO.

Accoglietele, GRAN RE, coll'innata vostra clemenza, come novello frutto di un albero piantato e vivisicato dallo stesso vostro Gento Reale, e degnate infonderli nuovo vigore, perchè possa indi, a vantaggio de' popoli ed a gloria vostra, più lieti più ridenti più secondi spandere intorno sempre verdi e robusti i suoi ramì.

--



# DISCORSO ISTORICO

# PRELIMINARE

D I

PIETRO NAPOLI-SIGNORELLI.

Lancesque, & liba feremus. Virg. Georg.



ON sono i secoli secondi delle più suneste vicissitudini e della successiva distruzione de' regni e degl'imperi quelli che contengono la più durevole, la più degna e la più vantaggiosa storia dell'uomo e delle nazioni. Un tremuoto che adegui i monti, che apra ampie voragini, che saccia sparire un

gran siume, che di vasti laghi ricopra improvvisamentele culte campagne: un'isola ovvero un vulcano che sorga e siumi di repente, o di repente sparisca e si estingua: una peste desolatrice che scorra imperiosa per le intere provincie e le converta in sepoleri: una straordinaria alluvione 5

che allaghi e dissolva le città, non producono meno terribili effetti di una sterminatrice irruzione di barbari foldati che le incenerisca e le spopoli, per ergere di tante ruine un folio ad un ambizioso sopra più milioni di schiavi. o ad un popolo intraprendente sopra cento altri popoli più cauti e meno ingiusti e de' patrii confini e della propria mediocrità soddisfatti. E gl'insoliti senomeni e le marziali incursioni cangiansi al fine ugualmente in un romor vano che passando s'infievolisce e si dilegua; perchè l'orrore che apportano quelle ruine e quelle stragi, ne rendono increscevole e dolorosa la rimembranza, e lo sforzo continuato che si fa per dimenticarle, ne va cancellando la tetra immagine. De' mali cagionati da tanti popoli-conquistatori alla lor volta conquistati che mai più rimane? Un'amara memoria di orridi sovvertimenti, i quali tutti si rassomigliano e tutti vanno a piombare nel vuoto immenso dell' obblivione. Svolgansi le più samose storie de' regni scompigliati e distrutti, osservinsi gli annali Cinesi, Indiani, Affricani, Europei, non meno che le memorie degli abbattuti imperi di Motezuma e di Atabualpa, di grazia da rivoluzioni sì grandi qual messe si raccoglie onde a ragione la storia possa chiamarii specchio e maestra della vita da chi, in vece di caricar la memoria di sterili fatti, si studia d'investigar negli eventi la grandezza della mente umana? Malgrado della diversità de' costumi e delle contrade, da Spitzberg al Capo d'Horn e da Pekin a Lima, ne risulta un racconto sommamente uniforme di battaglie, di assedii, di rassegne, di marce, di sorprese, di aguati, di ritirate, di rotte, di vittorie, le cui circostanze vanno l'una dopo l'altra spegnendosi insensibilmente, finchè quasi tutte rimangano avvolte nel densissimo velo che su vi distende il tempo vorace, rendendone indifferenti fin anco le atrocità. Si accumulano in tal guisa epoche sopra epoche, regni sopra regni; un evenimento divora la memoria dell'altro, di niuno rimanendo distinta traccia, e i posteri appena ne ritengono queste grandi

conseguenze: Ashri, Medi, Persi, Parti, Macedoni, Egiz j, Romani, surono, regnarono, e in sine strascinarono le cate ne del più sorte. Anzi a tal segno (sorza de'secoli, e necessario sato delle sinite cose!) a tal segno, dico, se ne illanguidì cogli anni ogni memoria, che di qualche antichissima monarchia da alcuno si è posta in dubbio pur anche l'esistenza.

Molti nomi non pertanto per lungo spazio sorvolano intorno all'abisso del nulla, sebbene non ugualmente circostanziate arrivano al tardo mondo le gesta di chi portolli. Nino, Semirami, Tomiri, Cambise, Attila, Bajazzette, Gengiscan, Maometto II, Tamas Koulican, ed altri barbari. conquistatori, i quali preceduti dalla fame, dal fu**oco, dalla** morte, distesero il loro scettro su tanta estensione della terra attonita, lasciarono alla perfine di se la stessa atroce idea di pubblica calamità dei popoli e dove nacquero e dove portarono la guerra. Se con minor ribrezzo ci rammentiamo dei Ciri e degli Alessandri, ciò addiviene, perchè, se debbesi fede agl'istorici, al vanto di semplici conquistatori essi congiunsero una più giusta gloria derivata da qualche benefica. virtù che possederono, per cui diedero nome ed onore alle loro età, e felicitarono i loro soggetti. Ciro non fu un Ezzelino, Alessadro non su un Tamerlano. Come invasori ingiusti degli altrui stati essi ugualmente rassomigliaronsi ai pubblici disastri più spaventevoli, alle siere più ingorde di sangue: come beneficenti eroi, che seppero talora di alcuno dei rapiti regni spogliarsi per tributarlo alla virtù sconosciuta o sventurata, e che solleciti del bene pubblico ristabilirono nei paesi la cultura e la tranquillità, ne disvilupparono gl'ingegni, ne migliorarono i costumi, ne ingentilirono le maniere, essi per questo solo acquistarono l'alto diritto di passare alla posterità con note caratteristiche assai diverse dagli altri usurpatori distinti col titolo di flagelli dell'umanità.

Ogni età quasi del pari abbonda di grandi uomini, di gran fatti e di novità grandi avvenute nella superficie stessa del nostro globo; e non pertanto la maggior parte dei secoli

e si consonde con gli altri, o si dimentica a segno, che nei più ben combinati sistemi di cronologia il divario di qualche secolo si disprezza come di niun momento. L'uomo non s'interessa da buon senno negli andati eventi, se non quando ne vede i rapporti con quelli che lo riguardano; il rimanente è serbato ad una quasi inutile curiosicà. Quindi è che risalendo intorno a quaranta secoli indietro, gli uomini si sono avvezzati a non rammentar col più gran rispetto e trasporto di piacere e di gratitudine se non pochissimi bei secoli, i quali segnano più luminosamente i gran passi dell'ingegno umano, e alla posterità servono di sida scorta

e di esempio.

La Grecia madre delle arti e del sapere e maestra <del>del re</del>sto della terra involta nella barbarie, la Grecia produttrice in molte età di politici, di capitani, e di preclari pensatori non isplendette di tutto il suo gran lume, se non in quel periodo in cui vissero Pericle, Filippo ed Alessandro. Intorno a quel tempo appunto il Liceo ed il Peripato popolaronla de' maggiori investigatori della natura. mentre nel Pritaneo di Atene tuonava Demostene, nel-Teatro la commoveano Sofocle ed Euripide, e i di lei Tempii ornavansi co' prodigi del pennello degli Zeusi, dei Parrafii, de' Timanti e degli Apelli, e co' marmi e bronzi. animati dallo scalpello de'Mironi e de' Fidii e de' Prassitelie de' Policleti. I gran conquistatori Macedoni più che per li Triballi, i Tessali e i Molossi soggiogati, e per Dario e Poro disfatti, forse oggi nomansi più sovente, perchèservono a fissar l'epoca felice del miglior tempo della Grecia, in cui fiorirono tra gli antichi i più gran maestri dell'umanità Socrate, Platone, Senosonte, e i più curiosi. indagatori di buona parte della storia naturale Aristotile e Teofrasto, e gli astronomi, dopo Talete, Anassimandro ed Anassagora, i più insigni Pitea di Marsiglia ed Eudosso discepolo di Platone e degli Egizii.

### PRELIMINARE.

L'onor del secondo secolo luminoso, dopo molti ravvolti nelle tenebre, appartiene all'antica Italia. La posterità dà un'occhiata palleggiera ai trionfi de' Romani sul rimanente della guerriera Italia, e non si arresta gran satto sulle guerre Puniche, finchè, passando a traverso degli orrori della Dittatura di Silla, e de' Consolati di Mario, e del più tremendo Triumvirato, non giunga all' età di Augusto. Ad onta delle atroci prescrizioni e del tollerato scempio dell'Arpinate Cicerone che fu il luminare de'Rostri Romani. l'età di Augusto sortì l'invidiabil titolo di aurea e il di lui nome serve anco a' nostri giòrni di fregio a' migliori Principi. E perchè mai? Forse perchè la battaglia di Azio e la fuga di Cleopatra a lui concesse l'impero del mondo? No; che l'onor dell'alloro ebbe egli comune con tanti indegni suoi successori. Egli dovette alla fortuna un favore di gran lunga più fingolare; nacque circondato da uno stuolo immortale d'ingegni rari. Varrone, Lucrezio, Cicerone, Vitruvio, Cesare, Orazio, Virgilio (quai nomi!) Varo, Ovidio, Tito-Livio, i Greci Strabone e Diodoro Siculo, e non moltissimo lontano da sì chiaro periodo Plinio Secondo il primo tra' Latini a investigare gli arcani della storia naturale, e a moltiplicarne la scienza col pensare e vedere in grande, e che in fine su la vittima della propria filosofica curiofità, istruivano, dilettavano, incantavano il mondo ammiratore.

Sussegui una folia di secoli, che potremmo contentarci di chiamar soltanto ignobili, se più sunesta idea non ne rendesse detestabile la rimembranza. Mentre essi rapidamente volavano verso l'obblio, cadde il Romano impero, e la stessa cultissima Italia, preda de' barbari, tutta di barbarie e di squallore si ricoperse. Cassiodoro Senatore sì nel Ministero de' Goti Re che tra' suoi Monaci Vivariensi, Almamon Caliso di Babilonia ed altri Principi Arabi in Oriente, Carlo Magno nell'impero di Occidente, Alfredo in Inghilterra, Alsonso X nelle Spagne, gli Ottoni nella

Germania, lo stesso grande Imperadore Federigo II dalla Sicilia, non secero altro che gettar, come i sossori nelle tenebre, qualche scintilla passeggiera più atta a palesar tutto

l'orrore che a dissiparlo.

Il primo crepuscolo più permanente per gran ventura apparve in Napoli sotto il Napoletano Re Roberto della Real Casa Angioina. La teologia, l'astronomia, la sissica, la medicina, benchè di Arabe spoglie ricoperta ( dopo i lumi sparsi per l'Europa da Alberto Magno, da Pietro Lombardo, da Tommaso di Aquino, da Ruggiero Bacone e da qualche altro) coltivavanfi a di lui esempio nella Reggia Napoletana. Egli vi richiamava la razionale e la moral filosofia, mentre fotto la di lui ombra i Greci di Calabria Basiliani conservavano in varie nostre provincie le reliquie della Greca letteratura. Al di lui tempo il famoso Greco Calabro Barlaamo combatteva col dottissimo Nicesoro Gregora e co' Monaci del Monte Ato, ed insegnava le belle lettere e la teologia in Costantinopoli, componeva sei libri di aritmetica, dimostrava numericamente alcune proposizioni di Euclide, faceva conoscere la Greca erudizione a Paolo da Perugia Bibliotecario del Re Roberto. al Principe de' Lirici Toscani Francesco Petrarca, e al Calabrese Leonzio Pilato traduttore di Omero, maestro di Giovanni Boccaccio e cattedratico in Firenze, la qual città già pregiavasi di Dante Alighieri teologo e silososo poeta. che pure essa avea perseguitato e discacciato vivendo. Allora cominciarono a prender forma le arti; surse in Masuccio II il Buonarroti Napoletano e il ristauratore della Greca architettura, e mentre da Giotto oscuravasi Cimabue nella Toscana, degno contemporaneo di Giotto mostravasi in Napoli il pittore Simone. Allora la fama dell'alto sapere di Roberto indusse il Petrarca a presceglierlo come il più dotto de' tempi suoi, assoggettandosi al di lui esame, per vedere se egli meritasse di cingersi come poeta il lauro imperiale colà dove altra volta trionfarono delle schiave nazioni Scipione, Pompeo, Giulio Cesare.

Dopo un sì bel crepuscolo sopravvenne a gran passi quella ridente aurora che vie più nell'Italico cielo, e singolarmente in queste dilettose spiagge del Cratere, diradò le tenebre, correndo quel notabile periodo incominciato da che il I Alsonso di Aragona alle native corone delle Spagne e della Sicilia congiunse il real retaggio della II Giovanna Durazzesca; e terminato poichè la tiara passò dal capo di Leone X al successore.

Parve allora che l'Europa si destasse da un lungo sonno. Volse attonita lo sguardo all'antica Grecia ed al Lazio. mirò poi se stessa e vergognossi. Vedere il bello, invaghirsene, e agognare a possederlo, sono conseguenze necessarie della curiosità inerente alla natura umana. Basta eccitarla, e basta dirigerla; e ciò secesi acconciamente nell'epoca che additiamo. Francesco Filelso da Tolentino, il Siciliano Aurispa, il Veronese Guarino, il Pontesice Niccolò V, Ambrogio Camaldolese, il Panormita Antonio Beccadelli, e tanti altri, qual con sudori immensi, qual con dispendiosi viaggi e pericolose navigazioni, osarono disotterrare tanti preziosi codici Greci, e trasportarli a guisa di penati in patria meno sconvolta, involandogli alla barbarie de' Musulmani' teroci posseditori della Grecia già schiava e degenere. Da allora in poi l'Italia coltivò un Aristotelismo più puro, e sulle di lei tracce prese poscia dapertutto a studiarsi Aristotile Greco e non Arabo, e la dottrina dell'Accademia. I Greci traspiantati nelle contrade Latine divisi tra i due gran corifei della filosofia combatterono acremente, segnalandosi tra essi Teodoro Gaza e Giorgio da Trabisonda a favor dello Stagirita, e Giorgio Gemisto col Cardinal Bessarione di lui gran discepolo per Platone. Fiorì perciò (oltre all'Accademia del lodato Cardinale in Roma) la Platonica Fiorentina fingolarmente per opera di Marsilio Ficino, e del più prodigioso ingegno Giovanni Pico Conte della Mirandola, i quali ne furono l'anima, il fostegno e l'ornamento.

٠

Erano allora gl'Italiani col resto degli Europei ben lungi da quella occhiuta filosofia che nell'investigazione delle opere della natura lascia soltanto guidarsi dalla maestra esperienza e dalla sagace offervazione; la machinaria non le forniva prefidii sufficienti; il calcolo segnava appena orme infantili. A stento da Leonardo da Pisa e da Paolo dall'Abaco in poi fino a Luca Pacioli si scioglievano l'equazioni di primo e secondo grado, nè ancora Niccolò Tartaglia avea mostrato a Girolamo Cardano il metodo di risolvere quelle del terzo grado. Tutto guidava l'amor di sistema, tutto decideva la tiranna autorità. Vuolsi additare come miracolo che a quella età non solo Giambatista da Cipua professore d'astronomia in Padova comentasse le opere di Giovanni Allifax detto di Sacrobo'co, e del Peurbach, e Pontino osservasse diligentemente il cielo, e Mariano Bitontino illustrasse con comenti i libri di Euclide, e Paolo Toscanelli innalzasse in Firenze la prima meridiana; ma che il celebre Galateo fi occupate a descrivere elegantemente la Fata. Morgana de' lidi Calabresi, delineasse alcune cosmografiche tavole, e sostenesse tra'primi la possibilità della navigazione alle Indie Orientali; come altresì che il Calabrese Girolamo Tagliavia e il Ferrarese Domenico Maria Novara avessero con tali progressi otservati gli attri; che del primo corse fama di avere co' suoi scritti prevenuto Niccolò Copernico nel rinnovellare il sistema di Filolao circa l'immobilità del fole e la periodica rivoluzione della terra intorno ad esso, e del secondo si sà che ebbe a discepolo e testimonio e focio delle offeryazioni astronomiche lo stesso lodato astronomo Prussiano. E miracolo su ancor maggiore, e tale da non rinvenirsene in tutta la serie delle andate età l'uguale, che il rislettere con iscorgimento e profondità fulla figura della terra colla scorta della scienza attronomica che possedeva, bastaile ad eccitare nel Ligure Colombo quella ragionara penetrante curiosità e quella savia prodigiosa siducia di trovar nuove terre oltre l'Oceano, e di dirigervisi con

fermezza dalle Canarie per ponente sotto il medesimo parallelo senza sidarsi della bussola, ed osservando, per non ismarrir la direzione, di giorno il sole e di notte le stelle sisse, e passò alle Lucaje, all'Ispaniola, a Cuba, a San Domenico, ed arricchì la monarchia Spagnuola di un nuovo mondo, ed insegnò a correre sulle di lui vestigia per mari interminabili non mai più toccati agl'Italiani Vespucci, Verazzani e Cabotti, oltre a Cortes, a Pizzarro, ad Ovieda, ad Almagro, a Magellano, e a tanti venturieri delle Spagne, e ad altri dell'Inghilterra e dell'Olanda e della Francia.

Passi fur questi ben atti a rendere quest'epoca al pari di ogni altra cospicua e gloriosa; ma lo studio principale si ripose generalmente nel bene intendere e illustrare i dettati degli antichi. Altri sforzi atlai più gagliardi ed erculei rimasero a farsi dalla posterità prima di osservare, combinare e generalizzare i fatti, e legarli per l'analogia, e dedurne i grandi effetti generali, coi quali si perviene a paragonar la natura colla natura nelle sue grandi operazioni. Altro sudore versar doveasi prima di rinvenire la geometria dell'infinito, la teoria delle forze centrali e le vere leggi del moto; prima di fondarsi una sissica tutta sperimentale; di sceverar dalla vera chimica i delirii della grand' opera; di spogliar l'astronomia delle vanità giudiziarie o divinatorie, già delizie e speranze de' secoli precedenti, dalle quali nè anche seppe guardarsi il nostro astronomo e matematico Luca Gaurico; prima in fine di vendicar le comete del torto loro fatto in crederle meteore passeggiere e fatali, o al più tante macchie scappate dal globo solare, come parvero anche nel XVII secolo al famoso matematico Andrea Tacquet. comprenderne la solidità non dissomigliante da quella dei pianeti, e per seguirsene le immense eccentriche ellissi, doveano alle precedenti scoperte delle comete fatte dal Regiomontano, da Pietro Appiano e dall'infigne ristauratore dell'astronomia Ticone Brahe, accoppiarsi le osservazioni e i calcoli de' Kepleri, de' Cassini, de' Flamstèed, degli

Nel gran periodo enunciato si attese unicamente a rendere la scienza amabile. L'insipida selvaggia ruvidezza delle Arabe scuole sece allora di se compassionevole spettacolo là dove leggevasi originalmente il leggiadro, l'ameno, l'eloquentissimo Platone. Nell'ammirarsi con una specie di religione le orme divine de' Tullii, de' Virgilii, degli Orazii, venne a stringersi di bel nuovo quel natural legame delle arti e delle scienze solo idoneo a dissipar la densa caligine dell'ignoranza e a ristabilire il culto della sapienza. Abbellita di erudizione e di eleganza videsi questa tutta leggiadra e maestosa collocata su di un augusto splendido seggio. Dall' Accademia Romana del Leto Calabrese e dalla Napoletana del Beccadelli Palermitano, viepiù promossa e nobilitata dal dottissimo Pontano, nelle quali novelli Virgilii, Tullii e Catulli risplendevano nel Sannazzaro, nel Bembo e nel lodato Pontano, emanava come da vivido centro di fuoco un torrente di vaga e pura luce raccolta da' Greci e Latini esemplari, che tutta quanta illustrando l'Italia diffondevasi oltramonti, e quivi, benchè rissessa in mille guise, rapiva coll'insolita vaghezza, e di vivisico tepore riscaldava e secondava i cuori degli esteri, e spingevali giù dalle Alpi ad appressarsi alla sorgente.

Fra tali albori dell'amena letteratura ognora memorabili e cari per l'eleganza risorta coll'erudizione, apparve nel corso del XVI secolo pieno e adulto il giorno del sapere,

io dico il tempo, in cui gl'ingegni conscii delle proprie forze doveano avvedersi della vera maniera di studiar la natura indipendentemente dall'autorità. Niuno ignora che Pitagora, l'antico maestro della Magna Grecia, comandava a' fuoi discepoli un rigoroso silenzio di due o di cinque anni giusta la maggiore o minor disposizione che in essi scorgeva a ben ragionare. In tal tempo essi ascoltavano foltanto ed arricchivanfi dei di lui insegnamenti, e quando cominciavano a parlare, altro per lungo spazio non prosferivano che il semplice motto, Egli l'ha detto. Questo corso dell' Italica Scuola è quello appunto che fanno generalmente le nazioni e quando emergono dalla prima barbarie, e quando risorgono dalle altre posteriori. La sorgente della scienza è posta nella maravigliosa struttura del nostro corpo. tutti i nostri sensi venendo inevitabilmente scossi dagli oggetti esteriori che ne circondano. Colla continua possente azione di questi oggetti innumerabili sorge nell'uomo fanciullo una moltiplicità incredibile di sensazioni, ond'è posto in gran fermento il natural pendio che lo porta ad istruirsi. Nel disvilupparsi gli organi della voce impara appena a mandarla fuori articolata, che incominciano le fanciullesche sue richieste. e per conseguenza la sua scienza. La mente si arricchisce d'idee a misura delle sensazioni che di suori riceve; la prima è seguita da un'altra, nè questa nè le seguenti sono le ultime, finchè non cessiamo di esistere: nella guisa che un peso lasciato cadere perpendicolarmente in un lago tutto in cerchi concentrici successivamente lo converte. Vedere. notare, e implorare l'opera altrui per intendere, sono le prime conseguenze del commercio dello spirito umano che spazia per le forme esterne. Chi prima osservò, diviene la nostra scorta e l'oracolo della natura: chi meglio intende allora i responsi di questo primo oracolo, sembra il più dotto: e questo è il regno dell'autorità, che passa di mano in mano, finchè non giunga il meriggio del fapere, cioè finchè non il apprenda l'arte d'interrogare la fola natura.

Compresa però una volta la mente di quel primo oracolo; sopravviene il pensiero di ripetere le osservazioni, scorgonsi le discordanze tralle cose e i dettati magistrali, comincia un saggio dubitare, e si osserva in seguito con indipendenza. Quindi sorge l'amore e il bisogno di filosofar con libertà. Or questo su lo stato degl' Italiani nel secolo decimosesto.

Terminò allora il Pitagorico filenzio e nelle contese non più come prima o ben di rado equivalse ad una ragione quel rispettoso ma infingardo, egli il disse, e l'adito della rupe ove avvinta giaceva la filosofica libertà, finalmente si dischiuse. Osserviamo con qualche compiacenza ciò che affermasi concordemente in Italia ed oltramonti, che il primo onore di frangerne le catene toccò in sorte agli abitatori delle provincie di questo Regno. Niuno prima del Cosentino Bernardino Telesso osò dipartirsi o da Aristotile o da Platone. Strinse egli ed incalzò vittoriosamente il primo senza arrollarsi sotto le bandiere dell'altro. Nella dottrina del nostro antico compatriotto Parmenide trovando analogia maggiore colle proprie idee, ne formò con eroico ardire un misto ingegnoso ne' dotti ed eleganti suoi nove libri della Natura giusta i suoi principii, ne' quali traspare qualche immagine della forza d'inerzia e della motrice e dell'attrazione e della ripulfione. E febbene non avesse con piena felicità edificato, siccome avea distrutto il sistema sifico Aristotelico, pure il glorioso sforzo meritò alti encomii da Bacone da Verulamio, e potè egli contar tra' suoi samosi lodatori e seguaci il dotto Francesco Patrizio, il di lui concittadino Sertorio Quattromani, e Tommaso Campanella di Stilo, il quale diè in tal secolo ancora precoci frutti di sommo ingegno, di vastissima dottrina, di gusto e di erudizione e dell'amore che portava agli esperimenti e alle osservazioni e alla libertà filosofica. Debbesi ancora al Telesio il primo esempio di un' Accademia scientifica senza esere Platonica nè Peripatetica. Cosenza mercè di lui coll'Accademia detta Cosentina e Telesiana, era allora quello che un secolo dopo

fu dentro e fuori delle Alpi Firenze con quella del Cimento. Libero, grande, e vivace ingegno, fervida immaginazione, alto dispregio del Peripato, ardir soverchio e rea indifferenza per la Religione, sorti il Nolano Giordano Bruno, ed abusando della libertà passò dalla filosofia all'empietà e ai deliri. Con tutto ciò non può negarsi di aver egli in diversi placiti preceduto non pochi sublimi ingegni, come nell'asserire la pluralità dei mondi (argomento poscia trattato coll'usata vaghezza e leggiadria da Bernardo le Bovier de Fontenelle), i vortici Cartesiani, la figura quasi sferica della terra, l'immobilità del fole, le comete simili a' pianeti. le monadi Leibniziane. Giambatista della Porta illustre autore della Magia Naturale e fondatore in Napoli della utilissima Accademia scientifica dei Segreti, su senza contrasto il maggiore e forse il primo vero fisico sperimentale di questo secolo. Filosofò colle idee Peripatetiche, ma senza giurar sempre nelle parole di Aristotile. I suoi sperimenti spianarono agl' ingegni il sentiero per sorprendere la natura, la quale nel celarfi graziosamente si compiace di esser veduta. Fece egli i primi felici passi per la combinazione de' vetri concavi e convessi del telescopio che dovea poscia da una parte per mezzo del nostro Fontana, dall'altra per opera del gran Galilei incamminarsi alla possibile persezione, che attendeva al fine dal Newton e dal Gregory e dagli ultimi Ingless. Innoltrossi parimente con rara gloria nei più curiosi fenomeni dell'ottica, e dichiarò le leggi della refrazione della luce che per la densità o rarità del mezzo si avvicina al perpendicolo o se ne scosta, e quello della riflessione negli specchi concavi, ed esaminò prima di ogni altro l'iride e i colori offervando co' primi le varie refrazioni de' raggi. E nell'ottica e nelle matematiche da lui pur coltivate ebbe emuli o seguaci il Maurolico ed il Fracastoro. Il Cardano, il Tartaglia, il Bombelli, il Vieta avanzarono · i progressi dell'algebra. Luigi Lilio riformò con prodigiosa felicità il calendario. Claudio gli tenne dietro e perfezionò

il suo piano, e coltivò degnamente col Comandini l'astronomia. Il Colonna e l'Aldrovandi illustrarono la botanica e tante parti del vastissimo studio della storia naturale. L'Ingrassia, l'Eustachio, il Vesalio, il Fallopio surono nell'anatomia ciocchè il Colombo ed il Vespucci nel Nuovo Mondo sino ad essi sconosciuto. L'Acquapendente aprì il sentiero per istabilire la circolazione del sangue, che indi nel seguente secolo pretese il P. Onorato Fabri di aver dimostrata nel trattato De Homine, indipendentemente dall'Inglese Guglielmo Harvey, il quale per aversa con particolare evidenza disviluppata, dopo che ebbe ascoltate le lezioni del lodato Acquapendente, tutte a se trasse le palme anticipatamente raccolte sin Italia.

Tardò però la pura luce a rischiarare pienamente l'Europa, perchè la vana filosofia pugnava ancora ed impediva che si diffondesse in tutti i sensi l'amor dell'osservazione e dell'esperienza. Ed ora nelle Spagne resisteva al giorno l'Aristotelismo scolastico protetto dalle dotte fatiche del Vasquio, del Covarruvia, del Mendoza, del Rubio ed anche del Caramuele: ora nelle scuole Germaniche sorgeva il Pitagorismo Caballistico dello Svevo Reuclino, che prese il nome di Capnione: ora in Italia il Frate Veneziano Francesco Giorgio consumavasi nelle fole di Zoroastro e di Ermete: ora il fincretismo o si perdeva a conciliare Aristotile e Platone (come fece nella sua Sinfonia il Francese Camperio) ed anche le novità di Pietro Ramo coll'Aristotelismo di Filippo Melantone, o vaneggiava nella Panteonosia ed altri libri del Normanno Guglielmo Postello. Sventuratamente sissatti sogni e trascorsi non surono rari. In simil guisa nei più bei di di primavera levansi oscuri nembi a intorbidarne il sereno.

Mirabil cosa parrà non per tanto in questo secolo XVI, che mentre la vera filosofia incontrava in più di un luogo ombre ed ostacoli da sormentare, le belle arti felicemente elevavansi al colmo della persezione. Cantavano con

## PRELIMINARE. XV

indicibil leggiadria ed eleganza il Vida e il Fracastoro nell'antico grandioso linguaggio del Lazio: aspiravano in quello della moderna Italia Ariosto ad appressarsi allo stesso Ômero per ingegno, per fantasia e per poetica felicità nel descrivere tutta la natura, e'l gran Torquato a degnamente dar fiato all'eroica maestosa tromba Virgiliana. Parlava con inimitabile espressione agli occhi ed al cuore Raffiello. rappresentava tutte le grazie il Correggio, e tutta la vivacità incantatrice della natura Tiziano, fcolpiva all' eternità Michelangelo. Ma non è da stupirne. Per eccitare l'idea del Bello e per fecondar la fantassa delle vaghe forme che rendono immortali le cetre, i pennelli, gli scarpelli e le squadre, bastò allora la lettura e l'emulazione degli antichi esemplari Greci e Latini. Ma per impadronirsi del vero che si occulta ne' penetrali più arcani della natura, e per tenerlo saldamente, non bastarono que pochi benchè magnanimi sforzi fatti contro l'autorità che da effo allontana le menti pigre o ritrose. Quanto vi volle per preparare la venuta del Galilei!

Ma venne al fine con questo moderno Archimede l'epoca felice, in cui cedettero le parole alle cose, le opinioni all'evidenze, l'autorità alla voce della natura. L'uomo da' fatti indotto a dubitare, per mezzo di una piena induzione procura di salire agli universali, ma commette all'esperienza guardinga il verificare ad ogni-passo la verità fondamentale che ne risulta. A questo punto lo chiama la fapienza, a questo punto solo l'attende un puro esplendente meriggio. Nè combattè vanamente gli antichi, nè pugnò per esti, nè immagino novelli sistemi il gran Galilei. Tento, offervò, calcolò a parte a parte, e più amico de' progressi delle scienze che della propria gloria particolare, non ambi di distruggere per edificar di nuovo a suo modo, ma fi contentò di preparare faldi materiali e fidi stromenti ai costruttori più arditi che lo seguirono. Laborioso investigatore de' segreti naturali osò spaziarsi con libero piede per un sentiero sconosciuto e non prima da umane vestigia calcato, che dal famoso Cancelliere Bacone appena veniva, benchè lodevolmente, additato alla Gran Brettagna. Egli fu l'inventore della scienza tutta nuova della Resistenza de' corpi solidi, di quella delle Vibrazioni e della dottrina dell' Accelerazione del moto nella caduta de' gravi. fi armò se non dell'unico a' suoi dì, almeno del più fortunato e ben maneggiato telescopio diottrico. Discoprì prima di ogni altro le macchie solari (1), i satelliti di Giove, le fasi di Venere, le stelle della via lattea. Fu egli anche il maestro glorioso del Castelli che su il primo legislatore dell'idrostatica e dell'idraulica, e di altri insigni discepoli, e del Viviani maraviglioso indovinatore del libro de' Massimi, e de' Minimi di Apollonio, e finalmente del Torricelli che fece la famosa scoperta della cagione della sospensione de'liquidi ne' tubi, spiegandola per la pressione dell'aria, copiosa sorgente quasi di una novella Fisica.

In questo gran periodo, in cui a trionsar compiutamente del gergo cospirò l'analisi e la sintesi, risulse ancora il Cavalieri che trovò la geometria degl' Indivisibili. Egli somministrò i sondamenti del calcolo infinitesimale all'ardito VVallis d'Ashford, il quale, al dir del Fontenelle (2), produsse infinite serie di numeri e determinò senza verun timore nè precauzione i rapporti delle loro somme, dalle quali dipendono non solo i rapporti de' piani e de' solidi dati dal Cavalieri, ma ancora le quadrature e le rettisicazioni delle curve che non entravano nella teoria del geometra Italiano, incominciando dove questi avea sinito. Fiorì allora parimente il Keplero, cui debbonsi le due tanto samose leggi astronomiche: il Borrelli uno dei più sermi sostegni del Cimento, il quale vivendo in mezzo ai più gran sisici, astronomi.

<sup>(1)</sup> Nella Rosa Ursina pubblicata nel 1630 lo Scheiner non ha che se stessione per testimonio di averle prima, cioè nel 1611, osservate.

(2) Nella sua Geometria dell' Infinito.

### PRELIMINARE. XV

astronomi e matematici gli pareggiò talora, talora gli vinse, e trasportò con felice conato la certezza geometrica sino nei movimenti spontanei o necessarii degli animali, manifestando la forza musculare nel nuoto, nel corso, nel passeggio, nel volo: il Malpighi sagace investigatore di tante scoperte anatomiche, il quale seppe prima di ogni altro distendere l'anatomia alle piante: il Locke il quale senza essere fisico nè matematico pur si sece onorato luogo tra' grandi uomini della sua età ( potendosi giugnere all'immortalità per vie diverse) e disviluppò e narrò con insolita eleganza e vaghezza la storia naturale dell'anima umana, rigettando le favole soventi sparse ne' libri e consultando l'intimo senso di se stesso e l'analisi dell'uomo, col suo decantato saggio dell'intendimento umano: il Gassendi che rettificò in Francia la filosofia di Epicuro, ed osservò il primo il pianeta mercurio nel disco solare: il Cartesso che spezzò al fine le dure catene dell'autorità rivendicando la libertà degl'ingegni, ed aprì a' geometri nuovi e sublimi sentieri non prima frequentati, applicando l'algebra alla geometria: ed il Neper che in Inghilterra formò il bel disegno di semplificare i calcoli trigonometrici, sostituendo l'addizione alla moltiplicazione e la fottrazione alla divisione, e ne venne a capo colla sua ammirabile invenzione de' logaritmi. Venne pure il celebre Gian Domenico Cassini padre dell'astronomia in Francia. il quale oltre all'avere scoperti quattro dei cinque satelliti di saturno, e con maggiore accuratezza del Galilei e del Reineri, dell'Odierna e del Borrelli, seguiti gli astri Medicei, e riformate le loro ipotesi e le tavole con nuove e più squisite osservazioni, con tanto vantaggio della geografia e della nautica, oltre, dico, a ciò, egli insegnò agli astronomi dal 1683 a notare il fenomeno del lume zodiacale, spianando la via al P. Noel che l'osservò nel 1684, a Fazio di Duillier nel 1685, a M. De la Loubere Inviato del Re di Francia al Siam nel 1687, al P. Le Compte che dal 1685 al 1694 l'osservò nel Siam e nella China, ed in

# XVIII DISCORSO

feguito alla maggior parte degli astronomi di questo secolo, e singolarmente a M. Mairan che ne ha dato un trattato eccellente. Egli avvenne poi a questa scoperta ciocchè in ogni novità accade. Niuno l'avez esservata, e poichè il Cassini l'ebbe manisestata, tutti vollero trovarla negli antichi, e contarono intorno a tre osservazioni satte prima di lui (1).

Ma pose il colmo alla gloria di questo secolo il calcolo infinitesimale compiutamente trovato e sviluppato dal gran Newton, scienza che porta le nostre conoscenze nell'infinito e quasi al di là de' consini prescritti alla mente umana. Nato secondo la risorma Gregoriana del calendario nei primi giorni del 1643, ai venticinque anni della sua età (dice il Barrow) trovò questo calcolo maraviglioso che sa la base del suo gran libro dei Principii usciti al pubblico nel 1687. Tre anni prima Gotosredo Leibnitz avea negli Atti di Lipsia pubblicato le regole del calcolo disserenziale, nelle quali egli chiama integrale ciò che Nevvton nomina suente, e differenza ciò che Nevvton chiama sufficere. Si

Obstupuit, doluitque simul super astra referri Pynamidas, veterumque rapi monumenta virorum,

<sup>(1)</sup> La prima si vuole satta nel principio del quinto secolo. Nicesoro nel libro XIII della sua storia dopo di avere rapportata la presa di Roma per Alarico parla di un chiarore singolare che avea la sigura di un cono e sembrava una specie di samma posta da prima verso la parte del cielo dove il sole sorge nell'equinozio di primavera, indi sparsa per la parte del zodiaco che corrisponde all'ultima stella della coda dell'orsa; di che veggasi il trattato del lodato M. Mairan. La seconda ofservazione si riscrisce all'anno 1461 facendo Pontano ofservazo as un pescatore del Nilo se piramidi del lume zodiacale. Di lini dice:

Egyptunque suis superos spoliare tropbaeis E l'ultima appartiene anche al decimosettimo secolo, mentre Childrey in fine della sua storia naturale dell'Inghilterra serieta verso il 1659 parla ancora di un cammino luminoso che sembrava noccar le Plejadi.

volle però che nel 1673 egli aveile latta una lettera del Nevyton dove spiegavasi settamente il metodo delle sussioni. Nondimeno egli era tale quell'infigne Prefidente dell'Accademia delle Scienze di Berlino da non sospettarsi di lui che avesse voluto involare la gloria del gran ritrovato al Presidente della Società Reale di Londra. Due sì gran luminari del loro fecolo potevano ciascuno da se stesso pervenire a discoprirlo. Ad ogni modo essi vendicarono dalle ipotesi le scienze ed apportarono il sospirato meriggio. Il grande Inglese co' suoi Principii dove dominano le due samose teorie delle forze cenerali, e della resistenza de' mezzi al moto, e colla sua Ottica ripiena di tante cose tutte nuove, tutte avverate, tutte mirabili su i colori, ed il famoso Alemanno colle teorie del moto affratto e del concreto, e colle ricerché fulla misura delle forze che egli divide in vive e in morte, fanno si, che gli amatori delle fifiche e delle matematiche con seducente trasporto misto di diletto e di maraviglia adorino le immortali tracce della luce che aecompagna i loro voli sublimi.

Per esti le Accademie Europee trionfano dell'ignoranza o dell'orgoglioso pedantismo de' vocaboli vuoti di senso che all' ignoranza equivale. Il lodato Cimento di Firenze avea spianata la via alla fisica sperimentale sulle tracce del Galilei e del Borelli. Gli Oltramontani emulandone le cure videro di mano in mano nascer fra loro le società scientifiche di Parigi, di Londra, di Lipsia, di Berlino e di Pietroburgo. Bologna intanto spiccava col rinomato Issituto e coll'Accademia delle scienze. Nè mancatono allo fplendore di sì gran secolo gli emuli dei Ratfaelli e dei Correggi che ricondussero alla vaga e graziosa natura le belle arti. I Caracci mostrarono colle loro divine tele che si poteva dopo Massaello sare innarcar le ciglia alla posterità: e furono egregiamente in diverse forme secondati or da Guido Reni, dall'Albani e dal Guercino, or dal Veronese, dal Tintoretto e del Rubens, or dai nostri Giuseppe Ribera, Massimo Stanzoni e Mattia Preti.

Sforzi memorabili facevano intanto fra noi gl'Investiganzi della Società Rossanese. Ma non ancora un provvido beneficente sguardo Reale erasi rivolto ad ispirar coraggio. lena ed emulazione in questi regni. Madrid e Vienna vedevano di riverbero queste contrade e con gli occhi dei Vicerè. Convenne al Borelli, prima d'insegnare in Messina. di cercar l'aura di un protettore della vera scienza fuori del recinto delle nostre regioni. Roma e Firenze ammirarono in lui quanto avrebbe potuto il genio di una nazione attiva aeuta e perspicace sotto di un Principe protettore delle scienze e della gloria nazionale. Non pertanto un secolo e mezzo di pubbliche sventure non impedì che molti dei nostri prendessero a calcare le vestigia del Galilei e del Cartesio. Tommaso Cornelio, Lionardo da Capua, Luca Porzio approfittaronsi dei lumi stranieri e domestici, additarono molti segreti naturali anche agli oltramontani, e diedero la caccia all' Aristotelismo rifugiatosi all'ombra del governo viceregnale. La buona filosofia giva rinascendo, fra noi come altrove; la geometria si collegò colla sissica, e questa nell'alleanza acquistà solidità e quella si rendette utile ed interessante: Nevvton divenne la nostra scorta; la barbarie pailata perdeva terreno ad ogni pailo.

Non mancava alla moderna sapienza che un tempio eretto unicamente per raccorre i più sidi suoi ministri e adoratori per sacrificarvi ad onor del Sovrano ed alla pubblica selicità le primizie de' proprii sudori. Mancava un' Accademia scientifica che potesse attendere a' suoi lavori all'ombra del trono. Mancavaci un Monarca vicino che promovesse il pubblico bene cominciando dal rischiarare le menti per renderle sagge regolatrici dei cuori, sicchè potessero secondare senza intoppi le mire sovrane dirette al pubblico bene.

Tornò finalmente nei nostri paesi l'onor della regia sede, e l'augusto CARLO III sorrise benignamente alle lettere porgendo loro la mano. L'adunanza scientifica inspirata dal dotto Monsignor Celestino Galiani, cui presedè qualche

anno Niccold Cirillo e servi di Segretario il celebre Francesco Serao, giva elevandosi a grande altezza e prometteva di pareggiar l'Inglese, la Parigina, la Bolognese, e quelle dell'ultimo Settentrione. Ma di repente emerse dal seno della terra l'antica sepolta Ercolano, e le reliquie che ad onta dei secoli serbaronfi in essa all'ammirazione della nostra età, trassero alle vicinanze del Vesuvio gli sguardi del Sovrano e dell' Europa, e nacque l'Accademia Ercolanese addetta ad illustrarle. La luce filosofica dietro la scorta del gusto dissipò i deliri degli antiquarii non filosofi e pretti etimologisti. Ma il sentiero della vera filosofia calcato dal Vico, dal Capasso, dai Martini, dal Lama, dall'Orlandi e dal Genovesi, uomini pieni la mente, il petto e la lingua del sapere del Leibnitz e del Nevvton, condito della Socratica e Platonica incantatrice eloquenza che sola rende la scienza amabile, prometteva l'epoca fortunata della fondazione di un'Accademia Reale destinata ai progressi delle scienze. Ma Carlo III vola a felicitare l'ultima Esperia, e rimane all'augusto FERDINANDO IV e all'inclita MARIA CAROLINA la nobil cura d'illustrare il loro regnato con sì notabil pegno di paterno amore verso i loro fortunati vassalli, e di far noverare il nostro secolo tra quelli che abbiamo di sopra riferiti, i quali formano la vera storia utile, innocua e interessante dell'umanità, cioè quella che ci conserva i gloriosi avanzamenti della mente umana.

## FONDAZIONE DELLA REALE ACCADEMIA.

Tutto sotto di si gran COPPIA risiorisce. Un discendente di Antonio Beccadelli animato dallo spirito del suo grande antenato seconda col proprio zelo le alte mire dei benefici SOVRANI intenti a sar nascere la vera coltura dello stato con proteggere le scienze. L'anno 1779 compionsi al fine i voti dei buoni, e, a differenza di tante

### XXII FONDAZIONE

altre letterarie adunanze Italiane e Araniere, sorge con insolita splendidezza la Reale Accademia Napoletana delle Scienze e Belle Lettere. Ecco l'epoca più felice dei nostri fasti, che prende il nome da FERDINANDO e CAROLINA, e che promette la gloria scientifica e la felicità di questi regni. Il Sovrano provvede al mantenimento della nascente società proporzionato ai principii: ne assida la cura a un degno Presidente nella persona del Principe di Francavilla Don Michele Imperiali Maggiordomo Maggiore, che mancato indi a non molto ebbe un non meno illustre e chiaro successore nel Principe di Belmonte Don Antonio Pignatelli; destina due Segretarii perpetui Don Michele Sarconi per le Scienze e pel Registro economico. e Don Andrea Serao per le Belle Lettere, e nomina ventiquattro Accademici Penfionarii, ai quali associa un numero grande d'individui esteri e nazionali non superstuo. avendosi ragione dei molti rami destinati a coltivar le scienze e l'amena letteratura (1). Che più? In compagnia dell'augusta CAROLINA onora della Real sua presenza la prima pubblica adunanza della sua Accademia, inspirando nei rapiti spettatori un vivo ardore di corrispondere colle proprie vigilie alla real munificenza, e di rendere la patria e se stessi felici ed illustri. Giunse per tutto la sama della pompa di quel bel giorno, che tutti colmò di speme, di giubilo e di tenerezza gli amatori del fapere; or qual entusiasmo inspirar non dovea nei compatriotti adunati nella Sala delle aisemblee l'augusta benefica presenza di sì amabili e sì amati SOVRANI? Chi ciò vide e ne avea il carico, avrebbe potuto agevolmente tramandarlo alla posterità con evidenza maggiore di quello che possa oggi farfi da chi respirava allora le anre del Manzanare raccogliendo dalle ammassate carte la sparsa luce e le accademiche fatiche dei primi anni.

<sup>(1)</sup> Se ne legga il catalogo negli Statuti della R. A. approvati da S. M. e pubblicati l'anno 1779.

## STORIA DELL' ACCADEMIA.

Con saggio avviso si presisse la nascente Accademia per oggetto principale di tutte sar concorrere le scienze a vantaggio dello stato. Quindi le quattro classi che la composero, a' patrii bisogni volgendo le mire, quella parte delle rispettive scienze intraprese a coltivare con maggiore ardore, onde il bene sissco, politico e morale di questi regni ne risultasse. Noi andremo additando l'ubertosa messe che si presentò all'amor patriotico all'aprirsi così giorioso campo. Prima adunque di comunicare al pubblico le Dissertazioni scelte dal Corpo Accademico per questo primo volume dei suoi Atti, accenneremo in un articolo gli oggetti principali proposti per tutti i rami delle classi stabilite, ed in un altro daremo una competente idea dei varii tentativi satti prima e dopo dell'anno 1783 per promuovere le scienze e l'amena letteratura.

# LAVORI PROPOSTI ALLA PRIMA CLASSE.

L'Abate Don Felice Sabatelli Napoletano R. Professore di astronomia nell' Università degli studii e Accademico Pensionario che morte ne rapi nel 1786, uomo ornato della dottrina più soda e del discernimento più sine, propose agl'individui della prima classe il determinare coll'ultima precisione la longitudine e la latitudine della nostra capitale. Le misure che prima se ne aveano non senza errori erano state la prima volta corrette nel monistero di San Severino dal celebre Pietro Martino suo predecessore nella cattedra dell'astronomia, di poi dal medesimo Ab. Sabatelli nella real Paggeria, e ripigliate in appresso dal P. Carcani nel real collegio di S. Carlo alle mortelle; ma l'avveduto Accademico vi desiderava ancora l'ultima esattezza. Proponeva altresì che si misurasse in tutto l'anno l'alzamento ed abbassamento

del mare tanto nel nostro Cratere quanto ne' lidi del regno, reputando che tal misura, comechè picciola e quasi insensibile creduta, dovesse pure interessare l'Accademia. Il cielo soprattutto fornirà, egli diceva, ai nostri laboriosi osservatori per tutto l'anno copia dilettevole e nuova di senomeni in mille guise variati.

Il P. Giammaria della Torre Genovese morto nel 1781 lasciando di se desiderio sommo nella nascente Accademia insinuava che i matematici compresi in questa classe dovessero occuparsi intorno all'origine dell'equazioni e alla loro natura, per trarne sormole generali chiare e spedite da rintracciarne le radici, senza aver bisogno di ricorrere al metodo di

approssimazione per mezzo delle serie infinite.

Prefiggendosi l'altro valoroso Pensionario l'Abate Don Giuseppe Marzucco Napoletano d'inspirare all'Accademia lo spirito di novità e di grandezza che orna e rende cospicue le adunanze scientisiche, animava la nostra sorgente società a tentare di sostenere la gloria degl'Italiani, che si sono segnalati prima di ogni altra nazione Europea nell'analisi, e per ciò a procurare un'elegante soluzione dell'equazioni del terzo grado così necessaria per passare indi più oltre, onde potessero essicacemente illustrare la meccanica, l'ottica e le altre parti delle matematiche miste.

Il laborioso Socio Don Niccolò Fergola Napoletano, nel quale combinasi un vero amor delle scienze e un vero patriotismo, lodando i metodi sintetici degli antichi geometri, che consistono nell'uso giudizioso del principio di riduzione, osservava però che sistatto artificio enristico, benchè sicuro e gloriosamente pensato, sia soggetto a certa lentezza nello scoprire il vero, la quale sovente delude le nostre speranze. Quindi desiderava che una società intenta all'incremento delle scienze cercasse di assegnar mezzi per guidarvi i geometri e prescrivere delle regole per agevolarne l'uso. Ed oltre poi al proposto miglioramento della soluzione delle

de' problemi geometrici ei suggeriva doversi estendere e migliorar que' metodi dell' algebra de' finiti e degli infiniti, donde maggior perfezione arrechisi alla geometria de' curvilinei, ed a' moti naturalo-variabili. Ed avendo fin dal principio distinto in due rami tutte le investigazioni fulla quantità, cioè nella ricerca de' metodi generali, ed in quella delle importanti verità particolari rilevate per mezzo di tali metodi, discendeva ad indicar certe mire particolari da tenersi dall'Accademia sul primo e sul secondo ramo. Esigeva in effetto in questo che si formassero le carte parziali corografiche delle nostre regioni, e che con un asterisco vi si segnassero que' luoghi, le cui latitudini e longitudini fossero state prese astronomicamente: che si misuratse nelle pianure della Puglia il grado del meridiano terrestre: che si saggiassero le attrazioni de' pendoli prodotte dalla catena degli appennini: che si livellassero i principali laghi e fiumi del nostro regno, ec. Finalmente dopo aver commendato a' fuoi compagni lo studio di rilevare incessantemente dalla natura i veri Dati per li problemi fisico-matematici, proponeva a tal uopo lo stabilimento di un Elaboratorio Chimico, e di un altro Ottico diretti da persone dotate di sufficienti lumi di speculazione e di pratica. E si doleva non tanto della mancanza di questi Elaboratori, quanto di quella nazionale indolenza, onde trascurasi l'esame di que' corpi, che la natura preparando ne' suoi segreti Elaboratori a dovizia ci porge. Il Vesuvio, ei diceva, in una fola eruzione offre per obietto al fisico que' corpi che gitta nelle valli, e quegli altri, che di per se intrudonsi nell'atmosfera, ed invita il geometra a calcolare la densità, che a questo fluido in tal congiuntura cagionasi da' corpi galleggianti, e dal gran calore che lo investe.

L'Abate Don Niccolò Pacifico accademico penfionario della feconda classe, le cui moltiplici cognizioni lo rendono illustre nelle matematiche, e segnatamente nell'astronomia, nella storia naturale e nell'antiquaria, e la cui erudizione

spargesi per tutti i rami delle scienze da lui felicemente coltivate, in un piano di occupazioni proposte per l'anno 1780 e pel seguente, attendendo all'attuale scariezza delle macchine altronomiche e fisiche dell'Accademia, suggeriva singolarmente le seguenti tesi matematiche. i metodi per l'invenzione delle serie convergenti per l'integrazione delle formole differenziali, ed ampliarne l'uso; e specialmente proporre una serie più convergente per la rettificazione delle curve coniche e più adattata alla pratica; la qual cosa l'illustre autore passò ad eseguire egli stesso per farne parte all'Accademia, Promuovere l'elegante teoria della riduzione dell'integrazione di alcune formole differenziali alla rettificazione delle curve coniche; e vedere in particolare, in quali casi qui si riducano l'espressioni differenziali complesse di due radici del secondo ordine di funzioni razionali tanto che le multiplicano quanto che le dividono. Esaminare la sorgente delle dissicoltà che g'incontrano nel voler costruire alcune equazioni differenziali. E finalmente badando anche all'analifi de' finiti incoraggiva i fuoi colleghi a dilucidare un po' meglio la teoria dell'equazioni, ed a tentar di togliere con facilità ( se mai è possibile) i due termini intermedii di una equazione di terzo grado, per ottenerne anche con questo mezzo la soluzione.

# LAVORI PROPOSTI

Su i diversi rami della seconda Classe:

Senza togliere agl'individui della seconda classe che la medicina in tutta la sua estensione e la storia naturale riguarda, la libertà di esercitarsi in quelle investigazioni che loro presentassero oggetti nuovi ed importanti, il chiarissimo Don Domenico Cotugno accademico pensionario a quella ascritto raccomandava per l'anno 1781 le seguenti

### DELLA R. A.

ricerche, col solo animo di suggerire agl'indecisi una serie di oggetti degni di esaminarsi, e quelli principalmente che

poteisero illustrare le cose patrie.

Dietetica. I La natura delle arie nei diversi siti della capitale. II La natura delle nostre acque potabili, le differenze specifiche, e la diversa salubrità delle acque correnti, e di quelle che diconfi per distillo: l'esame della nostra particolar pietra tufacea detta di monte, la sua origine, i suoi composti, l'influenza che possa avere secondo la varia posizione e profondità dei massi sulla maggiore o minore salubrità delle acque, le sue varietà. III La storia dei nostri vini, l'investigazione dei varii concimi, onde per la malizia dei venditori restano alterati; come conoscerli, quali mali vagliano a produrre, come rimediarci. IV La natura delle farine convertibili in pane; come conoscere se contengano parti non frumentacee; quali ioitanze poisano accrescerle con salubrità, quali con danno.

Patologia. Un registro delle successive costituzioni dominanti nella capitale; un parallelo dei varii avvenimenti dei nostri vulcani; se abbian questi qualche insluenza, e per quali malattie; se vi sia arte da schivarle. Il La storia esatta dei mali particolari; ricerche sull'origine delle affezioni uterine, fulle malattie del cervello, della milza, del pancrea; sulla rachitide, e donde sia divenuta tanto comune; su i mezzi da preservarsene; se vi sia una cura eradicativa, e quale esser possa. III Se oltre la corteccia del Perù fienvi altri rimedii essicaci a combattere, e distruggere i periodi di certe malattie. IV Un esame del mali che possano senza ajuto di medicina distruggere colle proprie forze se stessi, la loro storia, e la ragione della

loro efficacia.

Don Francesco Merli da Ferrara Socio estero aggregato a questa classe noto per le sue dotte produzioni proponeva le seguenti questioni per avanzare i progressi della medicina, I Se possa la medicina teorica pratica avere varii e sermi

#### STORIA XXVIII

principii, che come arte nobile ed utile molto più di ogni altra l'avvieinaisero alla scienza. Il Perchè questi principii additati da Ippocrate non siensi di poi coltivati ed accresciuti. III Se ciò sia derivato per necessaria conseguenza del limitato umano talento, o se l'ignoranza, la malizia, i pregiudizii l'abbiano determinatamente prodotto. IV Esaminare se la natura abbia segni esterni per regolare le indicazioni, e farne indi una più ragionata teorica onde risultasse una esemplare e serma pratica. V Se gli antichi medici con una ben ristretta farmacia e con poca cognizione di rimedii fossero stati nelle loro cure più o meno fortunati dei medici moderni forniti di maggior numero di rimedii. VI Se possa l'Europa ed ogni parte di essa combattere i mali senza bisogno delle droghe straniere. VII Ristettere sul bisogno di ristringere quella parte chimica che serve alla medicina, separandola interamente da quella che non le appartiene.

La chimica, diceva poi il valoroso Socio Don Niccolò Andria, sembra estendersi al pari della natura, potendo tutti i corpi naturali formar l'oggetto delle contemplazioni di un chimico. La cognizione delle proprietà e della composizione dei corpi ci mette in istato di comprendere i fenomeni della natura, e l'uso cui a nostro vantaggio potsonfi i medesimi destinare. L'analisi adoperata dai chimici forma un argomento a posteriori, il quale può conchiuder bene soltanto in casi particolari. Ma coll'analisi ossia col discioglimento di un corpo suole avvenire che si distrugga il mecanismo della natura prima che da noi si conosca, ed allora il nostro fine rimane deluso. Il metodo adunque delle combinazioni sembra da preferirsi. Combinando insieme le sostanze corporee possiamo meglio inoltrarci a scoprire il secreto delle operazioni della natura. Questo gran progetto si è in parte cominciato a mettere in pratica; ma lungi dall'effere esaurito egli non si è tentata che una picciolissima parte del piano immenso che esso somministra agli occhi del fisico. L'estensione di sì vasto campo non permette che si esegua nè da pochi nè in poco tempo. Dovrebbesi adunque lasciare alle altre scientifiche società l'esecuzione del rimanente, giacche esse dimostrano cel fatto di essere animate dal medesimo nostro impegno di promuovere lo studio della chimica che forma oggi con tanta ragione la base più soda delle scienze sissehe. E si dovrebbe da noi per certo innato dovere volgersi ogni cura a quelle cose che privativamente ci appartengono. I contorni di Napoli abbondano delle più variate, più curiose e più utili produzioni onde la natura può arricchire un paese. Scopo una volta infelice dei vulcani, oggi somministrano ubertosamente agli offervatori i rari effetti prodottivi da tali potenti cagioni moderate dall'azione del tempo. Formano adunque tutti questi contorni una spezie di scuola, dove la stessa natura coi suoi prodigiosi senomeni sembra dettare interessantissime iltruzioni di filica e di storia naturale. Il non approfittarsene ora spezialmente che si è trovata la maniera d'interpretar felicemente i sensi arcani della natura, sarebbe una colpevole negligenza. Soprattutto dovrebbero con esattezza indagarsi quei grandi rapporti che i prodotti naturali del paese possono avere col tesoro inestimabile della salute dell'uomo. Contemporaneamente si dovrebbe imprendere l'esame chimico dei materiali del nostro terreno atto a somministrare colla fua varietà ampia occasione all'avanzamento delle arti non solo di prima necessità, ma anche di lusso. presenterebbe un nuovo spettacolo all' Europa tutta.

Inerendo a simili vedute il noto illustre regio Prosetsore di chimica e Accademico Pensionario Don Giuseppe Vairo scendeva prosittevolmente ai particolari. La geografia sissica dei contorni di Napoli, ove la natura più che altrove si è mostrata maravigliosa ed instruttiva, prender si debbe principalmente di mira. Mancaci una compiuta storia dei senomeni maravigliosi della Solfatara di Pozzuoli. Dovrebbe procurarsi di accrescere la quantità dell'alume che si produce

### $XXX \qquad S \quad T \quad O \quad R \quad I \quad A$

in quel vulcano, e di migliorarne la qualità. Possono stendersi le ricerche sulla samosa grotta del cane e sulle acque minerali che trovansi nel territorio di Pozzuoli e sul vapore delle stuse dell'isola d'Ischia, di Agnano e di Pozzuoli. Anche l'industre osservatore l'Ab. Don Domenico Tata Socio ascritto a questa classe inculcava l'esame della natura dei nostri vulcani e delle materie da essi eruttate in ogni tempo, e dell'influenza che possono esse avere sull'ubertosità delle terre.

Per la scienza delle piante il regio Professore di botanica ed Accademico Penfionario Don Vincenzo Petagna proponeva che s'investigasse il carattere naturale di esse per formarne il desiato sistema naturale: che si esaminassero le piante criptogamiche, e coll'ajuto del microscopio e con altre opportune diligenze si distinguessero quelle che appartengono al regno vegetabile da quelle da trasferirsi al regno animale: che si descrivessero le piante nuove del nostro regno, rettificandone il carattere essenziale, e notandone le varietà per restrignerne le specie al minor numero possibile. Ed a tal proposito diceva eziandio il Socio Don Giuseppe Cerulli che il più importante oggetto della botanica era la storia naturale delle piante, altro non essendo la nomenclatura, i caratteri e le descrizioni di esse che il limitare e l'atrio della botanica, ed appena il mezzo da facilitare la conoscenza delle piante. Ma la storia ragionata (aggiungeva) di ciascun vegetabile non può ottenersi che colla storia fisica, chimica ed economica di cesso, comprendendo in quest'ultima l'uso medicinale ove ne abbia. Quanto alla prima si desidera sinora nella storia della natura un sistema perfetto per intendere la vegetazione delle piante; nè se ne verrà a capo, se non si studia in ogni vegetabile la fisica delle piante, essendosi sempre col metodo sintetico satti i primi passi della ragione. Per la parte chimica di un vegetabile, pensava doversi rintracciare : confiderandolo tanto dal lato della chimica analitica, quanto

### DELLA R. A. XXXI

da quello della chimica di combinazione che potrebbo chiamarsi sintetica; e per la prima prendeva a vendicare la scienza chimica da i rimproveri di coloro che poco sperano nell'analisi; per la seconda conveniva della somma utilità che risulta dalle materie evidentemente inalterate e realmente estratte da i prodotti dei vegetabili e di tutti i corpi, e dal ricomporre il corpo analizzato col riunire sissatte sostanze o prin ipii costitutivi di essi corpi. Per la pianta poi che avesse qualche uso nella medicina, prevenuto a savore della materia medica degli antichi, che usavano alcuni potenti rimedii tratti dai vegetabili, dei quali non prevano tramandare notizia esatta per maucanza del sistema botanico, suggeriva che non si trascurassero le loro conoscenze e che si congiungessero ai moderni lumi.

Il prelodato Pensionario Abate Pacifico e l'altro Pensionario Don Angelo Fasano sempre indefessi, sempre amatori della patria, e sempre pronti alle fatiche accademiche, proposero diversi punti di storia naturale da aversi presenti dall' Accademia. L'idrologia, la mineralogia, la zoologia e la botanica loro suggeri diverse mire, colle quali, diceva il Sig. Fasano, potrebbero formarsi tre storie interessantissime la zoologica, la botanica e la mineralogica. Una storia particolarmente vulcanica richiederebbero, aggiugneva, quei tre famigerati elaboratorii della natura che abbiamo si dappresso alla capitale, il Vesuvio, la Solsatara, ed Ischia. Anche in fine di una di lui Memoria botanica che si registrerà nel presente volume, additava ai naturalisti, che alla parte meridionale del promontorio di Palinuro che è tutto di pietra da calcina, evvi una picciola cala, chiamata dai paesani Calasetente. In essa scendendo dentro mare il promontorio forma una picciola scarpa ossa piano inclinato, su del quale intorno a 12 piedi dalla superficie delle acque abbasso, si ravvisa un buco largo circa due piedi e poco meno lungo, onde nelle baise maree sgorga un grosso getto di acqua puzzolentissima (nulla gettando nelle alte maree)

# XXXII 'S T O R I A

il cui puzzo si diffonde per cento passi in circa. Questo fonte marino richiederebbe molte offervazioni ed esperienze per illustrare la storia naturale. Oltre poi a ciò che proponeva il Sig. Ab. Pacifico per rapporto alle piante e tingolarmente intorno alle gramigne, alle alghe di Linneo, e alle criptogamiche del Micheli, per rapporto alla zoologia fulla gran varietà degl'insetti che trovansi nel regno di Napoli ed ai bru hi dei pini degli antichi, di cui parla Dioscoride, ed ai vermi, e per rapporto all'orictologia e all' idrologia; oltre, dico, a tutro ciò utilissimamente circostanziato, egli distese gli sguardi filosofici sull'agricoltura e sul commercio. Ma intorno a questi ultimi interessanti oggetti a prova si segnalarono il soprallodato P. della Torre, il Socio Don Michele Torcia, il Consigliere Don Michele de Jorio ed il Pensionario M. Giorgio Hart, e l'Olivetano P. Veremondo Pepi.

Comunicossi ancora all' Academia un' iride lunare osservata in Otranto ai 21 di Agosto del 1780 ad ore 3 m. 15 della notte dalla casa de l'Arcivescovo Monsignor Pignatelli testimonio oculare accompagnato da alcuni Canonici e Prosessori di quel Seminario. Era l'arco bianco più smorto nel mezzo, i cui estremi poggiavano allo scirocco e tramontana elevandosi intorno a 40 gradi a ponente. La luna vedevasi elevata a 30 gradi in circa sull'orizonte orientale, trovandosi al dì 23 del suo periodo prossima all'ultimo quarto. Piovea a ponente, e gli osservatori trovavansi tralla pioggia e la luna, e tra questa e l'arco splendeva qualche stella. Si raddoppiò l'arco presso alle ere 3 m. 30, ed il secondo arco si vide più basso verso ponente. Dopo qualche altro minuto si oscurò la luna e

sparvero gli archi.

### LAVORI PROPOSTI

# alla III e alla: IV Classe.

Proponeva l'erudito Socio Don Salvadore Grimaldi il rischiarimento dello stato e governo politico delle nostre regioni, incominciando dalla loro fondazione secondo le relazioni che ebbero colla Repubblica e coll'Impero Romano: una raceolta particolare di tutte le iscrizioni e de' pubblici monumenti appartenenti a questo regno colla necessaria interpretazione e col comento, aggiugnendovisi la serie delle monete e medaglie: un trattato istorico del commercio interno ed esterno dei nostri antichi, della loro navigazione, de' porti del nostro regno, dell'agricoltura e degl'istromenti da lavorar le terre: un trattato della religione, de' riti e sacrificii di queste regioni, e della prima loro mitologia, e dei rapporti che i nostri ebbero colla nazione Greca. Tralle altre cose additate dal Pensionario Don Salvadore d' Aula parve interessante quest'oggetto; perchè mai appo gli antichi Romani pervenuta fosse l'agricoltura a tanto alto grado di stima a quanto si sa che giunse?

Insinuava tra molti argomenti il prelodato P. Veremondo Pepi che si determinasse lo stato presente delle scienze, comparandolo con quello degli antichi e dimostrando quali idee siensi rischiarate dalla posterità, e quali oscurate e consuse; prosittevole argomento, purchè si cercasse d'investigare lo spirito degli antichi, e non già la sola connessione delle parole. Nè men curioso e forse anche vantaggioso potrebbe riuscire ciò che proponeva intorno ai laghi per renderli utili. Dovrebbero, diceva, cerearsi i mezzi più essicaci ed eseguibili di asciugare e porre a coltura negli Abbruzzi il lago di Celano detto dai Latini Fucino, indagando il vantaggio che ne potrebbe ritrarre quella popolazione. L'opera era stata incominciata dall'Imperador Claudio, che

a tal fine spaccò una montagna, e sece il canale, e gli Abbruzzesi avrebbero dalla di lui benesicenza ritratta l'utilità sperata, se gli argini sossero stati più sorti e resistenti.

Ogni popolo ( diceva il Socio Don Domenico Forges Davanzati oggi Arciprete di Canosa ) può riguardarsi per l'aspetto della sua situazione topografica, per la religione e pel governo politico, dalle quali cose provengono il di lui genio, le arti, le scienze e gli usi. Il terreno ch'egli. occupa più a meno fertile, piano a montuola, meditenaneo d marittimo, più o meno cippito alle incursioni efferne. forma gli abilitatori più o meno ozioli o industri, più o nacino guerrieri, più o memo rozzi o colti, più o meno equipati dell'agricoltura, della pastorizia, della caecia, del commercio. La religione è flata presso gli antichi popole unaforme allo stato sisseo, al genio e al governo, di maniera che lapendosi il culto particolare delle divinità e le ceromonie e gli spettacoli delle nazioni, si può venire in chiaro della lors indole predominante, dello siato politico e dei grado di colstera. Se altro non si sapesse de Romani e degli Seiti ohe la loro venerazione per lo dio Marte, avrenno pounto affirmer con certeniz che deveane essen papoli guerrieri. La Grecia dedita alle seienza e alle arti popolò il suo cielo di Minorve, di Apolis, di Mercursi, di Vulcani, e nate li findero in quella contrada le Grazie. L'halia proporciona di tertilidamo terreno e podia forto un cieli temperato, potea diera abitata per lo più du aftri che du populi agricoltoci? de fatte i primi fuoi abisatori si sucero un gran namero di ddi che presedevano ad egni ramo della collivazione. L'uonto, prima della luce del vero, ha sempre deisicato se stato e le sue passions. Il governo politico non può essere rischiaratosfenza la conoscenza delle cose, riscrite. I Sanniki posti rea monsi e bosshi, e peroid più addetti alla caccia ei alia pastorizia, ettendo popoli quasi vaghi e liberi doveano avere il genio guerriero, e la codituzione del governo repubblicano. Gli Appuli agricoltoni posti in ampie pianure

anali addetti ad un terreno particolare, e perciò meno creanti e liberi, erano a' re fortoposti. E la religione ed il zoverno influivano negli spettacoli. Quelli de' Romani erano gladiatorii e manifestano il genio bellicoso, e l'oggetto del governo che voleva avvezzarli al fangue ed a mirar con indifferenza la morte. Gli spettacoli de' Greci dati con ispezialità alle arti, consistevano in contese d'ingegno, gareggiando in esti i musici, i poeti, gli oratori. Da simili cose indotto il lodato Socio insimuava che delle varie popolazioni delle terre di gnesto regno ove diverse nazioni vennero ad abitare, fi efaminasse in prima l'origine, la strazione ed il clima, il quale benchè sempre temperato. pure per qualche circostanza di monti e di laghi vicini potea essere alterato; indi la religione presa nella più ampia estonfique, in fine il governo colle arti, le scienze l'agricoltura, il commercio, l'arte militare, li costumi a le usanze che ne dipendono.

Ma essendo le mire principali dell'Accademia in tutti i suoi rami rivolte all'esecuzione di una storia patria compinta e per ogni parte spoglia degli errori e delle inclantezze dei paffati scrittori, tutti gl'individui, singolarmente della terza e quarta clatfe dediti a rischiarare i più remoti tempi e quelli che diconfi mezzani, fi diedero a rintracciare e suggerire i più agevoli e i più opportuni mezzi per l'esecuzione di si bel disegno, E l'Abate Don Filippo Ginati Socio ascritto alla terza classe acceso di un patriotico andre che traspira in ogni linea di due suoi piani proposti nel 1780, approvando l'elezione di varii socii nazionali per lavorarvi ne' luoghi rispettivi, proponeva anche una peregrinazione Accadomica per offervare ocularmento le carte di tutti gli archivii occlesiassici e secolari ed estrarno quelle copie autentielle che il kimassero nocessarie el richiarimento di certi punti di storia che lo richieggoro, Suggeriva altresi che l'Accademia procuratie di prevaleria delle faciche inedite di alcuni valentuomini ben noti i ottenendole con allettamenti ed onori da' possessiri. Monsig. Antinori nobile Aquilano ( egli diceva ) incaricato anni sono a dire il suo avviso sulla Badia di San Chemente di Pescara, nel riferire al Sovrano le qualità di essa passò a supplicarlo di due o tre amanuensi per dar compimento al suo lavoro fattovi per tanti anni, e la di lui rappresentanza fu nel 1774 rimessa al Regio Consigliere Caruso, il quale diceva nella sua relazione che l'opera dell'Antinori sulla Badia di San Clemente riducevasi " a un Lessico ossia a una storia ragionata comprovata dalle notizie interessanti di ciascun luogo delle due provincie di Abbruzzo, tratta per lo più da monumenti originali antichi, del mezzo tempo e de'tempi bassi : e che vi si registravano le storie de' Conti e Baroni e quelle de' supremi Ecclesiastici e Prelati inseriori, le materie delle controversie spettanti a' confini de' territorii e delle giurisdizioni, i diritti acquistati o perduti, e le variazioni fatte in ogni luogo riguardo a' privilegii, alle incurporazioni, estensioni o soppressioni, e quanto altro avesse avuto di notabile intorno allo stato civile ed ecclesiastico. al sito, al commercio e a qualunque altra dipendenza". Ma essendo morto quel Prelato anzi che si risolvesse su di ciò alcuna cosa, rimasero i di lui scritti confusi e non compiuti in potere de' nipoti suoi eredi, e l'Abate Giunti infinuava che l'Accademia se ne procurasse l'acquisto o almeno qualche copia autentica. Anche il Cantore Morisano Canonico della Cattedrale di Reggio sua patria lasciò inediti varii dotti manoscritti sulla Calabria ulteriore colla raccolta di quanti monumenti ad essa appartengono dell'antichità più remota; e della di lui fatica che oggi trovasi in potere di Don Domenico Barilla della medefima città, meriterebbe parimenti di procurarsene almeno una copia. Evvi (diceva lo stesso Abate Giunti) nella città di Girace della medesima provincia il Canonico Parlà, il quale ha raccolte notizie e monumenti per illustrare la sua Locri; or perchè non incorporarlo all'Accademia e farlo contribuire al rischiaramento

### D E L L A R A XXXVII

'della storia di quelle regioni? Trovasi poi nella medesima città di Reggio, e propriamente nella libreria de' Padri Cappuccini un manoscritto del rinomato astronomo del XV secolo Tallavia o Tagliavia, donde trasse lumi il celebre Copernico pel suo sistema planetario; or perchè non cercarsi di esaminarlo per vedere sino a qual segno avesse potuto approsittarsene il valoroso astronomo del settentrione? Questo manoscritto onorerebbe la città di Reggio, e rischiarerebbe quella parte della storia dell'astronomia su di cui si aggira.

Dividansi ( diceva Don Marcello Eusebio Scotti Socio addetto alla quarta classe ) in tante picciole classi i nostri accademici, quante sono le dinastie surte ne' tempi mezzani e bassi nelle provincie di Napoli, e ciascuna di esse prenda ad illustrarle sul modello che da lui si proponeva della ducea di Napoli che a se riserbava. Su questa egli disegnava scoprir l'epoca dell'instituzione, i confini che ebbe in diversi tempi, e quindi indagare, se sotto essa sossero state Sorrento ed Amalfi; la eronologia de' duchi; le diverse condizioni che ebbe; vedere se i titoli di Magister Militura e di Conful che ebbero i duchi di Napoli, dinotino la loro dipendenza dagli Augusti di Oriente; se in Napoli sia mai stata una zecca propria, giacche questi popoli fi valevano delle monete Bizantine, e se le poche medaglie che si sono trovate sinora coniate, fossero state di sola divozione, e non fatte ad uso del commercio; se il nome degli Augusti di Oriente e gli anni del loro impero prefish in tutti i pubblici atti fatti in Napoli, dimostrassero una totale suggezione de' duchi, o se vi sia via da conciliar queste due cose, indipendenza ed apposizione degli anni e del nome degl'Imperadori; rintracciare la polizia di tal ducato, e perchè il duca di Napoli s'intitolatse Dux Campaniae, e che cosa dinotassero questi altri titoli Loci Servator, e Iudex &c.

Formisi ( era avviso del Socio Don Alessio Pelliccia ) un esame circostanziato di tutti i luoghi marittimi di questo

## XXXVIII STORIM

regno rimasti in ogni tempo sottoposti al dominio greco, e di quelli che di tempo in tempo ne furono tolti, additandone diligentemente l'epoca, da Gaeta sino ad Acropoli, da questa a Cotrone, e da Cotrone a' confini del regno; si faccia la comparazione della letteratura de' nostri popoli con quella de' Greci trasmarini; e si vegga perchè il paese de' Bruzii ebbe la denominazione di Calabria, e quali luoghi del nostro regno si dissero Lombardia minore. Giova ancora tanto alla storia, quanto a minorar la somma dei ditigi del nostro foro (diceva il Marchese Don Andrea Tontoli Regio Configliere ) investigare le origini delle nostre Consuetudini nelle quali sonovi tanti articoli contrastati. ed illustrare le Cofficuzioni del nostro regno, delle quali non ci sono state sinora indicate le vere cagioni che le fece dettare, onde ci manca la notizia più necessaria per bene intenderle.

In simil guisa animavansi a vicenda alla magnanima impresa d'illustrare le cose patrie, di leggere nel cielo, di penetrare ne' segreti magisteri naturali, e di portar oltre i progressi delle scienze. Ed in fatti vi furono spinti e incoraggiti espressamente, verso la fine di novembre del 1781, con una elegante orazione parenetica dall'Accademico Penfionario Don Luigi Serio R. Profess, di Eloquenza Italiana che l'Accademia a suo tempo avrà cura di produrre. Mancavano non per tanto alla nascente Accademia macchine e strumenti fisici ed astronomici per saggiare, osservare, analizzare, ed opportunità per leggere su i luoghi i lavori della natura o le reliquie del tempo. Quindi rimasero in gran parte così utili vedute sospese e riserbate a miglior tempo. Non arrestaronsi però le nominate classi ai piani ed ai progetti proposti; ma a somiglianza delle api industriose e delle operose formiche alcuni generosi individui pieni di patrio ardore, ora valendosi della concessa libertà di produrre a propria elezione, ora eseguendo una parte di ciò che si era proposto, diversi argomenti dotti ed interessanti

XXXXX

presero a maneggiare. E se opportunamente mindavasi ad essento l'immunata distribuzione de' premii in ciascun anno, on qual più doviziosa messe si sarebbe raccolta dal movimento a dall'azione generale della nazione s

### II.

Tentativi esegniti prima de tremueti di Calabria dell' anne 1783.

I. Degua fingolarmente di rammemorarfi fu la fatiga intrapresa dal presodato Abate Marzucco per tenta re di ritrovar le soluzioni che si converrebbero all'equa zioni superiori al quarto grado. Niuno ignora che gli Arabirisolsero quelle del primo e del secondos e che gl'Italiani inoltrasontial terzo e al quarto; dove si è arrestato l'ingegno umano. Lodevole fu per ciò lo sforzo magnamino del lodato Accademico di contribuire alla perfezione delle teoria dell'equazioni. Egli si prefise di dividere l'anzisi generale. cioè il metodo di decidere quanto v'è d'incognico nelle: equazioni determinate di qualfivoglia grado, in quattro parti-La prima abbraccia que problemi che decidono lo flato dei coessicenti per annientare nello stesso tempo due, tre, quattro termini intermedii nell' equazioni. La seconda contiene quei problemi che danno ai coefficenti le condizioni necessarie, assinche si posta eseguire l'annientamento dei suddesti termini intermedii. La terza insegna la maniera di comoscere il numero de termini intermedii che debbono minimatarsi per ottenere l'esatta soluzione dell'equazione. La quarta esaminando i problemi che appartenguno alle soluzioni esatte, desermina quella foluzione ene è più diegante e perfects.

Nella prima parte del fuo lavoro imprese ad etaminare distintamente quali condizioni o piuttosto quali rapporti abbiano a contenere i coessicenti dei termini intermedii di

una equazione biquadratica, o di qualunque altra super joreal quarto grado, perchè togliendosi da esse il secondo termine insieme ne svaniscano alcuni altri de' medesimi termini intermedii. Siffatti rapporti contengonsi in tre proposizioni dall'autore chiamati criterii enunciate in tal guisa. 1. Se i termini di una equazione di quarto grado suppongansi positivi, e il coefficente del secondo termine sia uguale al quadruplo della radice quadrata della sesta parte del coessiciente del secondo termine, e che le radici della suddetta equazione si aumentino del quoziente che nasce dividendosi il coefficiente del secondo termine per l'esponente 4 del primo, io dico che svaniranno insieme il secondo e terzo termine di essa. 11. Se i termini di un' equazione di quarto grado sieno positivi, e il quadrato del coessiciente del secondo termine sia uguale alla disserenza del quadruplo coefficiente del terzo termine e dell'ottuplo del quarto diviso per lo coessiciente del secondo, togliendosi da essa equazione il secondo termine, ne svanirà insieme il quarto. 111. Se i termini di una equazione del quinto grado fieno positivi, e il coessiciente del secondo termine adegui la radice quadrata della metà del quintuplo coessiciente del terzo, io dico che togliendossi da essa equazione il secondo termine, ne svanisca insieme il terzo.

Volle il valorose Analista illustrar con esempi le precedenti proposizioni stimando severchio il manifestarne la dimostrazione, o l'artificio euristico onde pervenne a rinvenirle. Per la qual essa intanto che il degno autore procedeva alla continuazione del suo interessante lavoro, l'Accademia ebbe cura di esaminare la prima parte del di lui piano, e quindi stimò conveniente addurre le tracce delle di lui invenzioni.

Sia x'+4px'+qx'+tx+r=o una qualunque equazione del quarto grado, da cui se ne tolga il secondo termine per gli metodi ovvii, sicchè degeneri in

$$y^{2}-4py^{2}+6p^{2}y^{2}-4p^{2}y+p^{2}$$
 $+4py^{2}-12p^{2}y^{2}+12p^{2}y-4p^{2}$ 
 $+qy^{2}-2qpy+qp^{2}$ 
 $+ty-tp$ 
 $+ty-tp$ 

cioè

$$y^{a} + (q^{a})y^{a} + (q^{b})y^{a} + (q^{b})y^{a$$

facciasi primo  $-6p^{2}+q=0$ , sarà  $4p=4\sqrt{\frac{q}{6}}$ , vale a dire perchè togliendosi dall'equazione di quarto grado di termini positivi il secondo termine, insieme ne svanisca il terzo, è mestieri che sia il coefficiente 4p di esso secondo termine  $-4\sqrt{\frac{q}{6}}$ , come si è enunciato nella prima proposizione. E sacendosi  $8p^{2}-2qp+t=0$ , risulterà  $16p^{2}-4q-\frac{8t}{4p}$ , come si è recato nella seconda.

II. Verso il 1781 occupossi il prelodato P. Giammaria della Torre a investigare il modo di correggere il disetto che nasce dalle lenti oculari, e produce consusione nella immagine dell'oggetto, il quale era stato abbandonato in mano degli ottici pratici come non dissielle a scansarsi. Il disetto che nasce dalla lente oggettiva, per l'abilità di Eulero, Clairaut, Dollon, Ramsden ed altri matematici, si tosse con far l'oggettivo acromatico. Adoperando due mezzi di refrangibilità diversa si è giunto a far sì che tutti i raggi della luce, che per la loro diversa refrangibilità si univano in varii punti dell'asse dell'oggettivo, si unissero in un sol punto, per formare l'immagine dell'oggetto ben distinta e senza colori. Il P. della Torre osservò che le

correzioni fatte nelle combinazioni di diversi cannocchiali del Dollon, del Naerne, di Beniamino Martins e di altri, non erano sufficienti a torre ogni disetto che nasce dalla combinazione delle lenti, e per conseguenza che non sosse da reputarsi di sì poco momento la correzione del secondo disetto de' cannocchiali. Quindi si presisse di tentarla, dopo avere esaminate le varie strade tenute da' mentovati celebri prosessori, e satte molte esperienze utili all'uso dei menischi invece delle lenti o semilenti adoperate dagli

artefici Inglefi.

" Per una lunga serie di osservazioni mi sono s egli diceva) afficurato della proprietà dei menischi, per le quali si rendono superiori alle lenti comuni, soprattutto allorchè due di essi posti in un bussolino si guardino colle loro convessità da dentro, e le concavità sieno di fuori, e tra di loro poco lontani. Questi menischi così situati piacemi di chiamare lenti a tamburo. Per avere un buon telescopio di sensibile ingrandimento, debbe l'oculare essere di picciol foco, o acuto. Se per far ciò si adopera una lente conveiso - conveisa, farà una notabile aberrazione di sfericità e di luce. Ad un oggettivo di palmi sei (1) se io voglio adattare una lente comune di un'oncia, il telescopio sarà oscuro, ed il campo pieno d'iride. Ma usando due menischi a tamburo, delle quali il soco sia di un'oncia o di cinque minuti, il cannocchiale farà lo stesso ingrandimento, sarà chiaro e senza iride, tanto perchè la convessità di ciascun menisco è unita alla concavità, quanto per la disposizione delle lenti a tamburo che vedremo indi a poco. Anzi con queste avrassi maggiore ingrandimento

<sup>(1)</sup> Il palmo napoletano è di 1164 di quelle particelle, delle quali il piede di Parigi ne contiene 1440; cioè sa nove pollici, sei linee, e quattro decime. Dividesi il palmo napoletano in dodici once, e l'oncia in cinque minuti.

facendo il fuoco di ciascun menisco di quattro minuti. Ecco intanto i vantaggi che ricavanti da' menischi, e le loro proprietà dedotte da una lunga serie di esperienze e da' raziocinii fondati sulle leggi dell'ottica già dimostrate.

- 1. Ogni menisco raccoglie più lume della lente convesso convessa dello stesso suoco e della stessa apertura. E' noto in ottica che cadendo sulla superficie di qualunque lente raggi paralleli all'asse non tutti entrano nella lente, ma solo quelli che fanno un dato angolo colla superficie della lente, e gli altri foggiacciono alla riflessione. Questo dato angolo, se la superficie su cui cadono i raggi è convessa, formasi da essi più presto che se sia concava; perchè la natura della convessità porta che si discosti dall'asse, e la concavità che ad esso continuamente si accosti. Ciò è confermato dall'esperienza. Feci costruire un canocchiale con tre oculari a tamburo, cioè con sei menischi acuti, e due oggettivi a tamburo. I raggi di luce passavano per otto lenti, e ciò non ostante gli oggetti apparivano di un chiaro brillante. Ciascun oggettivo era palmi sette di foco, e la prima oculare vicino all'occhio composta di due lenti a tamburo avea di foco un' oncia e mezza.
- e nel tempo stesso si ha molto ingrandimento, e si evita l'aberrazione, perchè ciascun menisco non ha molta convessità, e ciò viene confermato dall'esperienza.

3. Le lenti menische poste a tamburo ingrandiscono molto il campo del cannoechiale; perchè i raggi di luce nell'entrare la cavità divengono divergenti, come confermano

varie esperienze.

4. I fili incrociati ad angoli retti che si pongono nel soco dell' oculare, compariscono curvi con una lente convesso - convessa, ma con due menischi a tamburo si vedono diritti, come porta l'osservazione. Questa scoperta de' fili diritti la debbo all' Ab. Hell astronomo di Vienna, al quale nel 1765 io comunicai i vantaggi delle lenti a

# XLIV STORIA

tamburo, ed egli ne fece menzione nell'operetta del Satellite di Venere, e lo confermò nel 1766 in una lettera che mi scrisse.

5. I menischi a tamburo tolgono la doppia aberrazione. L'esperienza è facile a farsi. Si pigli una lente convetso convessa e si guardi con essa un oggetto, si vedrà distinto solamente verso il mezzo dell'oggetto, e nel contorno sarà confuso, e questa confusione sarà tanto maggiore, quanto più acuta farà la lente. Si prendano due menischi a tamburo dello stesso foco della lente, si vedrà tutto il campo distinto dell'oggetto. Se i due menischi pongansi in modo che colle loro cavità si tocchino, e formino per ciò una sola lente, tornerà a comparire la consusione. Sembra che tal fenomeno possa così spiegarsi. Due menischi a tamburo formano una lente cavo-cava, o un prisma sferico con due facce cavo-cave, colle quali non solo si sciolgono i raggi ne'loro colori, ma nel tempo stesso sciolgonsi le immagini laterali alla primaria immagine che per la loro obliquità non si sono unite all'asse, ed equivalendo ad una lente convesso - convessa riduce tutti i colori e le immagini ad un foco comune nell'asse, e così toglie ogni confusione ed iride dell'immagine principale. Meritano però queste rissessioni di essere ben ponderate, e se occorre di essere anche al calcolo sotroposte (1).

Additati i vantaggi dei menischi a tamburo nei tubi ottici, non è dissicile il costruire un telescopio. Essendo questo composto di due lenti oggettiva e oculare, che hanno un soco comune, ad una estremità del tubo pongasi un oggettivo semplice, o acromatico, e all'altra estremità

<sup>(1)</sup> L'intera teoria delle lenti a tamburo che debbono sormare un prisma sserico, si deduce dalle osservazioni satte dal Newton nella P. I del Lib. II dell'Ottica, ove egli esamina i colori diversi, nei quali si sciolgono i raggi di luce che cadono sopra due oggettivi convessi soprapposti che si tocchino o no, e che questi raggi abbiano varie obliquità.

verso l'occhio si pongano due menischi a tamburo. Nel soco comune dell'oggettivo e dell'oculare pongasi uno spezzaraggi, o diaframma proporzionato, e si avrà un ottimo telescopio. Il soco dell'oculare, l'apertura dell'oggettivo e del diaframma, saranno dall'esperienza dissiniti, secondo che saranno più o meno ben lavorati l'oggettivo e i due menischi.

La seconda specie de tubi ottici è di quelli che di consi comunemente cannocchiali. Il telescopio ha una sola oculare per cui fa l'oggettivo a rovescio, e se vi si aggiungano due altre oculari che sieno soli menischi o a tamburo. farà gli oggetti diritti, e servirà perciò per gli oggetti terresii. Le altre oculari poste a certe date distanze formano quella che dicesi combinazione. Questa può farsi con tre, con quattro, e con cinque lenti, contandovi quella che è all'occhio vicina. Anche per formare la combinazione fa mestieri esaminare la strada che sa in essa il lume (1). Nel fare la combinazione folamente, la lente all'occhio si faccia con due menischi a tamburo, le altre oculari sieno menischi semplici che rivolgono all'occhio la concavità. Se la combinazione è a tre lenti, pongansi combinate a due a due nel punto di massima distinzione dell'oggetto che si guarda, o che è lo stesso, distanti tra di essi la somma dei loro fuochi. Il fuoco della prima oculare, che è a tamburo, dee dissinirsi dall'esperienza, secondo la loro bontà e quella dell'oggettivo. Per esempio il foco dei due menischi a tamburo è stato da me satto alle volte di tre minuti per un oggettivo di tre palmi, sì che il foco di ciascun menisco era di minuti sei. Questo ancora era il

<sup>(1)</sup> Le regole per fare la combinazione con profitto sono state tratte dalle combinazioni di cannocchiali di varie lunghezze satti da Dollon e da Ramsden. Molti lumi ne ha somministrati la propria esperienza e la dissertazione del Sig. Ludlam.

T: O R IXLVI foco della seconda e della terza lente. Nel soco della prima oculare si ponga un diaframma con un'apertura che sia 2 di quella delle lente. Nel soco esteriore della terza lente si ponga un altro diaframma, la di cui apertura sia minuto  $1\frac{1}{2}$ . Essendo così stretto non vi è pericolo che levi il campo ed il lume, perchè ponendolo nel foco comune della terza lente e dell'oggettivo, qui il cono radioso è stretto e minore di un minuto e mezzo, onde liberamente vi passa. Se la combinazione è a quattro o a più lenti, bisogna attentamente considerare la strada che sa in esse il lume quando i raggi sono paralleli, o convergono a un fuoco, quando sono divergenti ec. La situazione della lente prima, seconda e quarta, è arbitraria, quella della terza è limitata, e l'esperienza la diffinisce. Tutte per lo più si pongono dentro soco, come nella combinazione a tre lenti si pongono nel loro soco o punto di massima distinzione dell'oggetto. Debbesi in oltre nel situare le tre lenti già dette offervare che siccome i raggi entrano nell'oggettivo paralleli tra loro e all'asse, così escano ancora dalla prima oculare. Questa sola dee essere di due menischi a tamburo, e le altre tre lenti sieno menischi semplici da situarsi nei buffolini in modo che rivolgano la loro cavità verso l'occhio. Gli artefici Inglesi fanno le lenti piano-convesse col piano all'occhio; io pongo menischi per li molti vantaggi surriferiti, Quando dico artefici Inglesi, non intendo puri ottici pratici, ma quelli che tra i pratici sono bene intesi della teoria dell'ottica, come sono i soprallodati. Questo è quanto ho faputo raccorre e sperimentare per correggere i sensibili difetti dei cannocchiali che nascono dalla loro combinazione" Così il nominato Accademico.

Approvavansi dall' Accademia le utili mire del lodato Fisico in cercare di togliere da' cannocchiali il disetto di ssericità che in essi perturba la nitidezza e la terminazione desli oggetti. Mail Socio Don Vincenzo Mazzola destinato a verificare: l'esperienze metteva in idubbio il utilità di rendere i tubi costrutti nella guisa indicata più luminosi e liberi da iride. Il Pensionario Marzucco Aimava parimente non del tutto soddisfacenti le di lui esperienze, è insinuava che l'Accademia si assicurasse del valore de'menischi in comparazione delle lenti acromatiche. Il Socio Sig. Fergola efigeva che si reiterasses l'esperienze per verisseare per applicandosi ai tubi ottici le oculari a tamburo, si migliorasseso effettivamente nel campo, nell'ingrandimento, nella chiarezza e nella terminazione. Soprattutto inculcava che la proposta ... invenzione si rendesse universale cossa scienza del calcoto Jule tracce di Eulera, Chirant pe d'Alembert, Dollon, Rameden, ed Hennert, il quale molté vevirà ha suggerite sulle combinazioni dei cannocchiali acromatici ithustrandole coll' analifi.

Dot Giuseppe Grippa Regio. Professore di sinca in Salerho noto i per altre produzioni scientifiche: Egli imprese a calcolare geometricamente le Volte oblique, e singolarmente quelle a spira. L'Accademia comendo principalmente nella sua Memoria la guisa di determinare la solidità di qualunque volta a spira. Eccone la soluzione:

Se la figura qualunque edef con moto equabile si aggiri T. II. intorno ef è nel tempo stesso salga esso lato equabilmente per la verticale AB, il solido generato dalla superficie di questa sigura dirassi volta a spira, la superficie generata dalla linea se superficie a spira, e la linea a doppia curvatura descritta da un punto qualunque di essa sigura, p. e. dal punto e, si chiamerà linea spiralocilindrica. In oltre la verticale AB si dirà asse della mentovata volta: la sigura edes generatrice della medesima: il cerchio che si può considerare descritto in un piano orizzontale della rivoluzione della perpendicolare che dal punto e si può tirare sull'asse, si dirà base della spira. E sinalmente numeratrice della

XLVIII WAT OF RIGHT

spirale sur quelle venticale, che s'inalus fiall'infino panto di essa per tutta la sua alsenza. Quindi si ritera che se la generatrice della volta è un rettangolo odos, ile superficie T. Il. a spira descrime dai lati se, ad esser debbono parallele, viguali, simili, e fimilmente posse. Diezsi do stesso delle liner spiralocindriche descritte dai punti e, d. Ciò posto prima di venire alla misura generale della sosidità delle velta a spira, si determini da solidità del solidio spirale generato da un rettangolo.

T. III. Sia GHIKBADC una porzione qualunque di solido a Fig. 2 spine generato dal rentangolo CBAD, dico, che se questo nettangolo si sa aggirare sintorno a GD, descrivendo la ponzione del cilindro retto CDABS F compresa sua medesimi piani verticali che la sudetta porzione di cilindro spirale, dovrà sempre essere la porzione della volta a spira uguale alla porzione del cilindro retto.

Dimoft. Essendo ugualir e fimilir i due rettangoli CDFf. GHIK, uguali e fimili faranno altreni gli altri due DFIM. CfKG. In ohre effendo FI uguale ad fK. Farce vireobne FA parallelo, uguale e fimile all'arco Bf. e la curva Sparale Al parallela e menale e fimile salta seurvas DES; ed atlando altresi i due fenneri einsolari FDA, fCB paralleli, uguali e fimili, come pure parallele, uguali e similir estindo le due superficio a spina HIAD: GKRC : fazamos d solidi HIADE, GKHCf uguali fira loro perchè terminasi de ugual numero di lati, ciascuno uguale, simile e similmente posto a enelauno. Ora le di liffatti solidi si tolganil solido di life, e se a residui se aggiunga il solido Cista D resminato dal vettangolo generatore ADCB, dalsfettore circolare CAB, dalla perzione di superficie a spira CIAD, a dalla poszione di superficie cilindrica: IBA: se otterrà la perzione del felidera Pira GHIKBADC uguale alla corrapondente purzione di ciliadeo rette. Chapter. Cata Dia el colles de suse al la colles

Committee Committee Chindis (Tonitie Ag. of )

Onindi è che potendosi qualunque figura mistilinea cdef. concepire risoluta in infiniti rettangoletti evanescenti, faranno tutte le porzioni de' folidi a spira generati da fiffatti rettangoletti uguali rispettivamente alle corrispondenti porzioni de' cilindretti da' medesimi descritti. Ma i primi folidetti a spira compongono l'intero solido a spira generato dalla figura mistilinea c d e f, ed i secondi cilindretti compongono il folido generato dalla rivoluzione della nominata figura intorno ad AB. Dunque sarà ancora una porzione qualunque di solido a spira generato dalla figura cdef uguale al corrispondente solido descritto dalla rivoluzione della medefima figura intorno a cf. E perciò la cubatura de' solidi a spira si rimette alla cubatura dei folidi generati dalla rivoluzione di una figura intorno al proprio asse, cosa di si ovvia determinazione.

Dalle additate cose deduce immediatamente il Signor Grippa il metodo da tenersi nel misurare la solidità delle

volte a spira.

2. Dal punto dove comincia la spira si tiri una verticale per tutta l'altezza della volta, cioè s'innalzi la numeratrice

della spirale.

2. Si offervi quante volte la spira col suo raggiramento ritorni nella numeratrice, e dirassi essere la volta di una di due, di tre, o di più spire, secondochè una, due, tre, o più volte ritorni in eisa numeratrice.

3. Se mai la spira non finisca esattamente nella numeratrice, ma quella oltrepassi, si tiri pel punto ove finisce un'altra perpendicolare all'orizzonte, e si osservi fra la numeratrice e la perpendicolare tirata, quale arco del cerchio ch' è la base della volta, si frapponga.

4. Si determini la solidità del solido generato dall'intera rivoluzione della figura generatrice intorno al suo lato verticale, e poi si prenda una, due, tre, o più volte, secondoche di una, di due, di tre, o di più spire sia la

volta formata, e se il caso lo richieda, aggiungasi di più per rispetto all'intero cerchio, una parte aliquota simile a quell'arco compreso fralle due sudette verticali. La somma farà la solidità richiesta della volta.

Meritava quest' interessante lavoro ulteriori cure della Accademia per determinare compiutamente la misura di fimili volte in quanto concerne la superficie; ed infatti nel 1785 ad insinuazione dell'attual Segretario Napoli-Signorelli animaronsi alcuni valorosi Socii ad investigare la vera misura delle volte a spira, siccome si vedrà nelle Memorie inserite nel presente volume.

IV. D'interessanti notizie non meno che di erudizione e di vantaggiose mire patriotiche ricolma su la dotta lezione dell'Accademico Pensionario e R. prosessore di botanica Don Vincenzo Petagna comunicata all' Accademia nel 1781 intorno alla salicornia, pianta che occupa il suo luogo nella prima classe del sistema de' vegetabili di Carlo Linneo.

Osserva alla prima il nostro Accademico che il nome di salicornia non si rinviene appo gli antichi, e che si vede usato dopo che gli Arabi passati in Europa insegnarono la maniera di cavare il sale alcali da alcune piante quivi trovate, chiamandole col nome generico di kali (1). Specificandosi poi questa voce, la più usuale di quelle piante ritenne il vero nome di kali, la quale corrisponde all'odierna salsola de' botanici; ed altre al kali aggiunsero altri nomi, onde fra loro si distinsero; ed infatti la salicornia si diste kali geniculatum, che passò poi a formare un genere distinto dalla salsola sotto il vocabolo di salicornia.

<sup>(1)</sup> La voce kali trovasi in Avicenna e in Serapione il giovane autori del secolo XI. Dalecampio rapporta che da' Mauritani si dissero kali alcune piante, dalle cui ceneri cavavasi il sale alcali, o salcali; soggiugnendo che i Greci dei bassi tempi, gli Arabi ed i chimici surono i primi a sar conoscere tal proprietà di quelle piante.

Le piante dagli Arabi notate col nome generico di kali, e conosciute proprie per dare il sale alcali, sono: 1. la salsola, della quale si riconoscono più specie, e segnatamente la soda dissinita dal Bahuino kali majus cochleato semine, e la sativa detta kali minus; 2. la salicornia ora conosciuta sotto due spezie, cioè erbacea e fruticosa; 3. il mesembriantemo pianta propria dell' Egitto (1) distinta dal Linneo coll'aggiunto di nodissorum, che è quella che nasce nella spiaggia di Possipo e in abbondanza nella parte meridionale dell' isola

d'Ischia descritta dal nostro Fabio Colonna (2).

Atte sono le due nominate spezie di salicornia a dare il sale alcali. Ma sono esse infatti due spezie differenti. come sospetta il Linneo, ovvero due varietà di una medesima pianta, come dal Bahuino, dal Tournefort e da altri si giudica? Il nostro Accademico crede che sieno due varietà derivate dalla natura del suolo, e che la stessa pianta nei terreni inondati nell'inverno, forga da' semi nella primavera, e diventi perenne nei terreni asciutti. Datane indi, dopo del Baster, un'acconcia descrizione in Italiano, rileva che tal pianta s'incontra, in abbondanza nei terreni vicini al lido del mare che inondati sono dalle acque delle piogge che vi ristagnano, e dal mare nelle sue escrescenze che del luo sale ricolma quelle terre e le rende atte alla vegetazione della salicornia. Tali sono i contorni del Mar Morto di Baja, del lago del Fusaro e di Licola a piè dell' antica Cuma, il qual luogo copre un pezzo della via Domiziana, e del lago di Patria, e così andando oltre per tutto il littorale sino al Garigliano, luoghi ripieni di questa pianta. Dall' altro lato fuori Salerno per Eboli infino "a Pesto coperte della medesima trovansi tutte quelle paludi accanto. al mare. Ben può dunque dirfi, la salicornia nostrale, nastendo nei nostri paesi senza veruna cura.

<sup>(1)</sup> V. Hassequistie Iser Palaestinum, e Prospero Alpino de Plant. Egypt.

<sup>(2)</sup> Ecpbr. II. Kali aizoides Neapolitanum repens.

Ma un poco di studio la farebbe facilissimamente moltiplicare. Gli Spagnuoli la seminano di primavera, e quando è giunta alla naturale altezza verso il terzo mese, la mietono, la seccano alla foggia del fieno, e la bruciano (1). Perchè la stessa diligenza non usasi dai nostri, per corne una quantità sufficiente ad un vantaggioso commercio? Non è la cenere della falicornia una foda non inferiore a quella della salsola? Non adoprasi tal cenere alla sabbrica del sapone ed a sondere le materie atte a vetrisicarsi? In medicina non serve alla preparazione di alcuni sali? Forse che in altre regioni non si ha cura di apparecchiar la soda anche da altre piante e di approfittarsene? In Normandia la soda si apparecchia da alcune piante marine del genere del fuco, e si dice soda di Varech (2). Gl' Inglesi hanno cominciato a far uso della quercia marina, pur anche spezie di fuco (3), riducendola in cenere ed impiegandola pel vetro e pel sapone (4). In Ispagna preparati dalla salsola, per sentimento di Justieu (5), e dalla salicornia erbacea, secondo Baster, e la più fina chiamasi soda di barilla e la comune di bourdine, ed Alicante ne produce dell'ottima con gran profitto. In Sicilia fassi dalla salsola detta sativa, e porta il nome comune di soda. In Egitto, a' tempi di Prospero Alpino (6), se ne faceva un gran commercio co'Veneziani.

Da queste ed altre non ignote verità, sulle quali piacque di proposito al Sig. Petagna stendersi alquanto per renderse sempre più comuni fra noi, passa ad aggiugnere alcuna cosa

<sup>(1)</sup> Baster Opusc. Subsec. t. II, l. III.

<sup>(2)</sup> Du Hamel di Monceau trat. degli alberi art. Olea, e Diz. Chim. del Macquer v. Varech.

<sup>(3)</sup> Gmelin. Hift. Fucor.

<sup>(4)</sup> Gugliel. Borl. (Observ. on the anc. and pres. stat. of the Islan. of Scylli) riserisce il modo di cavare dalla stessa il sale, aggiugnendo che nel 1751 l'introito passava di 5000 siorini.

<sup>(5)</sup> Act. Paris. an. 1777.

<sup>(6)</sup> De Plan. Egypt.

sulla natura del vetro e del sapone. - Con vasta erudizione trova egli notizia dell'arte di fare il vetro (oltre delle gemme false e de'vasi murrini) tra gli Egizii e tra'Greci. I primi de' Latini a parlar del vetro furono Lucrezio Caro e Cicerone in pro di Rabirio Postumo. Plinio ci ha conservata la tradizione della prima invenzione del vetro. e ci dà motivo di conchiudere che sino all'età sua altro fondente della terra vetrificabile non conoscevasi fuori del nitro. Tacito ci fa sapere che l'arena da far vetro si prendeva dalle foci del fiume Belo (1). Simile arena-formiva ancora la nostra spiaggia che è tra Cuma e Linterno (2) corrispondente al tratto di lido posto dal lago di Patria a Cuma, offervandosi oggi ancora quell'arena di color bianco mobilissima fornita di tutte le condizioni della terra vetrificabile. Posta tale arena all'esame il Sig. Petagna verificò quanto Plinio di essa racconta. A primo aspetto sembra tutta bianca, come dice il latino naturalista, ma esaminata attentamente si vede composta di particelle di basalte di vario colore, ma per lo più bianco, di terra calcaria, e di picciole scorie vulcaniche quasi ritonde. Collo spirito di nitro formenta la parte calcaria: posta ad un suoco violento si raresa, e si vetrifica la parte basaltica ch'è la più abbondante, ed unita alla soda comune passa in eccellente vetro. Quindi può dissinirsi: arena mobile basaltica calcaria & indeterminata figura con iscorie vulcaniche. Simile arena composta di puri basalti osservasi nell'opposto lido dell'isola d' Ischia.

Da quanto il dotto Accademico divisa sulla salicornia, e sul vetro e sul sapone che sormansi dalla soda delle di lei ceneri, come ancora sull'arena di Cuma e Linterno mentovata da Plinio e da lui analizzata, deduce che di sommo vantaggio

<sup>(1)</sup> Historiar. lib. I.

<sup>(2)</sup> Plinio lib. XXXVI.

farebbe la coltivazione della salicornia e della salsola, perchè occupando terreni inetti ad alimentare altre più utili piante, sornirebbero un capo di commercio non più fra noi avvertito, e che apprestandoci la spiaggia di Cuma e Linterno l'arena descritta, potrebbe, senz'altro straniero soccorso, formarsi il vetro.

V. L'anno 1783 il Socio addetto alla seconda classe Don Antonio Sementini R. Cattedratico nell'Università degli studii instrui la Reale Accademia delle sue osservazioni fatte interno allo sfintere della vescica orinaria, le quali confermano sempre più le descrizioni datene due secoli fa dal Fallopio. e nel nostro secolo dal Santorini e dal Morgagni. Nè Galeno, nè Vesalio (egli diceva) aveano data ragionevole idea della fabbrica della vescica orinaria. Fu l'Italiano Fallopio il primo a conoscere che la vescica dovesse avere uno sfintere dietro la prostata e nel principio dell'uretra. Ei confessò frattanto di non avervelo veduto intero, ma solo alcune fibbre carnose di esso traverse nascoste nella parte davanti tralle fibbre diritte. Questa descrizione cui manca certa precisione e chiazezza, su pure adottata da valorofi notomisti, e specialmente dal Fantogo, Bahuino e Covvper, senza che venisse migliorata, nè descritta in modo che vi si potesse sondare una filosofia chiara della funzione di questa parte. Il Morgagni (aggiungeva il Sig. Sementini) uomo in cui l'amor di questa scienza, la tolleranza del travaglio, la consumata destrezza, ed il più ingenuo candore concorrevano a costituirlo un notomista eccellente, diede ben fondata speranza di ridurre a perfezione questa dottrina anatomica. Nel terzo de' suoi Avversarii Anatomici riprendendo l'audacia del Mangeti che avea negata l'esistenza dello sfintere della vescica orinaria descritto dal Fallopio, dice di averlo egli stesso veduto e fatto ad altri vedere. Non ne diede però in tal luogo una descrizione precisa, secondochè si sarebbe desiderata. Ed in una delle due lettere posteriori agli Avversarii scritte a proposito della storia del segato del Bianchi, facendo menzione della fabbrica del collo della vescica orinaria a proposito dello ssintere, affermò di aver veduto alcune delle sibbre diritte nelle vicinanze della prostata incurvarsi per li lati senza potersene distinguere il camino più innanzi, e che altre volte gli è paruto di vedere altre sibbre al di sotto della cervice della vescica piegate in sorma di arco colle corna volte in sui; e conchiuse in guisa di uomo che dubiti prudentemente, che egli avrebbe sorse esposte queste cose con chiarezza maggiore dopo averle conserite con maggior numero di libri anatomici e di cadaveri. Or non avendo egli stesso rendute più chiare le idee del Fallopio intorno allo ssintere, non è maraviglia che successivamente siasene negata l'esistenza, o che sia stato descritto e considerato come una parte incerta e di lieve momento dal Winslon, dal Pallucci, dal Lieutaud e da altri.

Aspirando intanto il Siz. Sementini al pregio, se non di stabilire una ignota verità, almeno di vendicarla dalla incertezza che l'adombra, secondo i dettati d'Ippocrate (1) e del medefimo Morgagni che affermava esser degno di ugual lode chi trovaise cose nuove e chi rettificasse le già note nella fabbrica del corpo umano, dopo l'esame di quanto n'è stato detto da valenti anatomici, e di quanto ne mostra il libro infallibile della stessa natura, cioè dei cadaveri. intraprese una descrizione più precisa dello sfintere della vescica orinaria. Dice dunque che , nella veste puramente carnosa che copro interamente la vescica, debbono riconoscersi due piani, 'o strati, giacche l'esterno non si può senza oltraggio del vero confondere coll'interno. Il primo ha una origine tutta fingolare, nascendo le sue fibbre che sono per breve tratto tendinose, dalla faccia esterna della sincondrosi del pube e da'lati di questa disposte in una serie semicircolare. Divengono queste fibbre carnose nel buttarsi sulla parte

<sup>(1)</sup> De Arte in princ,

superiore e sopra i lati della prostata per quindi continuarsi sulla vescica, e queste da tutti si dicono sibbre longitudinali o diritte della vescica, L'altro strato è fatto di filamenti che non serbano alcuna determinabile direzione, ma disposti per tutti i versi ed unendosi in varie guise formano una specie di stretta rete, come da' notomisti è stato detto. Continuazione di questi sono que'fili che in varie direzioni tipiegandofi nel contorno del collo della vescica e del principio dell'uretra, rendono quetta sede più carnosa delle altre, e formano lo sfintere che oggi è comunemente ricevuto, e che di questo nome non è punto degno. Alcuni di questi fili accompagnano il canale membranoso, che continuandosi alla tunica intima della vescica, va a formar l'uretra, ed essi sono numerosi quanto basta per coprirne tutto l'ambito. Non si può dir pertanto che tutti que' fili che sormano lo strato interno reticolato si prolunghino in questa guisa, guardandosi al copioso mezzo di questi, e allo scarso di quelli. Or la parte de'fili che si allunga insieme coll'uretra, non appartiene a quest'oggetto; ma gli altri del medesimo strato interno terminano nella veseica, e scambievolmente intrigandosi servono di punti di attacco, e tutto il di loro tessuto si sostiene da una tela cellusosa bastantemente stretta, che su di tutti si distende, e tutti lega tra loro.,

"Dalle additate condizioni risulta doversi questi due strati di sili carnosi distinguere fra di loro. E maggiormente a ciò sembra determinare un terzo piano di sibbre che sono espressamente circolari, e circondano il principio dell'uretra, e sono frapposte agli accennati due strati. E' questo piano un vero ssintere di questi apertura. E' largo un terzo di pollice a un di presso, ed ha sorma di un cono troncato nella punta, e la parte più larga è in dietro e guarda il cavo della vescica, e da questa parte il suo lembo estremo è contiguo a quelle sibbre traverse che s'inarcano variamente in questa sede e si ripiegano. I notomisti vedranno, se questo muscolo sia lo ssintere descritto da Fallopio, intanto

che si afferma soltanto che da questo vengono divisi i due strati già detti in guisa che oramai il consonderli sarebbe lo stesso che opporsi di proposito alle cose più chiare. Ma se è ingiurioso al vero negare l'esistenza dello ssintere della vescica ne'maschi, assai più lo è il negarlo nelle semmine; poichè in queste la natura ha provvidamente prolungato lo ssintere per tutta l'estensione dell'uretra in esse assai corta, la quale, malgrado del silenzio di tutti gli anatomisti, è chiaramente corredata per tutta la sua lunghezza di sibbre circolari oltre delle longitudinali.,

Passa indi il Signor Sementini ad additare la guisa da rendere manifesto siffatto muscolo acremente negato da molti. " Avendo svelta (soggiugne) dal cadavere la vescica orinaria e l'uretra, apro la sommità di quella e la rovescio, ficchè venga al di fuori la di lei faccia interna, e fituando immobilmente la prostata in maniera che mi stia sotto l'occhio il principio dell'uretra e il suo contorno, taglio con mano sospesa intorno alla medesima imboccatura la membrana intima della vescica, indi seguito a spezzare a piecola profondità le fibbre carnose dello strato interno che in questo luogo occorrono, e staccando indi pazientemente attorno le parti incise, mi si fa presente un piano di fibbre carnose circolari concentriche, delle quali le interne sono così larghe che abbracciano immediatamente la membrana che ha già acquistato la forma di canale, e va ad immergersi nella prostata, e. l'esterne sono successivamente più larghe. S' intende facilmente che questa forma piana di fibbre circolari si dee al sito sforzato che si è dato alla vescica. ma che nella di lei posizione naturale debba questo piano esser disposto nella forma di un cono già descritto ... Conchiude combattendo vittoriosamente contro del recente notomista Francese M. Lieutaud che con una specie di fasto ha negato l'esistenza di un muscolo sfintere nella vescica. provando contro il di lui avviso che la potenza dello sfintere non ripugna alla facoltà della vescica.

### LVIII STORIA

VI. Il Pensionario della III classe Don Salvadore Aula, mancato l'anno 1784, avendo riguardo alla solida utilità che apporta agli stati l'agricoltura, per utile esercizio prese a ragionare dello stato di questa sorgente di ricchezze nelle antiche età di Roma, e ad investigare, per quali vie quivi

fosse pervenuta a tanta dignità e persezione.

Il fondatore (egli diceva) e primo re di Roma ingiunse alla minuta gente la cultura de campi per tenerla utilmente occupata e per trovarla poi nerboruta e valida per uso della milizia, riunendo in essa ambedue i mestieri, il contadinesco ed il militare (1), e così ebbe, secondochè di que' tempi disse Catone (2), robusti e duri coltivatori e fortissimi soldati. Numa Pompilio alla vigilanza di Romolo muove provvidenze aggiunse, ed avendo diviso il territorio Romano in varii contadi, assegnò a ciascuno di essi un sopraintendente del numero di coloro che detti furono latinamente magistri pagorum, ingiungendo loro di offervare lo stato della cultura delle terre e di riserire quali fossero malamente e quali ben lavorate, affinchè in seguito potesse egli animare i campagnuoli diligenti, e riprendere e stimolare gli infingardi. Per la qual cosa, al riferir del medesimo Dionigi, quanti cittadini trovavansi sgombri di affari civili e militari, davanti comunemente a lavorar colle proprie mani i terreni, per iscansar la taccia di poltroni, il che riusciva di gran vantaggio ai campi, di onore alla coltivazione e di fesempio ed emulazione a' convicini. Anco Marzio avendo offervato che molti per soverchia affezione all'arte militare ed al guadagno che loro ne ridondava, aveano abbandonata l'agricoltura, convocò il popolo a parlamento e cercò rimenarlo al primiero tenor di vita.

<sup>(1)</sup> Vedi Dionigi d'Alicarnasso lib. 11, cap. 73.
(2) De Re Rustica sul principio: Ex agricolis vivi sorvissimi, & milites strenuissimi gignuntur.

Non fi rallentò lo studio della coltivazione in tempo della Repubblica. I Censori invigilavano assinchè le campagne non rimanessero inculte e abbandonate (1) sotto pena della perdita de' privilegii di cittadino, che tralle pene censorie era la più enorme e la più sensibile ad un Romano. Osservisi parimente il conto che facevasi in Roma dell'agricoltura in ciò che Plinio racconta, cioè che il Senato Romano, dopo la presa di Cartagine, avendo donate diverse librerie, che facevano parte del bottino, ad alcuni regoli dell'Affrica, ritenne foltanto ventotto volumi composti da Magone generale Cartaginese di cose attinenti alla coltivazione ed ordinò che si traslatassero dalla lingua Punica alla Latina (2); e pure eravi già in Roma la celebre opera de Re Ruftica di Catone. Grande per ciò fu l'ardore dei nobili e dei plebei con cui applicaronfi a lavorar le terre. La plebe che per la maggior parte viveva nei contadi, era in tal guisa alla coltivazione intenta, che non vedeva la Città, se non se ogni nove giorni per far provvisione del bisognevole al mercato. Nè anche sdegnavano i nobili di attendere ess. stessi a lavorar la terra. Quindi è che Ovidio cantava (3):

Iura dabat populis posito modo Prator aratro,

ed altrove (4):

Et caperet fasces a curvo Consul aratro.
Si sa che Lucio Quinzio Cincinnato fatto console quando tal dignità a' soli patrizii conferivasi, cioè nel 292 di Roma, assunto alla Dittatura su da' Deputati del Senato trovato inteso a rustico lavoro in quel suo poderetto di quattro jugeri che possedeva di là dal Tevere detto Prata

<sup>(1)</sup> Aulo Gelho lib. IV, c. 12.

<sup>(2)</sup> Hist. Nat. lib, XVIII, c. 3.

<sup>(3)</sup> Fast. lib. I.

<sup>(4)</sup> Fast. lib. III. Vedasi anche Cicerone nella disesa di Roscio.

Quintia, nome che pur oggi ritiensi in Roma nel luogo volgarmente chiamato i Prati. Attilio Regolo mentre seminava ebbe l'avviso di essere stato promosso al consolato, onde ne acquistò il cognome Serano (1). Nè Cincinnato, nè Attilio occupando le prime cariche della repubblica obbliarono gli esercizii campestri; l'uno deposta la Dittatura ripigliò gli stromenti rusticali, l'altro lasciato l'eburneo bassone consolare tornò all'aratro. Cajo Fabrizio poichè ebbe discacciato Pirro dall'Italia e Curio Dentato soggiogati i Sanniti, deponendo il bassone di generale, si diedero a coltivare que sette jugeri di terra che nella comune divisione erano a ciascuno di essi toccati.

Non si tennero lontani dalla coltivazione i Senatori che il supremo consiglio di Roma e di tutto il mondo componevano, i quali per lo più viveano in campagna donde venivano richiamati dalle pubbliche urgenze nella città per mezzo di alcuni particolari ministri detti dal loro ussizio viatores (2). E quì non è suor di proposito osservare che i Senatori che aggiunsero un'idea tanto onorevole all'esercizio campereccio, riputarono disdicevole alla loro dignità l'esercitare un trassico mercantile (3). Felice agricoltura, o per meglio dire felici i popoli dove era l'agricoltura a tal segno accreditata, che non disdiceva a' generali, a' magistrati, a' senatori!

<sup>(1)</sup> Plin. Hift. Nat. lib. XVIII, c. 4-

<sup>(2)</sup> Vedasi ciò che de' Senatori dediti al lavoro delle terre cautò Silio Italico Punie. lib. 1:

<sup>...</sup> Hirtaeque comae, neglectaque mensa, Dexteraque a curvis capulo non segnis aratris.

<sup>(3)</sup> Tito Livio riferisce nel lib. XXI, c. 63 che per la legge del Tribuno della Plebe Quinto Glaudio fatta nel 535 non era si Senatori permesso di avere alcuna nave che portasse più di trecento ansore. Id satis babitum (aggiugne) ad frustus en agris vestandos: quaestus omnis Patribus indecorus visus est.

Che maraviglia è poi che le Romane campagne fiorissero allora oltre ogni credere? A questo credito che vi godeva l'agricoltura, attribuisce Plinio la fertilità di quelle campagne la quale infatti era tale, che rare volte Roma pati scarsezza di viveri (1). Ciò confermasi con quella Ressa carestia e same che talvolta affiisse la città, scorgendosi dagli storici Livio e Dionigi, che eccetto qualche straordinaria intemperie di cielo, non da altra cagione provenuta fosse la penuria, che dall'aver i campagnuoli per qualche accidente o guerra, intermeila alcun poco la cura dei campi. Così avvenne nell'anno di Roma 261 per la ritirata della plebe ful monte sacro: nel 276 per le turbolenze della guerra Etrusca: nel 299 pel desolamento cagionato dalla peste nei villaggi: nel 437 per la seconda guerra Cartaginese. Dai quali casi deducesi che non sir sarebbe in Roma quasi mai provata penuria, se il nobile genere di coltivatori noa avesse mai lasciato il governo delle campagne.

Questo si ravvisò con maggiore evidenza allorche cambiatosi l'ordine delle cose passò l'agricoltura in mano degli schiavi, e si videro per le terre Romane sabbricati gli ergastoli inselici ricetti di quei miseri condannati al penoso lavoro. Da allora Roma che si era mantenuta sempre coi proventi delle proprie campagne, trovandosi in incessanti strettezze, su astretta a cercare dai paesi stranieri la propria sussistenza. Da allora, giusta l'espressione di Varrone (2), "avendo i nobili sdegnata la salce e l'aratro, in vece di muovere le mani nella messe e nelle vendemmie cominciarono a muoverse nel teatro e nel circo, e per conseguenza sunesta di ciò or conviene noleggiare chi dall'Affrica e dalla Sardegna ci apporti del frumento per satollarci, e da Coa e da Chio del vino per dissetarci (3).

<sup>(1)</sup> E' degno di osservarsi il passo del libro XVIII; c. 4

<sup>(2)</sup> Lib. II.

<sup>(3)</sup> Simile doglianza faceva pure Columella nella prefazione del Lib. I: In boc Latio & Saturnia terra, ubi Dii cultus agrorum progeniene

Da allora soffrironsi più frequenti e più gravi le carestie, quale su quella dell'anno 693 allorchè ritornò dall'esiglio Cicerone, per cui si conserì a Pompeo una potestà assoluta per cinque anni coll'assistenza di quindici Legati per rimettere nella città l'abbondanza (1); e sotto Augusto bisognò ancora che il popolo gli offerisse la carica di Presetto dell'annona (2), la qual carica in seguito divenne ordinaria e perpetua, non cessando i bisogni; e lo stesso Augusto per rendere l'Egitto più serace e più atto a sornire alla Città l'annona necessaria, sece purgare dal molto limo invecchiato le sosse preparate a ricevere l'acque del Nilo (3). Da allora in somma convenne ai Romani andare in giro mendicando vino e frumento, là dove nei tempi antichi, al dir di Plinio, sufficiebant fruges, nulla provinciarum pascente Italiam (4),

VII. L'eruditissimo Accademico Pensionario della III classe Don Gennaro Vico degno figliuolo dell'immortale autore dei Principii di una Scienza Nuova e suo successore nella cattedra di eloquenza nel Liceo Napoletano, prese in una dissertazione con piena erudizione e sina critica ad illustrar Pompei celebre città della Campania sepolta da diciassette secoli dalle ceneri del Vesuvio. Non ebbe per oggetto di adornar alcune delle discoperte parti di essa, ma di considerarla col solo lume degli antichi scrittori e di rilevarne le vicende. Saggio e modesso quanto sagace

anzi secondo Tacito (5), dai paesi Italiani provvedevansi

le provincie più lontane.

suam docuerunt, ibi nunc ad bastam locamus, us nobis ex trasmarinis provinciis advebatur frumentum, nec same laboremus, & vindemias condimus en insulis Cycladibus, ac regionibus Baeticis, Galicisque.

<sup>(1)</sup> Cic. ad Attic. lib. IV epist. 1.

<sup>(2)</sup> Dione lib. LIV.....

<sup>(3)</sup> Suet. in Vit. Aug. 18.

<sup>(4)</sup> Lib. VIII, c. 3.

<sup>(5)</sup> Annal. XII, 43.

osservatore, lontano da ogni ambizione di produrre cosa nuova in un argomento venerabile sol per la sua antichità, egli conseguì la rara lode di saper raccogliere con giudizio e disporre e combinare insieme con discernimento e dottrina quei languidi e dispersi barlumi lasciatici dai Greci e dai Latini intorno a sì samosa città, e di apportar somma luce e dar sembianza di novità alle sue erudite ricerche.

Accenna in prima che quanto furono note varie particolari produzioni di Pompei, tanto sconosciuta ne su l'origine anche agli antichi scrittori. Vitruvio, Columella, Plinio ed Ateneo parlano dell' eccellenza della pomice Pompejana, della terra chiamata puzzolana, della vite e del garo Pompejano. Catone stabilisce anche il prezzo a'famosi macinatori di Pompei (1) che a' nostri giorni si sono rimessi in uso in diverse regioni per opera di un mecanico industre artefice Napoletano addetto alla nostra Accademia. Niuno però c'istruisce della di lei fondazione. Giulio Solino soltanto che volle rintracciarla, si perdè nelle savose, affermando che Ercole di ritorno dalle Spagne menando in trionfo gli acquistati buoi, per memoria di tal pompa fondò Pompei dandole il nome dalla Greca voce πομπη. Quindi non badando egli a questo scrittore reputato anche da Scaligero di poco merito, e nulla potendo trarre nè da Dionigi d'Alicarnasso nè da Diodoro di Sicilia, passa a ciò che delle città marittime del nostro Cratere dal capo di Miseno a quello di Minerva accennò Strabone gravistimo geografo e delle antichità diligentissimo investigatore. Di tali città, alle quali quasi congiunte vedevansi le frequenti magnifiche ville che di passo in passo eranvi seminate, dice questo geografo che aveano sembianza di una sola continuata città prima che, come riferisce Tacito (2),

(2) Annal. lib. IV.

<sup>(1)</sup> De Re Restice cap. XXII.

Vesuvius mons ardescens saciem loci verteret; e numerandone gli uni dopo gli altri gli abitatori, rimonta sino agli Osci indigeni della Campania, dopo dei quali vi abitarono gli Etruschi ed i Pelassi, indi i Sanniti che ne surono discacciati anch' essi da' Romani. Era Pompei, secondo il di lui racconto, alla soce del Sarno come un picciolo emporio, ove sbarcando per tal siume le merci distribuivansi colle scase alle vicine città di Nola, Nocera, Acerra de' Campani, e da queste pel medesimo siume s'imbarcavano, onde oggi

al luogo n'è rimasta la denominazione di Scafati.

Quanto al di lei fito offerva il nostro Pensionario chesebbene Ovidio (1) la preterisca nell'additar le nostre città marittime, allorchè descrive la venuta di Esculapio da Epidauro in Roma, ed oggi siasi infatti discoperta mediterranea, pure gli antichi la contarono tralle marittime (2). Ma la stessa cruzione del Vesuvio che sotto Tito la seppelli, esser dovè la prima cagione del suo aliontanamento dal mare, sapendosi da' contemporanei scrittori, e con ispezialità da Tacito, quanto allora avessero que' lidi cangiato sito e sembianza. Plinio il giovane che era restato nell'opposto Miseno, parla del risorbimento del mare, e dell'avanzamento del lido (3). In seguito congiunte alla potente azione di tanti secoli dovettero contribuire la lor parte a far rimaner Pompei mediterranea, quale oggi si ritrova, e ad allontanarne il Sarno, le seguenti eruzioni, e singolarmente quella accaduta sotto Teodorico descritta enfaticamente da Cassiodoro.

Della

<sup>(1)</sup> Metam. lib. XV.

<sup>(2)</sup> Tito Livio afferma nel lib. IX, c. 38, che l'armata Romana c idotta da P. Cornelio approdò in Pompei: Plinio nel lib. I, c. 9 la descrive tralle città littorali del Cratere: Seneca nelle Questioni N urali la conta tralle marittime con Ercolano: Pomponio Mela nel lib II, c. 4, e L. Floro nel I, c. 17 la chiamano marittima.

<sup>(3)</sup> Epist. XX lib. IV: Praeterea mare in se resorbert, & tremore teri quasi repelli videbamus. Certe processerat litus, multaque animalis mai siccis arenis detinebat.

Della forma del governo che ebbe nei primi tempi nulla rilevasi dagli scrittori fintanto che nell'anno di Roma 659 nel consolato di L. Licinio Crasso e di O. Muzio Scevola per la legge Licinia e Mucia non furono ridotti a reggerfi colle leggi delle proprie città i focii latini che pretendevano esser considerati come cittadini Romani. Conseguenza perniciosa di questa legge, al dir di Cicerone (1), fu che alienò talmente gli animi dei popoli tutti dell'Italia dalla Repubblica, che collegatisi fra loro nel 665, nel consolato di L. Marcio Filippo e di Sesto Giulio Cesare, mossero a Roma la guerra detta Sociale o Italica, la quale obbligò i Romani a concedergli quel dritto che pretendevano. Per un senatoconsulto su comandata la legge Giulia, colla quale si concesse la cittadinanza Romana a coloro che si erano mantenuti fedeli a Roma, cioè ai Latini, agli Etruschi, agli Umbri; fotto il consolato di Gn. Pompeo Strabone, padre di Pompeo il Magno, e di Porcio Catone si distese a quelle città che presero le armi, fralle quali surono Pompei ed Ercolano: e finalmente col beneficio della medesima legge vennero descritte nelle otto tribù nuovamente istituite tutte le altre città Italiane. Videsi non pertanto Pompei privata di parte del suo territorio e divenuta colonia. Cicerone nell'orazione in pro di P. Silla ci attesta che da questo congiunto di L. Silla susse stata in Pompei dedotta la colonia, e rimasero i Pompejani spogliati di una parte del loro territorio (2).

<sup>(1)</sup> In un frammento dell'orazione a pro di C. Cornelio egli dice: Legem Liciniam & Muciam de civibus regundis video constare inter omnes, quam duo Consules omnium, quos vidimus, sapientissimi tulissent, non modo inutilem, sed perniciosam Reipublicae suisse.

<sup>(2)</sup> Ac ne baec quidem P. Sillae mibi videtur praetereunda esse virus, qued cum ab boc illa Colonia sit deducta, & cum commoda colonorum a fortunis Pompejanorum Reipublicae fortuna disjunxerit, ita carus utrisque est & jucundus, ut non alteros dimovisse, sod utrosque constituisse videatur.

Dopo dunque del 665 fiamo nella certezza della costituzione di Pompei, quantunque ciascuna colonia si governasse con leggi particolari distinte alle volte dalle Romane, sempre però derivanti dall' inesausto fonte del Dritto Civile Romano, nè queste da esse colonie stabilite, ma loro imposte da coloro che le deducevano (1). Quindi ad esempio delle altre colonie, siccome Pompei ebbe in P. Silla che vi dedusse la colonia, il suo protettore, così dovette avere i triumviri, i censori, gli edili, i questori, i sacerdoti, gli auguri, i pontefici, il pubblico consiglio del senato e del popolo, e i proprii decurioni. Delle quali particolarità attendonsi con tutta verisimiglianza manifesti documenti che lo compruovino, dalla continuazione dello scavamento, che al pari del tempio d'Iside già scoperto, e delle adjacenze del teatro e di una porta della città con una contrada, e di alcani bagni particolari, e della casa di campagna e delle statue disotterrate all'augusta presenza del grande Imperadore GIUSEPPE II, tolga il rimanente di sotto le ceneri e i lapilli che l'occultano all'erudita curiosità. Nè contro la gravissima autorità di Cicerone che ci assicura della condizione di colonia della città di Pompei, debbono farci peso nè Vitruvio che sembra averla riputata municipio (2). nè Plinio che rammentando un prodigio stimato foriere della congiura di Carilina, chiama anche municipio Pompei (3). Imperciocchè essendosi dalla legge Giulia comunicato alla Italia tutta il dritto della cittadinanza Romana, ed avendo anche le colonie conseguite col dritto del suffragio la prerogativa che distingueva i municipii dalle altre città, cioè di potere aspirare alle pubbliche cariche in Roma,

<sup>(1)</sup> Gellio perciò dice nel lib. XII, c. 12: Java, institutaque emnia populi Romani, non sui arbierii babent.

<sup>(2)</sup> Lib. II, c. 6.

<sup>(3)</sup> Lib. II, c. 52.

ando in certo modo a dileguarsi la distinzione di colonia e di municipio, o per dir meglio a confondersi riguardo al dritto del suffragio e alla petizione degli onori in Roma (1), avendo però ciascuna città conservata la sua caratteristica relativa al proprio governo civile, per cui l'una dall'altra si distingueva.

Continuando in questo stato Pompei da un evenimento accaduto l'anno di Roma 811, nel consolato di C. Vipsanio e L. Fontejo, si ricava che questa città ebbe anche un proprio ansiteatro ed i suoi collegii. Livinejo Regolo, al riserire di Tacito (2), diede in Pompei uno spettacolo gladiatorio, al quale intervennero i coloni Nocerini, ed insorta tra essi e i Pompejani una siera contesa, vennero dalle parole alle ingiurie, indi ai sassi, ed alle armi, e nella rissa rimase la plebe Pompejana superiore, e molti dei Nocerini vi surono trucidati. Allora il Senato esigliò Livinejo e gli autori del tumulto, vietò per dieci anni a Pompei simili pubbliche adunanze, e si disciossero i collegii Pompejani instituiti contra le leggi (3).

<sup>(1)</sup> Gellio nel lib. XVI, c. 13 ci attesta espressamente essersi sovente cangiato il nome di colonia in municipio ed a vicenda. Pozzuoli da Frontino vien chiamata Colonia Augusta, siccome colonia era stata pur detta sin dall'anno 560 di Roma da Livio, da Vellejo, ed anche ne' marmi, nei quali si legge, Edilis Coloniae Puteolanorum e Genio Coloniae Puteolanorum; e pure Cicerone nell'orazione a pro di M. Celio la chiama municipio, e Tacito nel lib. III delle storia municipio sembra chiamarlo. Quindi Ulpiano nel lib. I dei Digesti, tit. I dice: nunc abusive municipes dicimus suae cuiusque civitatis cives, utpose Campanos & Pateolanos.

<sup>(2)</sup> Annal. XIV, c. 17.

<sup>(3)</sup> Un collegio era una specie di fratellanza detta dai Greei etaspix e dai Latini sedalisium, nella quale convenivano molti compagni assoggettandosi a certe leggi particolari, purchè non tendessero al corrompimento della pubblica legge; di che veggasi Cajo al lib. IV alle leggi delle XII Tavole. Se tali collegii non venivano giustificati

## LXVIII STORIA

Censessantasette anni sussisse Pompei in tale condizione di colonia sino alla sua rovina. Nel decimo anno di Nerone ed 816 di Roma ricevè il primo crollo. Ai cinque di febbrajo nel consolato di Memmio Regolo e di Virginio Ruso accadde il gran tremuoto che rovinò questa città, abbattè una parte di Ercolano, lasciandone il rimanente vacillante, scosse Nocera, e crollò diversi privati edifizii di Napoli (1). Ma sull'epoca di questo avvenimento havvi qualche discordia nei Fasti e negli Scrittori. Secondo Errico Glareano il consolato di Memmio e di Virginio, cade nel 65 dell'ora Cristiana; e secondo il Muratori nel 63, nel quale il Glareano stabilisce consoli Petronio Turpiliano e Ĉesonio Peto. Cornelio Tacito rapporta il tremuoto che rovinò Pompei nel consolato di P. Mario Celso e di C. Asinio Gallo, ed in conseguenza un anno prima di quello che Seneca lo riferisce. Giusto Lipsio si attiene a Seneca, e stima che Tacito non abbia riferito quest' avvenimento nel proprio anno. Che che però sia di questa picciola discordanza, la sventurata Pompei dopo le scosse sofferte attese per lo spazio di sedici anni corso dal fiero crollo all'ultima fua sciagura, a riparare i suoi pubblici e privati edificii

\*

dai decreti del Senato e dai rescritti dei Principi, erano illeciti e proibiti. Quelli che andavano sorgendo di nuovo facilmente divenivano abusivi e perniciosi, e quindi si trovano tratto tratto aboliti, come al dir di Asconio avvenne nel consolato di L. Cecilio, e Q. Marcio per un senatoconsulto. P. Clodio Tribuno della Plebe restituì dopo nove anni i collegii; e Giulio Cesare gli abolì di nuovo, eccetto alcuni pochi di antica istituzione, di che parla Svetonio nella di lui Vita c. 24. Ma nelle turbolenze avvenute dopo della di lui morte, ad onta di tanti divieti, si rimisero i collegii con tutti i soliti disordini; per la qual cosa Augusto, secondo lo stesso Svetonio, per distruggere di un colpo molte fazioni facinorose collegate sotto il titolo di collegii, gli abolì di nuovo, a riserva degli antichi e legittimi e permessi dal governo.

(1) V. Seneca nelle Questioni Naturali.

ند

o distrutti affatto o che minacciavano rovina: quel popolo infelice vedeva risorgere la dolce patria, sopraggiunse l'ultimo colpo fatale che spense e seppelli infieme con esso l'oggetto delle sue compiacenze e dei suoi fudori. Imperciocchè nel consolato di Vespasiano per la IX volta e di Tito Cesare per la VII, che corrisponde all'anno 79 della nostra era (scorsi due mesì che Tito era asceso al trono per la morte del padre seguita ai 23, o 24 di giugno (1) ) accadde la memorabile eruzione del Vesuvio narrataci fra gli altri da Sifilino. Un immenso cumulo di materie accresciute nello spazio di molti secoli (giacchè ai tempi di Augusto non eravi memoria di altra eruzione) acceso finalmente dovette produrre quella sì orribile conflagrazione, la quale, siccome, al dir di Tacito, cangiò la sembianza di quei luoghi, così del monte stesso alterò la sigura, e distaccatone un gran masso allora sonse la divise in due vertici (2), e portò l'ultimo fato a queste due nobilissime città della Campania, delle quali una fu da dirotta densissima pioggia di lapilli e di cenere oppressa e profondamente sepolta, l'altra da alto spazioso torrente di liquesatti bitumi ricoperta ed interamente assorbita.

L'erudito e dotto Accademico termina in questa guisa le sue ricerche dopo aver recato alcuni versi di Stazio che compianse con giusti sensi di dolore l'inselice condizione di si samose città di dover rimanere sconosciute e ricoperte dall'obblio." In rislettendo ( egli dice ) al loro destino scorgo che gli antichi scrittori ci hanno satto sormar congettura, che Pompei in rapporto all'ampiezza, alla popolazione e alla magnissenza susse stata in qualche maggior

<sup>(1)</sup> Plinio il giovane nell'epistola a Tacito dice essere l'eruzione accaduta IX Kal. Sept.

<sup>(2)</sup> Orosio nel lib. VII, c. q ci dice: Abruptum tunc etiame Vesuvit montis verticem magna profudisse incendia ferunt.

riputazione che Ercolano, ed in fatti Tacito l'appella celebre Cumpaniae oppidum, e Seneca celebrem Campaniae urbem. Ed ancorché entrambe in ciò che ciascuna racchiudeva di grande, di magnifico, di ammirabile, fussero state di egual condizione tra loro, pure io stimo che atlai più di tanti pregi dovette in Ercolano distruggere ed incenerire il fuoco, di quel che in Pompei avetse potuto rovesciare ed abbattere il tremuoto, al quale anche soggiacque Ercolano (1). Ed in quella funestissima conflagrazione il Vesuvio che dimostrò tutto il suo surore ai danni di Ercolano, sembrò meno feroce in verso Pompei, avendola nel seppellirla coverta di un' alta tunica di lapilli e di ceneri, materie aridissime, le quali, se la privarono dell'aria che come tutto anima così anche tutto finalmente consuma. la preservarono intatta da ciò che poteva marcirla e corromperla. Dalle quali cose può dedursi che se da Ercolano, ad onta dello scempio sofferto, si sono estratti gl'immensi tesori che ammirjamo, e da Pompei sì poco, tutto il più raro, il più pregevole, il più grande ed il più degno di ammirazione. giace ancor sepolto ed intero,..

VIII, Per rischiarimento poi delle tenebrose antichità dei tempi mezzani appartenenti alla storia patria, tosse con provvido avviso nel 1783 il chiar. P. Don Salvadore Blass Monaco Casinese Siciliano, Archivista del Monistero della Santissima Trinità della Cava, e Socio ascritto alla IV classe della nostra Accademia, ad illustrare con nuove membrane di quell' Archivio prezioso la Serie dei Principi Longobardi di Salerno, da Siconolso siglio di Sicone e fratello di Sicardo, ultimi della loro stirpe Principi di Benevento, che primo si assise sul rono Salernitano, sino a Gisolso che ne venne dal Normanno Roberto Guiscardo

<sup>(1)</sup> L'attesto Plinio : Pompeii & Herculanum sensere.

discacciato. Era questa serie di Principi Salernitani con non pochi errori stata altre volte pubblicata; ma il celebre Ab. Venerio Archivario della Cava verso la metà del passato secolo colle sue immense fatiche tollerate in più di trenta anni, avendo coordinate tante carte di donazioni, diplomi e strumenti di vendite ammassate in quel samoso archivio, porse al nostro sagace ed erudito Socio P. Blasi ubertosa e ben digerita materia per compilarne, come sece, la proposta serie di principi Salernitani che durò intorno ad anni dugento quaranta.

A dimostrarla colle antiche scritture di quei tempi stimò necessario procedere coll'ordine retrogrado solito ad usarsi nelle genealogie onde si viene a capo del primo ceppo. Uso costince dei tempi dei Longobardi Salernitani si su di segnar soltanto nei diplomi ed in tutti gli altri stromenti l'anno del principe col mese e l'indizione; sicche per fac vedere l'anno del principe segnato corrispondente all'era volgare, non rimarrebbe altro lume che l'indizione, la quale rinnovandosi ogni quindici anni lascerebbeci nella medelima oscurità. Ma per buona ventura dall'anno 1979 in tutte le carte cominciò ad aggingnersi all'anno del principe ancor quello di Cristo, onde di Gisolso ultimo di quei principi Salernitani si trova notato l'anno del governo, donde si ricava anche il principio del suo regnare colla corrispondenza all'anno dell'era volgare. Quindi si rileva quando da suo padre su egli associato al trono, e quanti anni di principato contava aliora luo padre, en in confeguenza il cominciamento del di lui regno, e di mano in mano da Gisolso agévolmente per gradi paisando da un principe all'altro si risale sino a Siconolso.

Per base e sicurezza di cotal metodo egli si studia per mezzo di molte pergamene di sullare il vero tempo, in cui Gisolso su balzato dal principato da' Normanni, giacche gli scrittori sono assai varii intorno all'anno di tal memorabile evenimento (1). I cronisti variano ancora sul numero degli anni del regno di Gisolso, altri contandone trentatre, altri trentaquattro. Il P. Blasi assicura sulla sede delle allegate pergamene della Cava che Gisolso regnò anni trentasei, e che l'anno della conquista satta di Salerno da Guiscardo sia stato l'anno di Cristo, secondo l'era comune, 1077 (2). Fissata tal epoca col mentovato ordine retrogrado stabilisce il principio del di lui regno, e passa poi di mano in mano ai di lui predecessori, dopo di che con ordine opposto dal primo all'ultimo riserisce la seguente serie corrispondente agli anni di Cristo, che giova alla storia patria di aver presente.

840. Siconolfo scappato da Taranto luogo del suo efiglio è fatto Principe di Salerno sul principio dell' 840, e dura nel dominio sino alla morte accaduta intorno agli ultimi mesi dell' 848.

849.

<sup>(1)</sup> Il catalogo dei principi di Salerno (Hist. Pr. Lang. t. V pag. 14) lo stabilisce al 1072; l'ignoto Barese (t. IV pag. 335) ed il Cronico Normannico (Rer. Ital. Scr. t. V) al 1074; il Cronico di S. Sosia (Astiq. Med. Ev. Mur. t. I) e la Cronica Cavese del Pratilli (Hist. Pr. Lang. t. IV) all'anno 1075; l'Anosimo Casinese (Hist. Pr. Lang. t. IV pag. 78) cui si uniforma l'altra Cronica Cavese stampata dal Muratori (Rer. Ital. Scr., t. VII) all'anno 1076; e finalmente Lupo Protospata (Hist. Pr. Lang. t. IV) la Cronica di Cola Aniello Pacca che è quella del Protospata volgare, quella di Tommaso di Catania, l'Amassitana (Antiqu. Med. Ev. t. I) ed altri segniti dal Muratori (Annali d'Italia t. VI) all'anno 1077.

<sup>(2)</sup> Avendo il lodato nostro Socio pubblicata per le stampe la sua Serie dei Pr. Long. in latino cella Tavola Cronologica e colle carte allegate, prima che l'Accademia l'inserisse nei suoi Atti, si accennano soltanto i risultati delle di lui osservazioni. E quindi su proposito dell'anno comune 1077 basta fare un cenno essere stato nei contratti notato l'anno 1078 giusta il metodo proprio dei Pisani (V. il Caral. dei Pr. di Salerno), cioè di cominciar l'anno nuovo dal mese di marzo antecedente al gennaro dell'era volgare; di manierache l'anno 1077 dal marzo in poi su dai Salernitani chiamato 1078.

### $D \in L L A R A LXXIII$

849. Sicone suo figlio gli succede nell'anno 849. All' 852 contava il suo anno terzo, e si associo nel

principato Pietro suo Ajo.

854. Fu il quinto anno di Sicone, in cui ebbe parte al principato Ademario figlio di Pietro, di cui è questo il primo anno. Morto Sicone di veleno nel sesso di lui anno, rimangono Pietro ed Ademario padre e figliuolo sino all'anno settimo, e morto il padre resta Ademario sino al novembre dell'860, in cui ad istigazione di Dauserio è discacciato dai Salernitani.

861. Dauferio acclamato da pochi è cacciato tosto dal trono, e gli succede Guaiferio di lui zio, che regna anni diciannove dopo aver avuto per collega Guaimario suo figlio I di tal nome per quattro anni, cioè dall'877 sino all'880, nel quale Guaiferio andò a farsi religioso.

877. Guaimario I compagno al padre ritiene il trono fino all'899 prima folo, partito il padre, indi negli ultimi fette del fuo governo in compagnia di Guaimario II suo figlio dichiarato suo collega nell'893, e gode pure con lui

il titolo di Patrizio Imperiale.

893. Cinquantuno almeno furono gli anni del regno di Guaimario II, che nel 41 del suo impero cioè nel 933 si atsociò il figliuolo Gisolso, insieme col quale ritenne lo

scettro almeno altri dieci anni.

933. Gisolso da quest'anno sino al 41 del suo dominio non ebbe sigliuoli, e per compensare la generosa azione di Paldolso Capodiserro principe di Benevento, adottò insieme con Gemma sua moglie per sigliuolo Paldolso siglio del nominato Capodiserro, con cui e colla moglie Gemma regnò sino alla morte accaduta dopo il novembre del 977 che era il 45 del suo governo. Fra questo tempo per pochi mesi degli anni 973 e 974 occupò il soglio il traditore Landolso.

974. Paldolfo che cominciò con Gisolso a signoreggiare nel dicembre del 974, morto Gisolso ebbe compagna per

qualche mese la principessa Gemma; indi si associò il proprio padre Capodiserro, dopo la cui morte accaduta dopo il sebbrajo del 981 si sostenne per pochi mesi solo nel trono; perchè ribellatisi i Salernitani si diedero a Mansone di Amalsi, che vedesi dominare su i primi mesi del seguente anno.

982. Mansone dichiarato principe malgrado degli sforzi di Ottone Imperadore a favore di Paldolfo, ottiene e da questo Imperadore e da Paldolfo stesso di godersi in pace il principato in compagnia di Giovanni suo sigliuolo negli anni

982 c 983.

983. Circa il fine di quest'anno vengono espulsi dai Salernitani cotesti principi Amalsitani, ed è esaltato Giovanni di Lamberto che con suo figlio Guidone regna intorno a cinque anni, e lui morto regna egli solo per qualche anno, indi nel 989 si associa l'altro sigliuolo Guaimorio III di tal nome, con cui regna sino ad agosto 999 decimosesto anno del suo principato.

989. Guaimario III fatto compagno al padre nel 989, lui morto governa folo da ottobre del 999, in cui contava l'underimo del suo regno. Pervenuto all'anno 27 si associa un suo sigliuolo Giovanni, il quale morto dopo tre anni di regno nel settembre del 1018, il di 27 del mese medesimo si associa con magnifica solennità l'altro figlio Guaimario con cui regno anni nove sino al sebbrajo del

1027, quando il padre ne contava 38 di governo.

nota. Guaimario IV ed ultimo di tal nome fanciullo nella morte del padre rimane per pochi mesi sotto la tutela della principessa Gaitelgrima sua madre, la quale conta il primo anno del suo governo correndo il nono del siglio. Ma o perchè ella morisse indi a non molto, o per qualunque altra ragione vedesi egli regnare dal novembre dell'anno stesso 1027 sino al suo 29 anno che era il 1037, nel quale dichiara suo collega Giovanni o Giovanniccio suo sigliuolo de cui non si vede nelle pergamene memoria alcuna dopo

il sovembre del seguente anno 1038. In tal mese comincia il padre a intitolarsi anche principe di Capua. Nel seguente anno 1039 in aprile s'intitola eziandio duca di Amalsi, ed in luglio aggiugne ai suoi dominii il ducato di Sorrento. Nel 1042 Guaimario piglia per suo compagno Gisolso II altro suo figliuolo, che s'intitola come il padre anche principe di Capua e duca di Amalsi e Sorrento; e nel seguente anno 1043 prendono entrambi i titoli dei ducati di Calabria e di Puglia. All'anno 1052 Guaimario IV è ucciso dai congiurati dopo 34 anni di principato.

1042. Gisolfo II che all'uccisione del padre contava già dieci anni di regno, col valore del duca Guidone suo zio è sostenuto nel trono, e vi continua sino all'anno 1077. contando già 36 anni di dominio. Allora Ruberto Guiscardo Normanno marito della di lui sorella, afsediando Salerno strinselo di modo che su costretto ad arrendersi, lasciando a lui il principato che i Longobardi aveano per dugento trentotto anni occupato ad onta degli assalti dei Beneventani. dei Greci, degl'Imperadori e dei Re d'Italia, e finalmente dei Saracini. Gli autori riferiscono che Gisolfo II spogliato dei suoi stati si portò a Roma e dal Pontesice Gregorio VII fu creato duca della Campagna (1). Il nostro Accademico da uno strumento di Amalfi dell'anno 1088 confervato nell'Archivio della Cava (2) rileva che egli undici anni dopo della perdita del suo principato, regnando Ruggiero, si trovava ricoverato in Amalfi e corteggiato dai suoi fedeli e onorato col titolo di principe (3). Di più nel medesimo

<sup>(1)</sup> Chron. Caru in Hift. Peregrini Guil. Apul. tom. V Rev. Ital. Scrip., Mus. e negli Annal. d'Italia 1977.

<sup>(2)</sup> Membrana III Arm. II P.

(3) Cum intea Civisasem Amalfio ( diceli nel cirato firomento ) coram presentia Domini Gisulfi principis Ademarius judex & plures more solita circa dum affantes datama sidelium, tune in eadom presentia, e cost, appresso.

## LXXVI STORIA

anno 1088 ai 25 di luglio, X indizione, sotto il medesimo duca Ruggiero, trovasi in un'altra membrana di carattere Amalsitano scritta da Giovanni figlio di Giovanni curiale (1) notato il nome del principe Gisolso in questa guisa: Temporibus domini Gisulsi gloriosi & eximii principis anno primo ducatus illus Amalsi, cosa notabilissima atteso il genuino carattere della membrana, siccome osserva il chiarissimo Archivista.

#### TENTATIVI E LAVORI

eseguiti dopo i tremuoti delle Calabrie e di Messina.

Produceva in sissatra guisa l'amor patriotico utili frutti nella nascente Accademia, quando sospesa e scossa dalle amare novelle del slagello sopravvenuto alle Calabrie e a Messina ai 5 di sebbrajo del 1783 che sì serace e ricca contrada assisse e per poco non distrusse interamente, rivolse i silososici sguardi verso quella parte, tanto per investigare coll'oculare osservazione su i paesi sovvertiti gli essetti diversi dei terribili replicati scotimenti, onde dedurne la più soddissacente sisca spiegazione, quanto per raccorre interessanti notizie o notabili materiali che illustrassero degnamente la storia naturale e la sisca geografia di quelle regioni: per osserire di poi al benesico SOVRANO quegli utili scientifici lumi raccolti che possono attendersi da un Corpo Accademico da lui eretto ad istruzione e vantaggio dello stato.

Ad eseguire tali disegni si destinò una peregrinazione accademica del Segretario delle Scienze Sarconi accompagnato dai Pentionarii Pacifico e Fasano e da qualche Socio e da

<sup>(1)</sup> Trovasi tal membrana Arc. II, num.-86 dell' Archivio della

# DELLAR. A. LXXVII

abili difegnatori. Il risultato di questo viaggio (oltre a diverse descrizioni particolari e speculazioni scientifiche dei Pensionarii mentovati, che l'Accademia di tempo in tempo renderà pubbliche) su una Storia di quei tremuoti che con accuratezza ed energia prese a compilare il lodato Segretario Sarconi pubblicata nel 1784 in foglio ed in quarto, arricchita di molti rami.

Intanto che l'Accademia attendeva ai descritti lavori e ad altri ancora più interessanti, de' quali si darà indi contezza, avea in pochi anni perduti diversi valorosissimi individui. Sospirò singolarmente la patria per l'irreparabil perdita del celebre Francesco Serao alta speranza dell'Accad. ed onore de' filosofi e medici della nostra età, a giudizio ancor degli esteri più schivi. Erano altresì mancati l'utilissimo fisico il P. Giammaria della Torre, l'eruditissimo Pensionario Salvadore Aula, il noto medico Luigi Visoni. il Socio e Real Bibliotecario Domenico Malarbi, e qualche altro. Non pochi Accademici aveano mutato cielo; altri trovavansi ognora più occupati ne' proprii degni lavori; altri distratti dalle magistrature e da nobili professioni da loro illustrate. Il Segretario delle Belle Lettere Don Andrea Sarao avea deposto l'onorevole incarico promosso ad un Vescovado. Il Segretario delle Scienze e del Registro Economico Sarconi, dopo la riferita Storia de tremuoti ultimo fuo lavoro accademico, amò una filosofica libertà ed impetrò dal generoso SOVRANO il suo congedo. Di tanto mondo accademico che parve talora soverchio al bisogno, non rimanevano che pochi amici del paese e delle scienze. S'intermisero le cure accademiche; divennero rare. Le assemblee; un apparente increscevole languore rattriftava i veri compatriotti.

Di bel nuovo vi rivolse il SOVRANO gli sguardi propizii, ed impose al degnissimo Presidente il Sig. Principe di Belmonte la nomina di tre abili soggetti per eleggere fra essi uno che supplitse ad un tempo ai doveri che richieggono

# LXXVIII STORIA

le Scienze e le Belle Lettere. L'Accademia adunatafi privatamente ai 30 di novembre del 1784 approvò la nomina di tre Socii come ugualmente degni ed idonei all'importante carica. Cadde la scelta di S. M. nella persona di Pietro Napoli-Signorelli uno de tre nominati che allora trovavasi dalle Spagne rimpatriato, ed a' 6 di dicembre del medesimo anno su eletto Segretario perpetuo delle Scienze insieme e delle Belle Lettere, e in appresso con altro real rescritto dichiarato eziandio Segretario del Registro Economico.

Questa nuova benesica cura del Re per un Corpo che sembrava intorpidito, ridestò l'usato ardore ne' petti patriotici è si ripopolarono le assemblee. Una delle prime cure del nuovo Segretario su l'istruirsi delle macchine astronomiche e sisiche che l'Accademia possedeva. Non potè averne contezza dall'Abate Don Vincenzo Mazzola aggregato alla prima classe nel ramo dell'ottica pratica, il quale ne era il custode, perchè avea egli già dal Sovrano ottenuto di potere per alcun tempo allontanassi da Napoli sua patria per vedere i più culti paesi esteri (1). Domandò singolarmente

<sup>(1)</sup> Questo industrioso Socio si è a' nostri tempi distinto nella sormazione dei cannocchiali acromatici che nella terminazione e chiarezza gareggiano con quei del Sig. Dollos e nell'ingrandimento cogli altri dell'ingegnosissimo Ramsden. Ne' microscopii a lentine ha vinti senza contrasto quanti mai si sono segnalati in tali lavori. Secondo l'avviso del su P. della Torre nelle più picciole di queste lentine l'ingradimento lineate ascende presso a 2000, il campo è più chiaro de' microscopii a palline dello sesso a 2000, il campo è più chiaro de' microscopii a palline dello sesso il sugrandimento, e gli oggetti repgonsi più terminati e da più copiola luce illustrati. Per menzo di tali lentine si è conferenta l'invenzione del mentovato sisso della Torre sulla sigura apulana del sangue ed evitate alcune objezioni satte contro di essa. Crederasi da alcuni illustri ssici che sal sigura delle parti del sangue osservato colle paltino dol Padre della Torre susse una illustrone ottica nascente dalla sserieza de' microscopii; e si aggiugneva che se si potessero lavorare alcune laptina sopresse convesse di una inguandimento munici a quello.

# DELLAR. A. LXXIX

di una macchina astronomica osservata ancora in Napoli dal ch. M. de la Lande verso il 1765 che ne sece menzione nel suo Viaggio d'Italia, oggi posseduta dalla R. Accad., con finissimo magistero lavorata dal celebre macchinista Inglese Simpson, per cui mezzo può rilevarsi il vero luogo del cielo occupato da un praneta o da una cometa in un dato tempo, e possono agevolmente eseguirsi diverse operazioni astronomiche che oggi si praticano colla macchina equatoriale. Esta ne principali usi conviene colla Parallattica e col Settore Aftronomico di Graham; ma essendo la di lei congegnazione diversamente da quelle eseguita, e contenendo altre dimensioni e divisioni assai più fine ne' suoi circoli che promettono una esattezza pressociale geometrica nelle osservazioni, ne trovandosi. per quante si sappia, nè disegnata nè descritta finora, stimò il Napoli-Signorelli col consenso del Signor Presidente util cosa il commetterne il disegno che no indicasse la particolare orditura e gli usi a cui è destinata, al che colla solita

delle ultime palline, sorse per mezzo di esse si vedrebbero le parti del sangue sseriche e non cilindriche. Riusch all'Abate Mazzola di lavorar lentine si picciole e di sì prodigioso ingrandimento, ed avendo con esse ofservate le parti del sangue si afficurò di non essere globole ma di figura amilare giusta l'esperienza del Iodato P. della Forre. L'ultima produzione del mentenato nuftro valorofo attico prima della fua partenza per Vienna, è stato un'arinalo natturno intrapreso di ordine di S. M. la nostra Regina CAROLINA. Cercava questa augusta protettrice delle arti e degl'ingegni una macchina, per cui giacendo a letto, senza ricevere incomodo ne da foverchio lume ne da romore di pendolo che oscilli, potesses di notte osservarsi le ore, non essendo S. M. rittassa soddinsatta di alcune altre macchine per tale oggetto eleguito nella Germania e nell'Inghilterra. L'Abate Mazzotz ne immaginò una cho compiè l'oggetto della SOVRANA. La di lui macchina senza serie gli occhi col chiarore ne le orecchie collo strepito, projetta e dipinge mel muro bianco di una camera oscura un luminoso anello circolare che fegna con ben distinti colori le ore e i minuti di un orologio che in esta si contiene.

EXXX S T O R I A.
gentilezza ed alacrità si prestò l'instancabile Socio Don
Niceolò Fergola.

# Descrizione della Parallattica dell' Accademia.

I Piedestallo della macchina è il triangolo rettangolo Fig. ABC di legno, di cui il cateto AB è verticalmente posto, e l'altro BC giace in sito orizzontale. Essi sono di legno del Brasile larghi e spessi rispettivamente 02, 36 di AB che disegna la decima parte del raggio del settore T.

II Il cateto verticale AB è lateralmente fortificato dalle due traverse DF, DF pur di legno, le quali in larghezza e spessezza a un dipresso lo pareggiano e sono arrestate nella barra orizzontale EE unita ad angoli retti


al cateto orizzontale CB.

JII Agli estremi A e C dell'ipotenusa AC sorgono perpendicolarmente le piastre di ottone CF, KG satte a squadra; le cui parti C e KH sono rispettivamente sermate nella nominata ipotenusa con quattro viti, e le parti elevate F e KG nella seguente maniera costrutte, cioè la parte superiere KG è conçava e l'altra T ha in mezzo un buco conico, assinche l'asse della macchina IG attraversando la parte concava G possa girare entro il soro conico f.

IV L'asse di serro I se persettamente cilindrico in G e posa sulle circonferenze di due rotelline di ottone alquanto spesse, che girano anch'esse intorno ai loro perni ficcati nella piastra GK qualora giri l'asse I se quindi essendo puntuale il loro scambievole contatto coll'asse I se libera ed uniforme la rivoluzione dell'asse intorno ad f.

V Vicino all'estremo superiore della mentovata ipotenusa evvi un cerchio d'ottone LMG diviso essettivamente in soli gradi, e divisibile in minuti mercè la piastra adiacente L del Nonius. Esso è attraversato nel centro dall'asse If, cui perpendicolarmente insiste, e vi è sortemente arrestato per mezzo del timpano m.

V Vicino



· . •

# DELLAR. A. LXXXI

Tal timpano è composso di un prisma esagonale checinge la parte m dell'asse quivi con viti sermato e di un'armilla circolare di ottone che combacia col cerchio

LMG cui è pur anche fermata con viti.

VI Verso l'estremo I del medesimo asse si ravvisa il cerchio OO quasi uguale nel diametro e nella spessezza all'altro LMG, ed è anch'esso diviso in gradi. Il piano di questo cerchio coincide coll'asse If; ed assinche vi sia sortemente arrestato, trovansi dietro di esso due lamine di ottone, ognuna delle quali viene con due viti sermata sul medesimo asse di serro.

VII Dal centro di questo cerchio si eleva ad esso perpendicolare un cilindretto di ottone, intorno a cui come perno gira con somma frizione ed unisormità l'altro cerchio NN un poco minore dell'altro OO. Esso ha come OO due lamine di ottone che si secano nel centro perpendicolarmente. Di esse la NN sporge alquanto suori della sua periferia, ed ha negli estremi N, N due viti onde potersi a piacere dell'osservatore sermare immobilmente il cerchio NN sopra l'altro OO.

VIII Il settore RPQ il di cui raggio è decuplo effettivamente di AB, è pur di ottone. Le tre lamine RP, RQ, QP sono di dietro fortificate di tre altre, il cui piano è ad esse perpendicolare. Ma le spranghe di ottone che fortificano i raggi QR, QP sono arrestate nel cerchio NN per mezzo di piastre di ottone fatte a squadra, che con viti sono sermate tanto nel cerchio NN che nelle suddette lamine.

IX Evvi finalmente il cannocchiale comune QS cilindrico e di ottone, che gira per mezzo del cerchietto Q intorno ad un perno eretto dal centro di esso settore perpendicolarmente al di lui piano, e va rasente il lembo PR. Nel di lui suoco secansi ad angoli retti due sottilissimi sili per sissare l'astro quando venga coperto dalla loro intersezione. L'asse di tal cannocchiale debbe essere parallelo

l

### LXXXII STORIA

quel raggio del settore che passa pel punto T principio della divisione del Nonius.

X Il lembo del settore PR è di 21°, e ciascun grado suddiviso in quindici parti uguali, cioè in 4'. Attaccata al detto telescopio si vede altresì la piastra PT del Nonius, la quale essendo di lunghezza uguale a 23 delle 15 parti uguali, è poi divisa in 24 parti uguali. Di più accanto ad esso è il quadrantino d diviso in 120 parti uguali, ond'è

che si poisono assegnare anche 2".

XI Sonovi finalmente verso la base della machina tre viti v, v, v, da poterla livellare, e da drizzare l'asse If parallelo all'asse del mondo. Nell'equatore MGL vi è anche la vite stringente L, mercè di cui può sermarsi esso circolo e togliersi dall'intiera machina ogni moto di rotazione, rimanendo al circolo OO, ed al settore il solo moto nel circolo di declinazione. Che se si stringa l'altra vite O, si toglierà eziandio quest'altro moto della machina, e rimarrà al solo telescopio SQ il moto d'intorno al centro e del settore.

# Rettificazione della machina.

I Conviene situare la mentovata machina in gaisa che il cateto orizzontale CB combaci colla meridiana esattamente segnata sull'orizzonte ed accuratamente rettissicata,

e sarà il triangolo BAC nel meridiano celeste.

II Vuolsi di più che l'asse If sia parallelo a quello del mondo. E questo si otterrà facendo inclinare l'asse If all'orizzonte sotto un angolo uguale alla latitudine dell'osservatorio ove tal machina si sisserà, ed osservando se l'intersezione de'sili copra sempre una sissa nel cammino per lo suo parallelo. Cioè si osserva una stella sissa ( come la sulgida della Lira, si di Boote, y di Andromeda ec., le quali passano presso a poco per lo nostro zenit) quando sia coperta dall'intersezione de'sili. Quindi si sermeranno le viti O

## DELLA R. A. LXXXII

ed O, e si vedrà se l'intersezione de'medesimi sili accompagni l'astro nel suo parallelo. Sarà in tal caso rettisicata la machina.

Ma per questo sperimento gioverà prendere le sudette fisse quando sieno negli archi de' loro paralleli più elevati di 50°, conciosachè in tali casi saranno esse quasi sgombre di sentibile rifrazione, e si moveranno in un persetto parallelo.

#### PROB. I

Rettificata esattamente la nostra parallattica trovare con accuratezza la vera elevazione del polo visibile senzachè Fig. 2 c'inviluppino le rifrazioni.

Rappresenti CDTR la nostra parallattica esattamente rettificata, onde il di lei asse CD sia diretto al polo visibile P, e l'equatore rbo della medesima combaci coll'equinoziale celeste EMQ. Sia di più PZ il meridiano celeste, S il luogo vero della chiara della Lira, in qualunque punto del suo parallelo essa si ritrovi, s il luogo apparente. Per questi punti S ed s s'intenda condotto l'azimuto ZSG, e i due circoli di declinazione PSM, Psm che tagliano l'equatore celeste in M ed m. Ciò premesso s'istituisca la seguente operazione.

I Si prenda con un quadrante mobile situato sulla meridiana l'altezza rifratta sG della medesima sissa, e quindi il di lei complemento sZ; e si osservi eziandio l'azimuto sZP.

II Nel momento di una tale osservazione si guardi da un altro osservatore la medesima sissa s per lo cannocchiale della parallattica; e si notino i gradi e minuti dell'arco bo sull'equatore di detta machina segnati dall'indice bD, quando la medesima stella è coperta dall'intersezione de'ssi di esso cannocchiale. Onde saprassi l'arco mÆ dell'equatore celesse, e l'angolo ZPs misurato dal medesimo.

### LXXXIV STORIA

III Si risolva il triangolo ZPs di cui è dato il lato Zs, e i due angoli sZP, ZPs. Sarà noto l'arco ZP, il di cui complemento è l'addimandata elevazione del polo.

#### PROB. II

Poste le medesime cose del problema precedente rinvenire le rifrazioni degli astri.

Rettificate le due machine, cioè la parallattica ed il quadrante mobile, si tempri un oriuolo a pendolo al moto delle stelle sisse, e'l suo indice segni il principio della numerazione quando culmini una data sissa, p. e. la chiasa della Lira. Se di essa sia S qualunque luogo vero, sil rifratto, col seguente metodo si ritroverà l'archetto Sa rifrazione d'altezza.

i Si guardi nel medesimo tempo da due osservatori la sissa se per lo cannocchiale della parallattica, e per quello del quadrante mobile; onde si sapranno i due archi bo, sZ, come si è detto sopra, e quindi l'arco mÆ.

2 Sapendosi il tempo dell'osservazione indicato dall'orinolo, saprassi quello che dee decorrere sino alla culminazione di tal sissa; e per ciò convertendosi questo tempo in arco equatorio si avrà l'arco MÆ.

3 Si risolva il triangolo ZPS, di cui è dato l'arco ZP altezza dell'equatore, l'angolo PZS azimutale, e l'angolo ZPS misurato dall'arco MÆ. Si saprà dunque ZS, da cui tolta Zs, si avrà Ss.

Adunaronsi periodicamente due volte al mese in tutto l'anno 1785 gl'individui di ogni classe, mostrando coll'assiduità riacceso in essi lo spirito intepidito di patriotismo e di socialità per promuovere l'avanzamento delle scienze. Distribuironsi diverse cure accademiche, e si vide con singolar piacere il chiar. Pensionario Don Vito Caravelli sottentrare al Padre della Torre nel carico d'informar

l'Accademia del contenuto delle Ricerche fisiche sul fuoco pubblicate da M. Marat Medico in Parigi in picciol volume in ottavo nel 1780, che indi a poco l'Accademia ricevè in dono dall'autore. Colla nitidezza e chiarezza che caratterizzano il sapere, espose il nostro Accademico alla assemblea la sostanza dell'opera enunciata. Dichiarata salsa la comune opinione de' fisici, che sia il suoco una materia elementare dispersa in tutti i corpi in diversa misura, che disviluppandosi col moto manifesta luce e calore, passa M. Marat ad esporte la propria opinione. Pretende che vi sia una quantità immensa di un sluido particolare sparso nell'aria, sulla superficie della terra e per la sua massa, ed in ogni altro corpo terrestre e siuido, del quale sieno abbondantemente impregnate le materie calcinate, in maggior copia le materie sulfuree, e abbondantissimamente le flogistiche. Vuole in oltre che tale fluido non mai giunga a fissarsi nei corpi, e che sia sempre in perpetuo movimento, passando incessantemente da un corpo in un altro a seconda delle alterazioni che i corpi soffrono; anzi col continuo suo movimento, secondo lui, sissatto sluido impedisce l'assoluta coessone delle parti della materia, e sa sì che l'universo non fi riduca a una maisa inerte e priva affatto di ogni movimento. Fluido igneo viene dall'autore denominato; non perchè il credesse un fuoco elementare, ma perchè egli stima che acquistando per cagione di stropicciamento, o di termentazione, o di altra azione, un moto intestino vorticoso e vibratorio, si renda atto a destare il senso di calore più o meno vivo secondo la maggiore o minore sua quantità, e secondo la maggiore o minore velocità colla quale si Crede egli dunque essere il calore rispetto al fluido igneo quali sono rispetto alla luce i colori. Persuaso il Signor Marat di avere stabilita l'esistenza del fluido igneo per una moltitudine di minute esperienze, ne va esaminando le proprietà, e stabilisce che sia di una grande trasparenza, che i vapori più delicati giungono ad alterarla: che sia poi

# LXXXVI & TORIA

di peto sensibile: di somma mobilità ed elasticità > compressibile qualora è in azione. Ma è il fluido igneo la stessa cota che il flogistico, o il fluido elettrico, o la materia della luce? M. Marat paragonando le qualità di un fluido con quelle degli altri rileva essere il fluido igneo diverso dal flogistico, dal fluido elettrico e dalla materia della luce. Questa secondo lui consiste in un altro delicatissimo fluido che occupa tutti gli spazii frapposti tra i gran corpi dell'universo; e vuole che certa azione vibratoria della materia del sole e di ogni altro corpo che diciamo luminoso. è anche dello stesso fluido igneo quando viene agitato. comunichi al fluido della luce un moto rettilineo, col quale fa impressione sull'organo della vista, e risveglia la sensazione di luce. Quindi spiega come si associino nel fuoco il calore e la luce. Vuole altresi che all'opposto i raggi della luce folare mettano in moto ne'corpi il fluido igneo, e ridestino il calore e anche il fuoco, cioè calore sommo e luce, se l'azione di esti è potentissima, come accade quando vengono raccolti da una lente ustoria o da uno specchio ustorio. Adunque secondo l'autore il principio del calore non è nei raggi folari, ma si disviluppa ne' corpi coll'azione di essi ful fluido igneo. Anzi pretende, che se i raggi solari condensati nel suoco di una lente, ovvero di uno specchio ustorio, si facessero cadere su di un corpo spogliato affatto di fluido igneo, non desterebbero calore alcuno. "Questa è la sostanza (conchiuse il nostro Pensionario) dell'opinione del Signor Marat sulla natura del fuoco; opinione a mio credere, che sente assai dell'ipotetico, vale a dire della qualità che da lungo tempo non si confà al gusto de' moderni fisici ",

L'esame poi delle Lettere sur l'Antimephitique trasmesse all'Accademia dall'antore M. Janin La Combe Blanche, come altresì quello del metodo di curare l'idrosobia del prosessore di Friburgo M. Mederer, secesi dall'Accademico Onorario Don Domenico Cirillo. Si destinò al Sig. Don Giuseppe Vairo la cura di verificare l'importanza della dissertazione del Sig. Alexandris intorno alle acque termali di Viterbo. L'opuscolo del chiar. P. M. Giuseppe Maria Pagnini, Theoria rectarum parallelarum, si osservò dal Pensionario Pacifico e dal Socio Bifulco. Tenne in tutte le adunanze della state occupata l'attenzione dell'Accademia Don Angelo Fasano con diverse curiose lezioni di fisica e di storia naturale sulle Galabrie. Nelle seguenti assemblee il lodato Sig. Pacifico espose la sua fisica spiegazione de' tremuoti di quelle contrade. Il Socio Forges Davanzati presentò alcune sue storiche offervazioni sulla seconda moglie del re Manfredi e su i figliuoli che n'ebbe. Il Sig. Fergola corse lo stadio a lui assegnato per rintracciare la vera misura delle volte a spira. Il prenominato Socio Don Tommaso Bisulco mancato con sommo rincrescimento dell'Accademia nel mese di novembre del 1787, il quale avea nel 1783 letta una fua memoria fulla zeoria de'limiti, esercitossi con altre due memorie sul calcolo degli spazii contenuti dalle linee a doppia curvatura e sulla loro rettificazione, valendosi del metodo dipendente dalla prima sua memoria, ed indi, ad insinuazione dell' Accademia, si studiò adoperarvi il calcolo comunemente usato da' moderni analisti.

Due vantaggiosi effetti produsse questo general sermento, che con trasporto di gioja videro i buoni nazionali rinato nel nostro Corpo. Sceverò in prima senza violenza ed agevolmente le utili piante dall'erbe inseconde; perchè non pochi individui che aveano dalla sondazione dell'Accademia desiderata la Patente per altro che per lavorar per la gloria e per la patria, cominciarono ad allontanarsi da un luogo di travaglio non premiato sisscamente. Di poi incoraggiò diversi disinteressati amatori del sapere, non ascritti nel catalogo accademico, a consacrare i dotti loro lavori al semplice nobil piacere che partorisce la scienza. Tra costoro merita di mentovarsi distintamente Don Antonio Adamuccio laborioso ed abile discepolo del Peasionario Marzucco. Egli

### LXXXVIII STORIA

che sul piano del maestro di sopra enunciato ne' Tentativi della prima classe avez di già pubblicati alcuni Lemmi, intraprese un passo assai più arduo, cioè quello di dare alle equazioni i, caratteri generali per annientarvi geometricamente più termini. Il risultato delle sue meditazioni su l'invenzione della formola  $y+V\left(z-\frac{2}{n}p+y^2\right)$  che fostituita in luogo della incognita nell'equazione generale del grado n priva del fecondo termine, tolti di mezzo i radicali e ordinata l'equazione secondo la lettera z, dà un'equazione del medesimo grado n priva ancora del secondo termine. In essa se si vuole che fimultaneamente svanisca il terzo, si potrà determinare l'incognita y sop: a un'equazione del secondo grado: se si vuole che svanisca secondo e quarto, se ne dovrà risolvere una di terzo; se secondo e quinto, una di quarto ec. Con tal mezzo adunque può rendersi pura un'equazione del terzo grado, e quindi sciogliere. Nell'equazione di quarto si può togliere secondo e terzo termine, riducendosi poi senza stento la medesima ad una di terzo; si può fare svanire secondo e quarto, e quindi, come ognun sa, pure il terzo, e ridursi a pura. Queste riduzioni veramente non vanno esenti da calcolo sommamente prolisso, che vieta di poterne agevolmente far uso nelle occasioni. Con tutto ciò l'esito delle fatiche durate dal valoroso Sig. Adamuccio merita ogni lode, e dà speranza che con ulteriori ricerche possano esse semplificarsi, e suggerire altre formole più generali che ne conducano alla simultanea annichilazione dei termini 3, 4, ec. di una data equazione.

Anche il nostro dotto prosessore di medicina Don Natale Lettieri avea nel 1783 presentato all' Accademia una sua pregevole dissertazione latina intitolata De Remedio sebrifugo nostrate Cortici Peruviano pari, vel forsan eo praestantiori. Colla esperienza di molti anni erasi egli assicurato di questa preziosa prerogativa antisebbrile della nostra

### DELLARA. LXXXI

nostra acqua termale detta volgarmente de' pisciarelli, che iecondoche afferma il nostro Sebastiano Bartoli ne' Bagni Puzzolani, più remotamente da Aldino e da Giovanni Villani chiamossi acqua della bolla. Spiccia questa dalla bassa parte de' colli Leucogei che riguarda il settentrione. nell'alto de' quali è il Foro di Vulcano, detto anche anticamente Campo Flegreo, ed oggi Solfatara, inesausta sorgente di solso ed alume, che suoco e sumo dagl'interni meati incessantemente esala. Con quella alacrità e fermezza che inspira una costante ofservazione non mai dagli eventi smentita, e con quella ottima fede che il di lui sapere uguaglia, sostenne l'accorto sisso. Lettieri, che in tutti i casi, ne' quali con successo si prescrive la chinchina, poteva con ben modica spesa sostituirsi questa nostra acqua. termale di non equivoca riuscita; e qualora o la distanza di alcune regioni o la povertà de' febbricitanti impedisse di potersi adoperare a tempo quella che sgorga da' nominati colli, poteva lavorariene una equivalente artificiale parimente di provata efficacia (1). Si accolse con gradimento ed applauio un' opera dottamente scritta diretta al sollievo degl'infermi ed al vantaggio economico dello stato, e se ne commise l'esame ad alcuni individui dell' Accademia, i quali tutto reputando pregevole nel libro del Sig. Lettieri, solo invocarono, come pur fece il Sig. Quaglia, il provvido presidio di ulteriori esperienze negli ospedali. Il Pensionario Cotugno paísò anche ad esperimentare egli stesso e trovò che in generale la nominata acqua termale era sempre riuscita giovevole ove la bile era stata per eccesso di volatilità di principj e per putrida fermentazione viziata. Solo fembrògli che nè a domare il periodo di molte febbri, nè

<sup>(1)</sup> Vedasi nell'opuscolo del Sig. Lettieri indi impresso in Napoli l'articolo VIII de aquae nostrae sebrifugae succedanea ubi illius copia non suppetis.

ad afforbire, nè a somministrare principii di coessone alle sossanze degeneranti, potesse adequare, non che vincere, la facoltà medicinale della chinchina. Per lo che configliò Verso la fine del 1784 a continuariene l'esperienze. riferi un altro accademico di avere anch' egli talvolta trovata nelle febbri profittevole ed attiva l'acqua dei pisciarelli e tal altra insussiciente a superarle; la qual cosa comunicata dal Segretario Signorelli al Sig. Lettieri, egli mostrò con una moderata non breve scrittura presentata nell'anno 1785, che l'ultimo a lui ignoto offervatore, per quel che appariva dalla di lui relazione, non avea sertato il metodo inculcato nella differtazione latina intorno all'uso del nostrale antifebbrile. E con diverse altre esperienze fatte da lui stesso successivamente dell'essicacia di esso tanto nelle febbri croniche quanto nelle essenziali acute. stabili vie più che tale acqua naturale o fattizia equivale alla chinchina. E nel medesimo anno, in alcune sue lettere Italiane dirette al Sig. Don Pietro Orlandi professore di medicina in Roma, ed al Signor Don Niccolò Beatrice prosessore di medicina in Fontanarosa, espose per le stampe altre sue nuove osservazioni fatte in alcune cure felici ettenute colla medesima lodata acqua termale de' notiri colli Leucogei.

Ma ciò che in quasi tutta l'Accademia ridestò l'attività e l'amor del travaglio, su la proposta fatta dal Segretario di un nuovo generale esame delle Memorie recitate o presentate negli anni precedenti, per iscerne una parte da comunicare al pubblico per le stampe. Si stabili che ogni classe in un particolare congresso deliberasse sulla maniera da tenersi in tale esame, essendo tutti persuasi che non tutto ciò che altrove si praticava, potesse appuntino convenire ad ogni paese. Adunatasi perciò la prima classe a' 7 d'aprile del medesimo anno, dopo varii pareri si conchiuse che ciascuna memoria si rivedesse dagl' individui che erano intervenuti, i quali dovessero al Segretario sotto la legge del silenzio

comunicare i giudizii ragionati e sottoscritti dettati dallo spirito di moderazione e di stima e di amicizia reciproca e regolati dal riguardo dell'onor del corpo e della nazione che dovea animarli a far la guerra al solo errore. Le Memorie concordemente approvate doveano serbarsi alla pubblicazione: quelle che richiedevano le seconde cure, rimettersi a' loro autori per correggersi o per dileguare i dubbi su di esse insorti: le riprovate custodirsi in archivio. Un general movimento di chi saggiava, o conseriva, o calcolava, o rettificava, o approvava ragionatamente, risultò da questa cura intrapresa con nobile ardore che recava ai buoni concittadini un tenero compiacimento, e faceva presagir per l'Accademia i più lieti giorni. Ma intanto che attendevasi a tal lavoro, suvvi chi pretese sar cangiare l'intrapreso metodo di esaminare in un altro che riuscisso men lungo; e propose che in ogni classe si rileggessero le Memorie, e se ne proponessero le opposizioni in faccia agli autori ilessi. A i più veramente non sembrò questa la vera maniera di afficurarsi della bontà e dell'importanza delle differtazioni, temendosi che i privati affetti potessero impedire la comparsa della nuda verità. Pur si raccolse la prima classe il di 21 di luglio di quell'anno per tentar questo nuovo cammino. Si approvarono concordemente alcune lezioni, ed altre se ne rimisero a più maturo esame. Ma non si lasciò di osservare quanto era facile agli autori ossentar docilità in lontananza, e quanto difficile il praticarla nel caso; non essendosi per anche rinvenuta l'arte di rimpastar l'uomo. La debolezza di un soverchio amor di se riusciva malagevole a conciliarfi coll'ascoltar fincere opposizioni che doveano ferirlo; e la tranquillità di qualche individuo non permetteva che si altercasse per sostenere il proprio avviso. Taluno disapprovò col filenzio e col contegno il nuovo metodo; molti si astennero d'intervenire, come sece fra gli altri il dotto e candido e sempre sospirato pensionario l'Ab. Sabatelli. Mancò a veduta l'ardore di mettere al vaglio

## XCN STORIA

le Memorie in faccia ai lero autori; e tutta l'Accademia (ad eccezione di ben pochissimi, a' quali soltanto poteva tornar conto la proposta novità) desiderò la continuazione del metodo primiero a pieni voti in più assemblee proposto ed adottato. Al sine in una sessione Accademica tenuta nella R. Segreteria alla presenza del primo Segretario di Stato si conchiuse di pubblicarsi frattanto le Memorie concordemente approvate. A norma de' giudizii portatine in iscritto e de' congressi tenuti, si procedè alla scelta delle dissertazioni non controvertite, le quali dovessero sormare il I Volume degli Atti preceduto dalla Storia dell'Accademia, riserbandosi le altre ad un secondo dopo i richiesti cangiamenti.

L' anno 1786 si attesero le sagge deliberazioni da prendersi dal nuovo Ministro di Stato intorno all'Accademia, le quali speraronsi sommamente propizie al bene nazionale, per la fama dei di lui lumi scientifici che grande e verace con tanto fondamento lo precedeva. Non s'intermisero le lezioni accademiche, benchè cominciassero a divenire più rare. Il chiar. Canonico Saladini di Bologna, laborioso nostro pensionario, il quale costantemente ci ha in ciascun anno comunicata una dissertazione, partecipò ancor da lungi delle cure accademiche, ora esaminando varie Memorie rimessegli anonime, sulle quali portava giudizii ragionati e imparziali, ora dando contezza di qualche recente analitica ricerca fatta in Italia. Egli nel mese di marzo dello scorso anno 1787 trasmise al Segretario un foglio di un matematico che occultando il suo nome pretendeva trasmutare in reali le radici immaginarie dell'equazioni di secondo grado, e quindi, assegnando queste medesime radici all'equazione di sesso grado derivativa di secondo, che è la ridotta di quella di terzo, credeva aver risoluto il caso irreducibile. lui problema col corollario dedottone si riconobbe per un paradosso dettato per altro da un abile analista. equazione \*+3/x+g=0 egli assegnava per radici.

$$\frac{D E L L A R. A.}{+f^{3}} \times \left( \frac{1}{f^{3}} + \frac{3 g f}{2} + g \sqrt{g - \frac{3 f^{3}}{4}} \right) \right) \\
+ \sqrt[3]{\left( \frac{1}{f^{3}} + \frac{3 g f}{2} + g \sqrt{g - \frac{3 f^{3}}{4}} \right)} \\
+ \sqrt[3]{\left( \frac{1}{f^{3}} + \frac{3 g f}{2} + g \sqrt{g - \frac{3 f^{3}}{4}} \right)} \\
+ \frac{f^{2} - g}{\sqrt[3]{\left( +f^{3} + \frac{3 g f}{2} + g \sqrt{g - \frac{3 f^{3}}{4}} \right)}} \\
+ \frac{f^{2} - g}{\sqrt[3]{\left( +f^{3} + \frac{3 g f}{2} + g \sqrt{g - \frac{3 f^{3}}{4}} \right)}} \right)$$

donde poi determinava quelle del terzo. Il giovanetto D. Annibale Giordano ed il Socio Signor Bifulco riconobbero separatamente essere le radici sudette uguali, e ciascuna di esse uguale a zero. In fatti il radicale

$$\sqrt[3]{(+f'+\frac{3gf}{2}+gV(g-\frac{3f'}{4}))}$$

ne mentisce soltanto la forma, ma è poi effettivamente

aguale ad 
$$+\frac{f}{2}+\sqrt{(g-\frac{3f}{4})}$$
. Le risoluzioni che si rimisero

al prelodato Pensionario ne' primi di d'aprile, si riconobbero dal medesimo per giuste ed eleganti e concordi ancora a quello che lo stesso anonimo autore ne pensava (1).

<sup>(1)</sup> Ciò rilevasi dalla lettera scritta dal Sig. Saladini al Signorelli a 16'd'aprile, colla quale trasmise ancora alcune copie delle Osservazioni sane dal chiar. geometra il Sig. Canterzani sul valor Cardanico esposte in una lettera impressa in Bologna lo scorso anno e diretta al medesimo Sig. Can. Saladini.

#### XCIV STORIA

Non era membro dell' Accademia il lodato Signor Giordano che di pochi mesi eccedeva i tre lustri della sua età, e si era con tale ardore e natural disposizione dedicato alle scienze esatte che i precoci frutti del suo ingegno a gloria del Sebeto sacevano in lui ravvisare un novello M. Pascal. Egli ottenne dal Sig. Presidente e dall' Accademia di recitare una Continuazione da lui tessuta della Memoria del Sig. Fergola del nuovo metodo proposto per risolvere i problemi di sito e posizione. E da allora continuò a partecipare delle cure accademiche; per la qual coia il benesico Sovrano prescrisse al Sig. Presidente di segnalare a suo arbitrio un sussidio mensuale a quest' ingegno nascente, per animarlo a proseguire gl' intrapresi studii matematici.

L'anno 1787 si attese all'impressione delle Memorie elette; se ne ascoltò qualche altra dell'erudito Pensionario Don Gennaro Vico sull'antica repubblica di Locri, della quale si attende la continuazione per pubblicarsi nel seguente volume insieme con altre de' Pensionarii Pacifico. Vairo e Fasano e del Socio Forges Davanzati. Il prelodato Sig. Saladini ha trasmessa all' Accademia una sua novella dissertazione su gli spazii analoghi ai cicloidali, e poi un' altra circa la quadratura, e la cubatura di alcuni spazii curvilinei che parimente riserbansi al nuovo volume. M. de Pastoret Configliere della Corte des Aides à Paques, il quale nel 1785 avea comunicato all' Accademia una novella traduzione francese dell'elegie di Tibullo e una dissertazione intorno all'influenza delle leggi maritime Rodiane fulle forze navali de' Greci e de' Romani, le trasmise non ha guari un dotto libro intitolato Zoroastre, Confucius et Mahomet comparati come settarii, legislatori e moralisti, con un quadro de' loro dogmi, delle leggi e della morale. Sperasi che il nostro Sovrano degni prescrivere, giusta i voti dell'Accademia, che questo laborioso ed erudito straniero venga alcritto tra' socii esteri che coltivano con successo gli studii dell'antichità remota; siccome ha già fatto con M. Marcard Medico di S. M. Britannica in Hannover, il quale oltre all'aver presentato egli stesso all'Accademia nel 1785 il primo volume della Descrizione delle acque minerali di Pyrmont tradotta dall'idioma Tedesco al Francese, ne ha nel passato anno trasmesso il secondo, e n'è stato per Real rescritto dichiarato socio estero aggregato alla secondà classe.

DA QUANTO si è di sopra accennato delle antiche e delle moderne scoperte fatte nelle scienze, e degli sforzi quali esti siensi (1) della nostra nascente Accademia che in questo volume al pubblico si presentano, risulta quest' utile verità, che ancor rimane in campo sì vasto non poco a spigolare, non poco a trovare, non poco a persezionare. Quanto non debbesi ai Galilei, ai Cassini, ai Cartesii, ai Leibnitz, ai Newton? Pure nel nostro secolo le loro scoperte hanno ricevuto notabil lustro ed incremento. Mercè del calcolo integrale quanta nuova luce non si è recata all'astronomia e alla fisica? Dopo le varie osservazioni del Picard e dell'Hook, credettero il Flamstèed e il Cassini poter per le proprie stabilire la parallassi delle sisse. Il Molineux nel 1725 notò che la y del dragone paisava verso il sud. Il Bradley ciò vide ancor meglio, e con molte altre offervazioni combinando felicemente i moti della luce e della terra, nel 1728 colla scoperta dell' aberrazione disfipò ogni idea di annua parallassi sensibile delle sisse. Colle accademieche ben pensate e ben dirette peregrinazioni si è determinata la figura della terra, e si è lavorato per risolvere il gran problema delle longitudini in mare. La mutazione dell'asse della terra, la librazione della luna, la precessione degli equinozii, il moto de' fatelliti e de' pianeti primarii che si attirano e delle comete che ad essi si

<sup>(1)</sup> Qui Italorum ingonio (diceva ne' suoi Commentarii il celebre Segretario dell'Accademia delle Scienze di Bologna Francesco Zanotti) nibil tribuunt, voluntati certe, si quid voluntas apud ipsos mereri potest, dent aliquid.

avvicinano, l'effetto della refissenza dell'etere su tali corpi, il flusso e rissusso del mare, le vibrazioni delle corde e le oscillazioni dell'aria sonora e le cagioni dei venti, tutte queste cose, dico, siccome non ignorano gl' intelligenti, sono state trattate con nuovi principii e con metodi diretti d'integrare per approssimazione meno foggetti ad errori. Avea il gran Newton abbozzato il calcolo delle perturbazioni e dei cangiamenti che potevano risultare dal non trovarsi sserici i corpi celesti. L'acutissimo Giovanni Bernoulli, sdegnando di occuparsi a calcolare sui di lui principii, si perdè a fare infruttuose opposizioni alla teoria della gravitazione. D'Alembert, Clairaut ed il grande Eulero con più vantaggio delle scienze aumentarono colle loro foluzioni analitiche la conoscenza del sistema del mondo, Graam, Dollond, Le-Roy ed ultimamente Hechell hanno trovati o ridotti a perfezione varii stromenti Simpson, Bouguer, La-Caille, Boscovick, astronomici. La-Lande, hanno proposti diversi metodi di osservare, e calcolare, Si sono più distintamente rassigurati gli astri e qualche pianeta colle sue lune che ancor si occultava. Tutto ciò non fa noverare con ragion veduta il nostro secolo tra quei pochissimi di sopra descritti, che si distinguono tralla folla delle andate età tenebrose, per lo splendore e per li progressi della mente umana?

Non pertanto dopo tanti vantaggi apportati allo scibile da' corpi accademici da che nacquero in Italia e si dissussero pel resto dell'Europa, e dopo i risultati del calcolo integrale e dei nuovi stromenti, l'immensità del cielo offre pure novelle speranze ed altri senomeni al calcolo ed alla dotta curiosità; e nelle sische molte importanti cose sono ancor problematiche. La durezza, l'elassicità, la sluidità dei corpi somministrano ancor curiosa materia agli sperimenti. L'elettricità, il magnetismo, l'aria sissa, colla ben nota selicità maneggiate da varii grand'ingegni, è specialmente dal Nollet, dal Franklin, dal Priestley, presentano tuttavia

#### DELLAR. A.

XCVII

un lontano vago orizzonte che invita col suo sulgore gli avidi offervatori, anmenta il coraggio degl'indefessi, e spaventa colla distanza gl'infingardi. La chimica fisica dopo i Bergman, gli Staal, i Lavoisier, i Lemeri, i Macquer, e la storia naturale dopo i Redi, i Valisnieri, i Rèaumour, i Buffon, i Daubenton ec., quale non serbano preziosa messe agli amatori del vero sapere? Il moto di traslazione offervato dal Sig. De la Lande nel sole ed in tutto il suo sistema, non dovrebbe stimolar gli astronomi a verificare. per quanto lor sia permesso, se posta, giusta il pensiero del Sig. Bailly, questo gran luminare rivolgersi con tutti i suoi pianeti intorno a qualche altro astro asfai più grande e più potente, nella guisa che intorno alla terra, a saturno, a giove, a venere ed al novellamente scoperto pianeta, Giorgio da prima appellato, rivolgonii le loro lune?

Le Accademie che fecero altra volta felicemente la

guerra alla spoglia del sapere, cioè alla vera ignoranza dei secoli sottoposti alla cieca autorità, la faranno costantemente alla superficialità, a' freddi verseggiatori, alla rancida pedanteria, agli etimologisti capricciosi ed agli antiquarii Aravaganti, tutti giurati nemici della vera eloquenza, della saggia filosofia, della scelta ben digerita erudizione e del buon gusto. Esse avrando sempre la mira a richiamar la gioventù alle scienze esatte, purchè sieno queste maneggiate senza. affettazione e senza una cieca preoccupazione contro le altre umane utilissime anzi necessarie cognizioni. Esse mostreranno ognora con nuova diligenza, secondo l'antica infinuazione di Bacone da Verulamio, quello che manca tuttavia alla massa comune del sapere, col sottoporre ad esame le nuove scoperte o fatte da buon senno o che si pretende di essersi fatte. Con tutto ciò esse non hanno sinora per l'Europa compiutamente recata tutta l'utilità che se ne spera, nè tutto a' proprii individui fatto assaporare quel dolce frutto di amitià, di focialità, di diletto che dovrebbero produrre. E' ciò effetto d'una mal accozzata unione, o sì bene della

#### XCVIII STORIA

natura dell' uomo foggetto al perenne ondeggiamento delle passioni che ne sugano la calma filosofica e l'armonia troppo necessaria per raccogliere in un sol centro le sparse sorze di ciascuno? Scorgesi per avventura questo spiacevole effetto soltanto in qualche speciale nascente Società, ovvero dalla storia ci si addita come universale e proveniente dall' organizzazione fisica e morale del cuore umano? Ouando tali corpi (diceva un valentuomo del nostro secolo ) godono della considerazione che lor si debbe; quando il governo gli pregia e gli sostiene e loro appresta mezzi per lavorare con profitto; quando a niuno invido ambizioso è permesso impunemente insidiarli con mine secrete per sovvertirli, o ridurli all'inazione; quando in somma sieno protetti e incoraggiati, allora questi corpi rispettabili diventano il sostegno della gloria e dell'utilità nazionale. La Chiesa (aggiungeva) veglia alla conservazione del sacro deposito della Religione; i Magistrati a quella del decoro inviolabile e dell'offervanza delle Leggi; ed alle Accademie delle Scienze e delle Belle Lettere (cioè di quelle lettere che sono belle quando non sono imbrattate dall'impostura, dall'ambizione fmoderata e dalla pedanteria orgogliosa) si appartiene l'onorato glorioso peso di far regnare nella nazione, a vantaggio del SOVRANO che le alimenta, un saper puro, solido e secondo di preziosi frutti destinati all' immortalità.

# **DISSERTAZIONI**



# DISSERTAZIONI

E

## MEMORIE MATEMATICHE.

I.

RISOLUZIONE DI ALCUNI PROBLEMI OTTICI
DEL SOCIO D. NICCOLÒ FERGOLA NAPOLETANO

Letta nella prima Assemblea tenuta nel 1780.



#### Defin. 1.

N corpicciuolo luminoso si dirà che irradii uniformemente, se allogatosi nel centro di una sfera vuota versi ugual quantità di luce sulle superficie di uguali segmenti sferici.

Defin. 2. La superficie di un corpo luminoso sarà ugualmente radiante, se ciascun de' suoi punti, intendendosi allogato nel centro di una sfera vuota, sparga ugual quantità di luce sulla superficie di un dato segmento sferico.

Cor. Allorche la superficie di un corpo luminoso è ugualmente radiante, non solo ciascun punto della medesima

dovrà diffonder luce con uniforme irradiazione: ma tutti con una stessa luce ne dovranno sfolgorar d'intorno.

Scol. Le sperienze che possiamo istituire su di un corpo luminoso non valgono a decidere, se i raggi della sua luce sieno ugualmente ssavillanti, e sotto un medesimo angolo inclinati tra loro, quei, che sono vicinissimi. Non si è adunque stimato convenevol cosa definire a priori codesta uniforme irradiazione, con avvisarne ch' ella consista nell'identico ssavillamento de' suoi raggi, e nella uguale inclinazione di que' che sono immediatamente tra se vicini; ma si è voluto piuttosto definirla a posteriori, come si è praticato quì sopra, senza punto avvilupparci in una disamina sì malagevole.

Defin. 3. Un corpicciuolo luminoso illuminerà direttamente un dato circolo, se al piano di questo sia perpendicolare la retta che dal di lui centro tirasi al corpicciuolo.

## PROP. I. TEOR.

Se il circolo NOY fia direttamente illuminato dal corpicciuolo S uniformemente radiante; la luce sparsa su di esso sarà direttamente come la differenza delle rette SN, SC, che Tav. 1. dal medesimo corpicciuolo si tirano alla circonserenza, e al Fig. 1. centro del circolo, ed inversamente come SN.

Caso 1. Sia primieramente un altro circolo ABX concentrico ad NQY, e seco giacente su di uno stesso piano; sarà ABX non meno che NQY direttamente illuminato dal corpicciuolo S. Si unisca il punto N col comun centro C per mezzo della retta CN, che si protragga, sinchè incontri la periferia ABX in A. Ed unita la retta SA descrivasi col centro S intervallo SC l'arco circolare CTP, che giaccia mel piano delle due rette SC, SA. Finalmente sissatto arco CTP con una persetta rivoluzione si concepisca volgersi d'intorno ad SC.

3 TH

Ciò posto egli è di per se chiaro, che la luce diffusa dal corpicciuolo S sul sottoposto circolo ABX, sia tanta, quanta si arresterebbe nella superficie del segmento sferico generato da PCO: e che parimente l'altra luce sparsa su l'intimo circolo NQY dal medesimo corpicciuolo S debba pareggiar quell'altra, che da esso si verserebbe sulla superficie generata da TC. Sarà dunque quella luce a questa, come la superficie del segmento sferico generato da PCO a quella di TC, cioè ( per ciò che ha dimostrato Archimede sulla sfera e sul cilindro) come CO a CG. Or essendo CO: CS:: AP: AS, e CS: CG:: SN: NT, farà per egualità ordinata CO: CG:: APXSN: NTXAS. E quindi la luce sparsa dal corpicciuolo uniformemente radiante S sul circolo ABX, ch'ei direttamente illumina, sarà a quella luce, che in simil guisa ne versa sull'altro NQY, come AP ad NT, e come SN ad SA.

Caso 2. Da un punto qualunque F della retta SC le fi alzi la perpendicolare FD giacente nel piano del triangolo SCA, e 'l triangolo SFD si volga in giro con perfetta rivoluzione intorno ad SF. Sarà, a cagion della divergenza dei raggi vibrati dal corpicciuolo S, tanta luce diffusa sul circolo DUH, quanta ne perverrebbe ad illuminare l'altro ABX. E quindi siccome questa, così quella starà alla luce versata dallo stesso corpicciuolo S sul circolo NOY in ragion composta di AP ad AS, e di NS ad NT. Or descritto col centro S intervallo SF l'arco circolare FR nel piano SFD. la prima ragione di AP ad AS adegua quest' altra di DR a DS: imperocchè sta AS: SC::SD: SF, e perciò convertendo, ed invertendo AP: AS:: DR: DS. E'dunque la quantità della luce sparsa dal corpicciuolo 8 sul sottoposto circolo DVH a quella che il medesimo ne versa sull'altro NQY in ragion composta di DR a DS, e di NS ad NT, cioè come il rettangolo di DR in NS all'altro di NT in DS, val quanto dire in ragion composta di DR ad NT, e di NS a DS. C. D. D. A gradient and relative state of ar

### -

#### PROP. IL TEOR.

La quantità della luce, che spargesi sulla ssera DBF dal corpicciuolo A unisormemente radiante, è direttamente come Tav. I. la differenza delle rette AC, AD, di cui la prima va dal corpicciuolo al centro della ssera, e l'altra tocca la di lei superficie, ed inversamente come la medesima AC.

Si concepisca ovunque un'altra sfera RQM ben auche illuminata dal medesimo corpicciuolo A, e in esse segnati i due circoli massimi DBF, RQM, ch' entrambi giacciano nel piano delle rette AC, AN. Dal punto A conducansi agli stessi circoli le tangenti AD, AM, e congiunti i semidiametri DC, MN, si calino su di AC, ed AN le

perpendicolari DP, ML.

Ciò premesso, egli è di per se chiaro, che i soli segmenti sserici DBF, RQM sieno dal corpicciuolo A illuminati: e che la luce versata su di essi sia la stessa di quella, che caderebbe respettivamente su i circoli di DP, e di ML. Laonde sarà quella luce a questa in ragion composta di AD—AP ad AD, e di AM ad AM—AL (prop. prec.). Ma pe' triangoli ADC, ADP tra se simili, la prima ragione è uguale a quella di AC—AD ad AC: e per gli altri triangoli AML, AMN anco simili sra loro la seconda ragione di AM ad AM—AL è la stessa che quella di AN ad AN—AM. Sarà dunque la luce sparsa dal corpicciuolo A sulla ssera DBF a quella ch'ei versa sull'altra RQM in ragion composta di AC—AD ad AN—AM, e di AN ad AC. C. D. D.

Cor. Sieno le due sfere MQR, FDB tra se uguali, è 1 corpicciuolo radiante A trovisi più vicino alla prima, che all'altra. Col centro A, e cogl'intervalli AM, AD sieno descritti i circoli ME, DS; sarà AN minore di AC,

e per lo contrario NE maggiore di CS, e sarà quindi EN

一个

molto maggiore di CS Adunque la luce che un corpicciuolo uniformemente radiante versa su di una data ssera, sarà tanto più copiosa, quanto esso le starà più da vicino.

#### PROP. III. TEOR.

Se i diametri delle sfere DUH, NQY sieno infinitesimi Tev. I.
rispetto alle loro distanze dal punto radiante S; la luce Fig. I.
versata su di esse sarà in duplicata ragione dei medesimi
diametri, e in duplicata inversa delle loro distanze dal
punto radiante S.

Si dispongano le due ssere DUH, NOY, sicche i loro centri F, e C giacciano a diritto col punto radiante S: e sieno DUH, NOY i due circoli massimi di esse, cui la SC insista perpendicolarmente, e si compia la sigura, come nella prop. 1 Ciò posto egli è chiaro che tali ssere sieno illuminate a di mezzo, e che la luce versata su di esse debba esser tanta, quanta ne illuminerebbe i circoli DUH, NOY. Ma queste illuminazioni sono fra loro (prop. 1.) come la superficie del segmento sserico PTC a quella di TC, cioè come PC a TG, o C, ovvero pe' triangoli simili ACP, NCT, come AC a CN: cioè in ragion composta di AC a DF, o sia di SC ad SF, e dell'altra di DF ad NC. C. D. D.

Scol. Premessi questi principi agevolmente si potran risolvere parecchi Problemi sull'illuminazione delle ssere. E i loro risultati non saran pure di una geometrica speculazione; ma serviranno ad intender bene quanta luce dal nostro Sole su de' Pianeti si versi, e quanta da' Primarjai loro Secondari, o da questi a quelli si ristetta.

The said of the sa

#### PROP. IV. PROBL.

Determinare la quantità della luce, che sparge la sfera luminosa CPQ sull'altra opaca AGT.

Si uniscano i centri di queste ssere per mezzo della retta RO, e sieno CPQ, AGT due circoli massimi delle medesime costituiti in uno stesso piano. Nel semidiametro PO della ssera luminosa prendasi ovunque una particella Na infinitesima, e ordinate le rette NC, nc, si tiri la retta CR, e sinalmente dal medesimo punto Cal circolo AGT conducasi la tangente CA.

Ciò premesso siz

RP=aPN=x farà RN=a+x, RN'=a'+2ax+x', CN'=2bx-x', RN'=a'+2ax+x', RN'=a'+2ax+x',

 $PO=b \qquad CR = \sqrt{RN' + (N')} = \sqrt{a^2 + 2f_s},$ 

RA = c RO = a + b = f  $CA = \sqrt{(CR' - RA')} = \sqrt{(a' + cfx - c')}$ 

e sarà di vantaggio l'armilla sferica generata da Cc proporzionale ad Nn., cioè a dx.

E perchè la luce, che dal punto luminoso C si dissonde sulla ssera AGT, è come  $\frac{RC-AC}{RC}$  (prop. prec...); sarà la quantità della luce sparsavi dalla fascetta sserica generata da Cc, come Nn, cui essa è proporzionale, e come  $\frac{RC-AC}{RC}$ .

cioè 2 dire come  $\left(1 - \frac{AC}{RC}\right) \times Nn$ , o sia come

 $dx-dx\times\sqrt{\frac{a+2fx-c^2}{a^2+2fx}}$ . E quindi la quantità della luce sparsa dall' intera superficie del segmento sferico CPB sulla sfera opaca AGT sarà come  $x-\int dx \sqrt{\frac{a^2-c^2+2fx}{a^2+f2x}}$  M.

Per integrare l'espressione  $-dx^{\sqrt{\left(\frac{a^2-c^2+2fx}{a^2+2fx}\right)}}$  si adoperi l'ovvia trasformazione di  $z^2 = \frac{a^2-c^2+2fx}{a^2+2fx}$ , sarà

$$x = \frac{a^2z^2 - a^2 + c^2}{2f(1-z^2)}, dx = \frac{2a^2zdz(1-z^2) + 2zdz(c^2 - a^2 + a^2z^2)}{2f(1-z^2)^2} = \frac{2c^2zdz}{2f(1-z^2)^2}$$

e quindi 
$$-dx \ V(\frac{a^2-c^2+2fx}{a^2+2fx}) = -\frac{c^2}{2f} \times \frac{2z^2dz}{(1-z^2)^2}$$

$$0r \int \frac{-c^4 \times \frac{2zdz \times z}{(1-\xi^2)^4}}{\frac{2}{2}} = \frac{c^4}{2f} \left( \frac{-z}{1-\xi^2} + \int \frac{dz}{1-\xi^4} \right), \text{ ed } \dot{e} di$$

vantaggio 
$$\int \frac{dz}{1-z^2} = +\frac{1}{2} L \left(\frac{1+z}{1-z}\right)$$
: farà dunque

$$-\int dx V\left(\frac{a^2-c^2+2fx}{a^2+2fx}\right) = \frac{c^2}{2f}\left(\frac{+z}{z^2-1} + \frac{1}{2}L\left(\frac{1+z}{1-z}\right)\right).$$

E restituendosi il valore della variabile x, avrassi

$$\int -dx \sqrt{\left(\frac{a^2-c^2+2fx}{a^2+2fx}\right)} = -\frac{1}{2f} \sqrt{\left(\left(a^2-c^2+2fx\right)\left(a^2+2fx\right)\right)}$$

+ 
$$\frac{c^2}{2f}$$
 L  $\left(\frac{\sqrt{(a^2+2fx)} + \sqrt{(a^2-c^2+2fx)}}{\sqrt{(a^2+2fx)} - \sqrt{(a^2-c^2+2fx)}}\right)$   
E quindi la luce, che fi versa dal segmento sferico

E quindi la luce, che si versa dal segmento sserico imminoso CPB sulla ssera opaca AGT, sarà espressa dalla seguente formola N

$$+\frac{c^3}{4f}$$
 L.  $\frac{2a^3+4fx-c^3+2V((a^3-c^3+2fx)(a^3+2fx))}{c^3}+C$ 

È determinatasi la costante C supponendo che svanisca questo integrale, quando sia x = 0; sarà l'integrale completo della nostra formola uguale ad

$$x - \frac{1}{2f} \vee \left( (a^{3} - c^{3} + 2f_{N})(a^{3} + 2f_{X}) \right) + \frac{a}{2f} \vee (a^{7} - c^{3})$$

$$+ \frac{c^{3}}{2f} L_{a} \left( \frac{2a^{3} + 4f_{X} - c^{3} + 2\sqrt{((a^{3} - c^{3} + 2f_{X})(a^{3} + 2f_{X}))}}{c^{3}} \right)$$

$$- \frac{c^{3}}{4f} L_{a} \left( \frac{2a^{3} + c^{3} + 2a\sqrt{(a^{3} - c^{3})}}{c^{3}} \right)$$

$$= x + \frac{1}{2f} \left( (a\sqrt{(a^{3} - c^{3})} - \sqrt{((a^{3} - c^{3} + 2f_{X})(a^{3} + 2f_{X}))}) \right)$$

$$+ \frac{c^{3}}{4f} L_{a} \left( \frac{2a^{3} + 4f_{X} - c^{3} + 2\sqrt{((a^{3} - c^{3} + 2f_{X})(a^{3} + 2f_{X}))}}{2a^{3} - c^{3} + 2a\sqrt{(a^{3} - c^{3})}} \right) P$$

Cor. 1. Si concepisca condotta la retta CA, che tocchi si Tav. 1. l'uno, che l'aktro de' mentovati circoli massimi. Tirati i Fig. 4 semidiametri OC, RA, si prolunghi OR, sinchè incontri la mentovata tangente in F. E poichè l'ascissa PN, che corrisponde al punto del contatto C, è uguale ad  $\frac{ab+bc}{a+b}$   $= \frac{ab+bc}{f}$ : se nell'ultima formola P si surroghi  $\frac{ab+bc}{f}$  in luogo della variabile x; si avrà la luce totale, che dissonde la sfera luminosa CPQ sull'opaca AGT: cioè Q

$$\frac{ab+bc}{a+b} + \frac{1}{2a+2b} \left( aV(a^2-c^2) - V((a^2+2ab+2bc-c^2)(a^2+2ab+2bc)) \right) + \frac{1}{4(a+b)} \left( \frac{2a^2+4b(a+c)-c^2+2V(a^2+2b\cdot a+c-c^2)(a^2+2ab+2bc)}{2a^2-c^2+2aV(a^2-c^2)} \right)$$

Cor. 2. Col vertice principale G, e col centro R si descriva Tav. I. l' iperbole parilatera GVM, e di essa un asintoto ne sia la rema RSD: col centro R intervallo RC si descriva il

circolo CL, e dai punti L e P si elevino ad RO le perpendicolari LD, PS, che incontrino l'asintoto RD nei punti D ed S: sarà la luce, che la superficie del segmento luminoso generato da PC ne versa sulla ssera opaça AGT, proporzionale al quadrilatero mistilineo DMVS. Imperocchè nella formola M, che desinisce sissatta quantità di luce, ponendosi V(a+2fx)=y, sassi y=a+2fx,

E quindi  $y^{2}-c^{2}=a^{2}+2fx-c^{2},$   $\sqrt{(y^{2}-c^{2})}=\sqrt{(a^{2}+2fx-c^{2})}$ E perciò la formola anzidetta  $\int dx-\int dx \sqrt{\left(\frac{a^{2}-c^{2}+2fx}{a^{2}+2fx}\right)}$ trasmuterà nella seguente  $\int \frac{ydy-dy\sqrt{(y^{2}-c^{2})}}{f}$ 

#### PROP. V. PROBL.

Sia il diametro della sfera opaca AGT picciolissimo rispetto alla sua distanza dall'altra tuminosa CPQ, ritrovare quanta luce CPQ dissonda su di AGT.

Premessa la medesima costruzione del Probl. prec. sia RP=a, PN=x, PO=b, RA=c; sarà RN=a+x, RC=a'+2ax+2bx=a'+2fx (facendo f=a+b'), e l'armilla sserica di Cc proporzionale ad Nn, cioè a bdx. Or la quantità della luce, che sissatta armilia luminosa versa sulla ssera opaca AGT è direttamenta, come la sua superficie e come il quadrato di RA, ed inversamente come il quadrato di RC (prop. 3.). Sarà dunque tal luce proporzionale a bcdx: e quindi quella, che dall'intera superficie del segmento sserico di CP si spargerà sulla medesima ssera

opaca, farà come  $\int \frac{bc^3dx}{a^2+2fx}$ , cioè come  $\frac{bc^3}{2f}$  L  $(a^2+2fx)+C = \frac{bc^3}{2f}$  L  $(\frac{a^2+2fx}{a^2})$ . E furrogandosi in quest' ultima espressione in luogo della variabile x la grandezza  $\frac{ab+bc}{f}$  (cor. 1. pr. 4.); sarà la luce versata dalla sfera luminosa CPQ sull'opaca AGT proporzionale a  $\frac{bc^2}{2a+2b}$  L  $(\frac{a^2+2ab+2bc}{a^2}) = \frac{bc^2}{2a+2b}$  L  $(\frac{a+2b}{a})$ 

Cor. 1. Che se il diametro b della sfera luminosa sia eziandio picciolissimo rispetto alla sua distanza dalla sfera opaca, siccome addiviene ne' Pianeti illuminati dal Sole; l'ultima espressione rapportata in questo Problema si convertirà nella seguente  $\frac{bc^2}{2a}$  L  $\left(\frac{a^2+2ab}{a^2}\right)=\frac{bc^2}{2a}$  L  $\left(1+\frac{2b}{a}\right)=\frac{c^2b^2}{a^2}$ 

Cor. 2. E quindi tali illuminazioni saranno direttamente come le superficie illuminate, e quelle delle ssere illuminatrici, ed inversamente come i quadrati delle loro distanze.

#### PROP. VI. PROBL.

Risplendano ugualmente gl'infiniti punti del circolo TNO, determinare quanta luce da esso dissondasi sulla ssera opaca Tav. I. ABE: supposto che la retta BC, che attraversa i loro fig. 6. centri, sia perpendicolare al circolo luminoso TNO.

Si tagli la data sfera EBA con un piano che passi pel suo centro, e per quello del circolo TNO: onde ne sia il circolo BEA la sezione nata nella sfera, e la retta OT quella che ne nasce nel circolo luminoso. Sia di vantaggio BC = a, BE = c, ed una qualunque ascissa CD = x; sarà una di lei parte infinitesima Dd = dx: e condotta dal punto D la retta DE tangente al circolo (EAB, e l'altra DB che passi pel centro di esso; sarà  $BD = V(a^2 + x^2)$ , e DE = DE = C

V(a²-c²+x²). Ciò posto, perchè la quantità della luce sparsa dall'anello circolare generato da Dd sulla ssera opaca ABE è direttamente come la superficie di esso, direttamente come la differenza di DB e DE, ed inversamente come DB (prop. 2.): ed è poi tal anello proporzionale a 2xdx, come di per se comprendesi; sarà la luce versata sulla ssera opaca ABE dall'anello luminoso di Dd, come

 $2xdx-2xdx\sqrt{\left(\frac{a^2-c^2+x^2}{a^2+x^2}\right)}$ . E quindi la luce, che l'intere

circolo di CD diffonde sulla medesima sfera, sarà

S 
$$x^2 - \int 2\pi d\pi \sqrt{\left(\frac{a^2-c^2+x^2}{a^2+x^2}\right)} + C$$
.

Per integrare la parte  $-2xdxV(\frac{a^2-c^2+x^2}{a^2+x^2})$ , facciafi  $x^2=py$ 

farà 
$$-2xdx\sqrt{(a^2-c^2+x^2)} = -pdy\sqrt{(a^2-c^2+py)}$$
. E farà

questa parte così trasformata integrabile come la formola M nella prop. 4.

### PROP. VII. PROBL.

Risplendano ugualmente gl'infiniti punti della ssera luminosa Tav. I. MLT, investigare l'intensità della luce prodotta nel dato Fig. 5. luogo A suori della sua superficie.

Si congiunga il dato luogo A col centro G della sfera luminosa per mezzo della retta AG, e si concepisca esser essa perpendicolare al piano rFq. Passi inoltre un altro piano per GA, che segni nella sfera il circolo massimo B?

MBT, e nel piano rFq la retta rq: Ciò posto sia AB=a, BG=b, e BC=x; farà AG=a+b, ed AC=a+x. Si prenda in BC la parte Cc infinitesima, e dai di lei estremi C, e c si ordinino CD, cd, e si unisca DA: sarà AD=V(a<sup>2</sup>+2ax+2bx), e l'anello sferico generato dall'archetto Dd proporzionale a  $C_c$ , cioè a dx. Or l'intensità della luce prodotta nel luogo A dai raggi, che fi vibrano dalla zonetta sferica di Dd, è direttamente come la sua superficie, e come il seno dell'angolo DAr, o del suo uguale ADC, ed inversamente come il quadrato di AD. Sarà dunque

tal luce nella sua intensità proporzionale a  $(a^2+2ax+2bx)^{\frac{3}{2}}$ ( posto il raggio = 1). E quindi l'intensità prodotta nel medesimo luogo A dai raggi spiccati dall'intera superficie del segmento sferico DBL sarà

 $=\int_{\left(a^{2}+2ax+2bx\right)^{\frac{1}{2}}}^{dx(a+x)}$ 

Per integrar fiffatta espressione facciasi a + 2ax + 2bx=y,

for integral intratta expressione faction 
$$a = 2ax + 2bx$$

$$a = x = x + 2a + 2b$$

$$a + x = a^2 + 2ab + y^2$$

$$2a + 2b$$

$$2a + 2b$$

$$2a + 2b$$

$$2a + 2b$$

Quali valori sostituendosi nella formola U, ella trasformerassi nella seguente, cioè

$$\int dy \left( \frac{a^{2}+2ab+y^{2}}{2(a+b)^{2}y^{2}} \right) = \frac{1}{2(a+v)^{2}} \left( \frac{y^{2}-a^{2}-2ab}{y} \right) + C.$$

74

e restituendo il valore della variabile », sarà

$$\int \frac{dx(a+x)}{(a^2+2ax+2bx)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2(a+b)^2} \left( \frac{2ax+2bx-2ab}{\sqrt{(a^2+2ax+2bx)}} \right) + C =$$

$$\frac{1}{(a+b)^a}\left(\frac{ax+bx-ab}{\sqrt{(a+2ax+2bx)}}\right)+\frac{b}{(a+b)^a}\cdot Z$$

determinandosi C col supporre che svanisca codesto integrale, quando sia n=0.

13 400

Cor. Si meni dal punto A la retta AM tangente al circolo MBT; farà l'ascissa BN, che corrisponde all'ordinata per lo contatto uguale ad  $\frac{ab}{a+b}$ . E quindi surrogandossi nell'espressione Z in luogo della variabile x il mentovate valore determinato  $\frac{ab}{a+b}$ , essa cangerassi nella seguente

Laonde l'intenfità della luce prodotta nel luogo A dai raggi della sfera luminosa MBT sarà direttamente come il di lei semidiametro, ed inversamente come il quadrato della distanza del luogo A dal centro della medesima sfera.

# PROP. VIII. PROBL.

Dal centro B del circolo luminoso LFQ siasi etevata la Tav. I. perpendicolare BA al di lui piano; determinare l'intensità Fig. 7. della luce nel luogo A preso nella medesima perpendicolare.

Sia BL un qualunque semidiametro del proposto circolo, e di esso la parte BC sia una qualunque ascissa dal centro, e Ce una di lei parte infinitesima. Si unisca AC, e sia AB=a, BC=x; sarà AC= $V(a^2+x^2)$ , Ce=dn, e l'anello circolare generato da Ce proporzionale ad xdx. Ma siccome si è sopra avvisato, l'intensità della luce, che nel luogo A costituiscono i raggi emanati dal riserito anello, è direttamente come la sua superficie, e come il seno dell'angolo ACB, ed inversamente come il quadrato di CA. Sarà dunque tale intensità come  $\frac{axdx}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$ . E quella che quivi ne costituiscono i raggi del circolo del semidiametro BC, sarà proporzionale a  $\int \frac{axdx}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$ . Ma l'integrale determinato di sissatta

espressione è uguale a  $\sqrt{(a^2+x^2)-a}$   $\sqrt{(a^2+x^2)}$ 

Dunque l'intensità della luce prodotta in A dai raggi del circolo di CB sarà direttamante come la differenza di CA

ed AB, ed inversamente come AC.

Cor. 1. E perchè in questa medesima ragione (prop. 1.) è la quantità della luce, che un corpicciuolo unisormemente radiante da A spargerebbe sul sottoposto circolo di CB da esso direttamente illuminato; sarà l'intensità della luce prodotta in A dai raggi del circolo luminoso di CB, come l'illuminazione ch'ei riceverebbe da un corpicciuolo radiante situato in A.

Cor. 2. Finalmente questa legge d'intensità è identica a quella, onde un corpicciuolo allogato in A sarebbe attratto al circolo di CB, i di cui punti lo tirassero con sorze uguali decrescenti come il quadrato della loro distanza da esso corpicciuolo (1).



<sup>(1)</sup> Newton Princip. Mat. Sect. XIII. prop. 40.

# 是是是過去了

### ΙI

# SOPRA LE CAUSTICHE DI GIROLAMO SALADINI CANONICO BOLOGNESE

#### ACCADEMICO PENSIONARIO

Comunicata alla Reale Accademia l'anno 1781.

I. A Vvegnache abbia io consultato Matematici illustri li quali trattano dei raggi, che si dicono Rissessi e Rifratti, e delle curve, nelle quali si dispongono li punti estremi di loro, e che si conoscono sotto il nome di Caustiche, come sarebbero li Bernulli, l'Hopitale, ed altri non pochi; pure mai non mi è occorso di vedere questa dottrina utilissima, e sublimissima derivata da un solo ed unico principio, nè ampliata ed illustrata conforme la sua dignità richiede. Anzi i problemi, che gli Algebristi chiamano inversi, spettanti questa materia, e che certamente sono di gran difficoltà, o si patlano sotto filenzio, o appena si accennano. Nessuno similmente mai non si è avveduto, che la cotanto celebre teoria, per quanto io sappia, dei Circoli Osculatori, e dell'Evolute altro non sia, che un rampollo di quella delle Caustiche, e che questi due estesi rami della Geometria fublime, come in uno stesso tronco si potessero riunire. Pertanto non credo di dovere incorrere nella riprensione, come se mi sossi occupato intorno a cose, o già persezionate, ovvero riputate sterili, se jo abbia tentato di supplire quei

disetti, dai quali sembravami non peranche immane una parte di Matematica, che nella Fisica ha moltissima influenza. Lessi, è già qualche tempo, nell'Accademia delle Scienze di Bologna una Dissertazione, nella quale dissusamente esposi di quanto avessi io promotso la 'dottrina dei raggi rissessi, e risratti, e da cui surono prese le cose, che si contengono nelle grandi Istituzioni Analitiche composte unitamente al sommo Analista Conte Vincenzo Riccati, e nel Compendio d'Analisi da me satto ad uso della R. Accademia de' Cadetti di Napoli. Soltanto mancava al desiato compimento di sciorre il problema fra gl'inversi il più arduo, nel quale si suppone cognita la situazione del punto radiante, la legge di rissessione, o di risrazione, e la Caustica; si cerca poi da ciò la Lirea rissettente, o refrangente.

II. Scelto questo argomento per la presente Memoria; prima d'ogni altra cosa sa d'uopo convenire, che a riguardare la quistione geometricamente, il raggio rissesso, generalmente Tav. II parlando, non differisca dal refratto, che nel puro nome. Fig. 1. Cada il raggio AB nella Curva BC, e fia riflesso per BP; conducati QBY normale alla Curva: l'angolo QBP, il quale vien formato dal raggio riflesso BP, e dalla retta QB porzione della normale che esiste da una stessa parte della Curva col raggio incidente, fi dice, come è noto, angolo di riflescene. Se poi il raggio AB di là dalla Curva devii dalla propria direzione BH, nella BL, l'angolo YBL contenuto dal raggio BL, e dalla retta BY porzione della normale alla Curva, che giace per riguardo alla Curva stessa, dove non è il racgio incidente, vien detto angolo di refrazione: e perciò la disserenza sostanziale tra questi due angoli è, che uno vien formato dal raggio, che devia con una porzione della perpendicolare alla curva, e l'altro è fatto dallo stesso raggio coll'altra porzione della stessa perpendicolare. Dunque l'angolo di ritleissone sarà complemento a due retti dell'angolo di refrazione, e al contrario. Pertanto chiaramente si comprende, che la rissessione, e la refrazione

17 mg

si possono ottimamente considerare sotto l'aspetto generale d'un deviamento del raggio incidente AB dalla sua direzione, e che allora dicasi rislesso se giunto alla curva torni a dietro, rifratto se trapassi: per lo che i problemi concernenti la riflessione si possono mutare in altri di rifrazione, e al rovescio a piacimento: poichè sì gli uni che gli akri dagli stessi principii derivansi, e risolvonsi colle stesse formole. Così se data sia la curva BC, e si voglia il raggio rifratto; supponendo, che il seno dell'angolo d'incidenza ABQ stia al seno dell'angolo di rifrazione YBL in ragion costante. verremo alle stesse conseguenze, che se supposta la curva stessa, e la stessa legge tra il seno dell'angolo d'incidenza ABO, ed il seno del complemento dell'angolo di ristessione QBL, si cercasse il raggio rissesso. Per la qual cosa se chiameremo generalmente angolo d'inflessione qualunque angolo venga fatto dal raggio, che travia, e dalla porzione della perpendicolare alla curva posta dalla stessa banda, dove trovasi il punto radiante per riguardo alla curva medesima, potremo generalmente comprendere col vocabolo. d'inflessione tutti li problemi della rissessione, e della rifrazione. I seni poi, e li cosseni, ovvero le altre linee trigonometriche dell'angolo d'inflessione, saranno ciò, che patentemente mostrerà, se di quà, o di là dalla curva giaccia il raggio inflesso, vale a dire, se stiasi nel caso particolare di riflessione, o'di rifrazione.

III. Sia ora PK un arco: infinitesimo della caustica riserita al punto A, dal quale escano li raggi incidenti nella curva inflettente che cercasi BC. Dal punto A si conducano li raggi AP, AK alla caustica; e per li punti P, K passino i raggi inslessi della curva BC; nei punti B, C, dove cadono li raggi AB, AC, si alzino le normali alla curva QBY, QCZ, che concorrano in Q. Essendo gli angoli ABO, OAB eguali agli angoli OCP, OPC, sarà l'angolo BPC=CAB+ABQ-ACQ+QBP-QCP. Ma gli angoli ABQ, ACQ sono gli angoli d'incidenza,

e gli angoli QBP, QCP sono gli angoli d'inflessione; perlochè ACQ - ABQ farà il differenziale dell' angolo d'incidenza, e QCP-QBP quello dell'angolo d'inflessione: dunque se faremo l'angolo BAC=de, l'angolo d'incidenza  $=\mu$ , e d'inflessione  $=\pi$ , e l'angolo BPC= $d\alpha$ ; avremo in termini analitici  $d\alpha = d\mu - d\mu - d\pi$ . Col centro P, e col raggio PC si descriva l'archetto infinitesimo CN; perchè gli angoli QCB, PCN fono retti, levato il comune QCN rimarrà l'angolo NCB uguale a quello d'inflessione QCP=7: quindi preso qualunque raggio = r, chiamando l'archetto BC=ds, si faccia questa proporzione r:C $\pi$ ::ds:NC= $\frac{ds.C\pi}{s}$ , In oltre abbiamo r:BPC::NP (eguale a BP, che nomineremo z): NC; dunque farà in espressione algebrica r:dα::2: dsCπ; dal che si ha  $=\frac{d_sC\pi}{dx}$ . Abbiamo supposto, che li raggi BP, CK sieno infinitamente vicini, e che s'incontrino in P; onde chiamata PK=du, fara CK-BP=dz=du-BN  $=du-\frac{dsS\pi}{r}$ , ed integrando sarà  $z=u+A-\int \frac{dsS\pi}{r}$ , eguagliando li valori di z, nascerà l'equazione u+A-Rimane che esprimiamo la u con rette della curva cercata. Sia AP=q,AB=y e l'angolo APB=o; calata dal punto A in PB la normale AS avremo PS= qCφ; ma è AB = BP + AP = 2BPS; dunque algebraicamente farà  $yy=zz+qq=\frac{2qzC\varphi}{z}$ ; e sostituendo il valore di  $z=u+\Lambda$  $-\int \frac{dsS\pi}{r}$ , farà yy= $\left(u+\Lambda-\int \frac{dsS\pi}{r}\right)+qq-\left(\frac{2qC\phi}{r}\right)\left(u+\Lambda-\frac{2qC\phi}{r}\right)$ 

In questa equazione, supposto che conosciamo la caustica,

19 TH

fi otterrranno le quantità q,  $\frac{C\varphi}{r}$  per la u; adunque la u sarà una funzione di y, e  $\int \frac{dsS\pi}{r}$ , e perciò ancora  $\frac{dsC\pi}{d\alpha}$  sarà una funzione delle stesse quantità variabili, la quale indicata per F:, risulterà l'equazione finale F: y,  $\int \frac{dsS\pi}{r} = \frac{dsC\pi}{d\alpha}$ .

IV. Le cose sin qui dette delle curve riferendole al suoco vagliono ancorchè questo da loro sia infinitamente lontano, e perciò i raggi incidenti giungano alla curva inflettente paralleli: ma in simil caso il calcolo diventa assai intralciato a cagione delle rette y, q, che riescono infinite; sarà dunque miglior consiglio appigliarsi al metodo, che adesso propongo. Sia FL un arco della caustica, che si riserisca alle coordinate ortogonali AQ = p, QF = q:FB sia Tav. II. il raggio inslesso della curva AB riferita alle coordinate riginali AC = x, BC = y, e sia la linea delle ascisse AQ della caustica perpendicolare all' AC linea delle ascisse della curva inslettente; producendo BC sino a QF, sarà FD =

q-x, BD=y+p; dunque BF<sup>2</sup>= $zz=u+A-\int \frac{ds \mathcal{E}\pi}{r} = q-x+v+p^2$ ; ed essendo p, q date per u, poiché abbiamo cognita la caustica, dalla predetta equazione si potrà dedurre il valore di u dato con sole rette appartenenti alla curva inflettente: sarà pertanto u=F:x, y,  $\int \frac{ds \mathcal{E}\pi}{r}$ .

Laonde nel caso del parallelismo dei raggi incidenti l'equazione generale della curva inflettente sarà

 $F: x, y, \int \frac{dsS\pi}{r} = \frac{dsC\pi}{d\alpha}$ ; notandosi che nel valore  $d\alpha = d\mu$ .

-dx svanisce l'angolo infinitesimo  $d\epsilon$ .

Si sostituiscano ora in vece di  $d\epsilon$ ,  $d\mu$ ,  $d\pi$  i loro valori  $\frac{rds}{r}$ ,  $\frac{rdS\mu}{C\mu}$ ,  $\frac{rdS\pi}{C\pi}$  nell'equazione  $z=\frac{dsC\pi}{d\alpha}=\frac{dsC\pi}{d\epsilon-d\mu-d\pi}$ , e risulteranno le seguenti equazioni, cioè per li raggi derivanti da un punto posto a distanza finita sarà

$$F: y, \int \frac{dsS\pi}{r} = \frac{ydsC\pi^2C\mu}{rd\pi C\mu C\pi - ryC\pi ds\mu - ryC\mu dS\pi}, e per li raggi$$
paralleli 
$$F: \overline{n, y, \int dsS\pi} = \frac{dsC\pi^2C\mu}{r}$$

$$= -rC\mu dS\pi - rC\pi dS\mu$$

Se si ponga  $S_{\pi}$ , e per conseguenza  $C_{\pi}$  + r, la quale ipotesi è appunto quella dei raggi d'osculo, e delle evolute, avremo per li raggi ch' escono da un punto,

 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{y} = \frac{\mathbf{v} ds C\mu}{+ dx C\mu + \mathbf{v} ds \mu}$ : e per li raggi paralleli  $\mathbf{F} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \frac{ds C\mu}{+ ds \mu}$ . Ma fe fia  $\mathbf{C}\pi = 0$ , cioè  $\mathbf{S}\pi = +r$ , allora per li raggi non paralleli che si spandono da un punto abbiamo  $\mathbf{z} = 0$ ; il che indica confondersi la curva inflettente colla caustica; lo stesso ancora addiviene per li raggi paralleli.

Finalmente se suppongasi  $C\pi = C\mu$ , e  $S\pi = -S\mu$  ovvero  $C\pi = -C\mu$ , e  $S\pi = S\mu$ , nel qual caso li raggi non sossirono dalla curva intiessone alcuna, si trova  $z = \pm y$ , onde la caustica si consonde col punto radiante, e perciò u = 0; l'equazione poi della curva inflettente F: y,  $\int \frac{dsS\pi}{r} = \frac{dsC\pi}{d\alpha}$  diventa y = y, il che indica, che qualunque curva soddisfaecia al questo.

V. Ma è ormai tempo di schiarire con esempj questa generalissima teoria. Venendo i raggi paralleli inslessi da una curva in maniera, che l'angolo d'incidenza sia eguale all'angolo d'inslessione, dopo essi si raccolgano tutti in un punto, si cerca la curva inslettente. Sarà nel presente caso.

Tav.II. Sπ=Sμ, Cμ=Cπ; ma descritto col centro A, e col raggio AB Fig. 1. l'archetto infinitesimo BM, nasce l'angolo CBM eguale

all'angolo d'incidenza ABQ= $\mu$ ; perchè tanto l'angolo CBM, quanto l'angolo ABQ coll'angolo QBM fa un retto: dunque chiamata BM=dx, MC=dy, farà  $S\mu = \frac{rdy}{ds}$ ,  $C\mu = \frac{rdx}{ds}$ ; onde fatta la sostituzione nell'equazione  $F: x, y, \int \frac{dsC\pi}{ds} =$ 

$$\frac{dsC\pi^{2}C\mu}{-rC\pi dS\mu-rC\mu dS\pi}, \text{ otterremo}$$

$$-y = \frac{-ds^{2}}{2ddy}, \text{ cioè} - 2yddy+dx^{2}+dy^{2}=0.$$

Si ponga pdx=dy, farà dpdx=ddy, confiderata dx come invariabile: dunque fostituendo il valore di ddy nella equazione, versà -2ydp+dx.  $\overline{1+pp}=o$ , cioè  $\frac{2pdp}{1+pp}=\frac{dy}{y}$ . Ed essendo in questa equazione le variabili separate, agevolmente si potrà integrase, e si ritroverà, che la curva ricercata sia la parabola.

In altra maniera si ponga pdy = dx, differenziando, supposta dx costante, sarà dpdy+pddy=o; ed introdotti li valori di ddy, e di dx nell' equazione -2yddy+dx'+dy'=o, conseguiremo  $-\frac{dv}{2v}-\frac{dp}{p(pp+r)}-\frac{dp}{p}-\frac{pdp}{1+pp}$ , e sommando  $\sqrt{b}$   $\sqrt{v}=\sqrt{(1+pp)}$ , ossia b+bpp=ypp, e  $\sqrt{b}$   $\sqrt{(v-b)}=p=\frac{dx}{dy}$ , cioè  $\frac{dv\sqrt{b}}{\sqrt{y-b}}=dx$ ; e di nuovo sommando avremo  $A+x=2\sqrt{by-bb}$  ossia  $A+x^2=4by-bb$ : equazione, che dimostra la parabosa essere la curva, che si voleva.

Si può rendere palese brevemente la stessa verità adoperando l'equazione  $zz=u+A-\int \frac{dsS\pi}{r} = p+y^2+q-x^2$ , sopra riportata al f 4. trattando delle formole dei raggi paralleli. Imperocche essendo nella presente ipotesi la caustica un punto, sarà u=0, e le rette p, q faranno costanti, ed essendo in oltre  $z=\mu$ , sarà  $\int \frac{dsS\pi}{r} = y$ ; nascerà pertanto

l'equazione A-y'=p+y'+q-x', offia AA-pp-zy.A+p=q-x' equazione alla parabola, in cui le y sono in una linea parallela all'aise; dal che si raccoglie, che i raggi incidenti nella curva debbano effere paralleli all'affe. Si disponga l'equazione nella maniera seguente  $\frac{A-p}{2}$  -y.  $\frac{1}{2A+2p}$   $\frac{1}{2A+2p}$ farà 2A+2p il parametro della parabola per riguardo all'affe. Dovendo nel vertice effere  $\frac{A-p}{2}-y=0$ , farà  $y=\frac{A-p}{2}$ ; dunque = A - y, farà  $= \frac{A + p}{2}$ . Laonde il punto d'unione dei raggi inflessi, che necessariamente dee trovarsi nell'asse, è distante dal vertice della parabola per la quantità A+p eguale alla quarta parte del parametro. Perchè poi l'angolo d'incidenza ABQ dee effere minore del retto, il sarà l'angolo ancora d'inflessione QBP; e perciò il raggio inflesso BP sarà ristesso. Se si voglia l'angolo d'incidenza maggior del retto, l'angolo d'inflessione il sarà altresi; dunque il raggio incidente, e l'inflesso cadono dalla stessa parte della curva, e perciò samo nel caso della ristessione.

VI. Sieno i raggi paralleli inflessi da una curva si, che tra il seno dell'angolo d'incidenza, e d'inflessione siavi una costante ragione, e sieno costretti ad unirsi in un punto: si domanda la curva inflettente. Perchè abbiamo  $= u + \Lambda - \int \frac{ds}{r}$ , annullandosi l' z, ed essendo  $Sz = nS\mu$ , come vuole la supposizione (nè una quantità costante, che esprime la costante ragione dei due seni) sarà  $z = \Lambda - ny$ , e perciò sacendo uso dell'equazione  $z = q - x + p + y^2$ , nella quale le q, p sono costanti, poichè la cautica u si raccoglie in un sol punto; si otterrà  $A = x^2 + y + y^2 + y + y^2 = posta q - x = g$ , e attualmente sacendo li quadrati, si troverà 1 - nn.  $yy + 2py - 2\Lambda ny + gg + pp - \Lambda \Lambda = o$ : equazione generale di tutte le sezioni coniche, cioè della parabola, se sia n = 1, dell'ellisse se sia n < 1, dell'iperbola, se sia n > 1.

Chiamato l'angolo retto  $=\omega$ , effendo l'angolo di rifrazione eguale a  $2\omega - \pi$ , come abbiamo notato al  $\int 2.$ , e sapendosi dalla trigonometria essere  $S_{2\omega - \pi} = S_{\pi}$ ; quindi si scorge agevolmente, che mediante l'equazione, con cui si è risoluto il problema proposto, si possa risolvere altresì il problema volgare, nel quale si vuole una curva, che rinfrangendo li raggi che in essa incorrono paralleli, con legge che il seno dell'angolo d'incidenza stia al seno dell'angolo di refrazione in una costante ragione, li determini ad unirsi tutti in un punto.

VII. L'equazione della caussica sia pp=q, e suppongansi eguali gli angoli d'incidenza, e d'inflessione. Differenziando verrà 2pdp=3qqdq, e dp=3qqdq: 2p=\frac{1}{2}q\frac{1}{2}dq; dunque du=  $\sqrt{dq'+dp'}=dq\sqrt{1+\frac{2}{q'}}$ , ed  $u=\frac{8}{27}$ ,  $z=u+A-y=\frac{8}{27}$ .  $1+\frac{2}{q'}+A-y$ . Essendo i triangoli LMF, FDB simili, farà Fig. z. FL=du: ML=dq:: BF=z: FD=q-n; dunque  $z=\frac{du}{dq}\times \overline{q-x}$ : parimente si trova  $z=\frac{du}{dp}\overline{p+y}$ ; e confrontando questi valori di z, farà  $q-x=\frac{dq}{dp} + y = \frac{2p}{3qq} + y$ ,  $\in 3q^7 - 3q^7x - 2pp = 2py$ , cioè q=3q=x=2y. Dallo stesso confronto dei valori di z ne càviamo l'altra equazione  $\frac{8}{27} \cdot 1 + \frac{1}{2}q^{\frac{1}{2}} + A - y = \frac{du}{q-x} = \sqrt{1 + \frac{1}{2}q}$   $\times q - x$ : dal che deducesi  $\frac{8}{27} \cdot 1 + \frac{1}{2}q^{\frac{1}{2}} - \sqrt{1 + \frac{1}{2}q} \times q - x + A = y$ . Finalmente paragonando i valori della y risulterà l'equazione  $\frac{16}{1+\frac{1}{2}q^2}$   $-2\sqrt{1+\frac{2}{2}q} \times q - x + 2\Lambda = q^{\frac{3}{2}} - 3q^{\frac{3}{2}}x$ , nella quale data la q facilmente si determina la x; sostituito il valore della x nell'equazione q = 3q = 2v fi determinerà fimilmente la y. Per la qual cosa porremo costruire la curva inflettente defiderata. L'equazione di questa curva è algebraica, ma assai implicata. Spessissimo nelle presenti ricerche ciò avviene, e se l'algebrista non sia industrioso, dissicilmente otterrà le costruzioni delle curve instettenti.

VIII. Per determinare la curva inflettente dopo che fi era ritrovato il valore di z dato per y, x potevamo aver ricorso all' equazione  $F: x, y, \int \frac{dsS\pi}{r} = \frac{dsG\pi^2C\mu}{-rC\pi dS\mu - rC\mu dS\pi}$ ; ma questa operazione stancherebbe il più paziente calco. latere.

IX. Non sembrami doversi passare sotto silenzio, che se sila  $\int \frac{dsS\pi}{r}$  quantità algebraica, ed u data sia algebraicamente per p, q coordinate di caustica algebrica, si possa costruire la curva inflettente, ed ottenere la sua equazione senza calcolo integrale col solo ajuto dell'equazioni  $z = \frac{du}{dq} \frac{1}{q-x}$ ,

 $z = \frac{du}{dp} p + y$ ,  $z = u + A - \int \frac{dsS\pi}{r}$ . Imperocchè data la caustica avremo col mezzo di queste tre equazioni altre due tra x, y, o p, o q, ovvero u, secondo che il calcolo riuscirà più breve; dunque eliminata la variabile, che appartiene alla caustica, nascerà un' equazione fra m, y coordinate dalla curva inflettente.

Se trattisi d'evolute essendo z=u+A, se l'evoluta siz rettissicabile, si farà passaggio senza calcolo integrale alla equazione della curva generata dallo sviluppo; se u data siz trascendentemente per p, o per q, si dovranno maneggiare i soli differenziali del primo ordine.

X. Non reputo similmente suor di proposito indicare come si delinei meccanicamente la curva instettente AC, se i raggi incidenti sieno paralleli, se gli angoli d'intlessione e d'incidenza sieno eguali, e se data sia la caustica AFO.

Tav. II. All'estremità B della riga BCN stante sopra AR in A Fis. 3 perpendicolarmente si leghi l'estremità A del silo AFO avvolto intorno la caustica AFO; scorra la riga BCN con moto parallelo sopra AR, e si procuri che la perzione BC del silo BCF eguale all'arco AF sia distesa sopra BN, e l'altra porzione CF sia perpetuamente tangente la caustica

in F: io dico, che con questo svolgimento il punto C descriva la curva inflettente. Si conduca ME infinitamente vicina a BC, e sia EO il raggio inflesso, CY sia normale ad ME, ed EX a CF, e CR alla curva CE. Essendo per le cose dette CX=du—dz=AO—AF+CF—EO=ME+EO—AF+CF—EO=ME—BC=EY, sarà l'angolo CEX eguale all'angolo YCE per la similitudine dei triangoli CEX, YCE; ma l'angolo CEX è eguale all'angolo d'inflessione RCF, e l'angolo ECY a quello d'incidenza BCR. Adunque la curva ACE è la curva inflettente ricercata.

XI. Dopo d'avere bastantemente illustrata con esempj la teoria dei raggi paralleli, conviene fare il fimile per riguardo all'altra dei raggi, che provengono da un punto. Si spandano da un punto i raggi, e s'inflettano da una curva per modo, che facendo l'angolo d'inflessione eguale a quello d'incidenza di nuovo convengano in nn punto: si desidera la curva inflettente. Sarà dunque Sa Su, e z  $=u+A-\int \frac{dsS\pi}{s}=2a-y$ , facendo A=2a. Divenendo, come richlede il problema, u=0, e  $\int \frac{dsS\pi}{r} = \int \frac{dsS\mu}{r} = y$ , l'equazione  $\mathbf{F}: y_2 \int \frac{dsS\pi}{r} = \frac{ydsC_T^*C\mu}{rdxC_TC\mu-yrC_TdS\mu-yrC\mu dS}$ si cangerà in quest'altra  $2a-y=\frac{ydsC\mu^2}{rdxC\mu-2rvdS\mu}$ ; ma è rdx $= dsC\mu$ ; dunque  $\frac{2a-2v}{2av-vy}dy = \frac{2S\mu dS\mu}{C\mu^2} = -\frac{2C\mu dC\mu}{C\mu^2} = \frac{2dC\mu}{C\mu}$ ; ed integrando  $\frac{r^a}{2ay-y^2} = C\mu^2 = \frac{rrdx^2}{dx^2+dy^2}$ , onde  $\frac{rdy}{\sqrt{(2ay-yy-rr)}} =$ dx, ed  $\frac{rrdy}{y\sqrt{(2ay-yy-rr)}} = dt$ . Volendo integrare questa equazione, si risolva la formola 2ay-yy-rr nei suoi fattori  $(\sqrt{aa-rr+a-y})(\sqrt{aa-rr-a+y})$ , e per maggior chiarezza fi ponga  $\sqrt{aa-rr+a=p}$ ,  $\sqrt{aa-rr-a=q}$ ; fi faccia poscia D

farà  $y = \frac{puu-q}{1+uu}$ , p-y.  $u = \frac{p+q}{1+uu}$ , u, u and u ariabile introdotta):

fatte adunque le debite sostituzioni si troverà  $\frac{rrdy}{y\sqrt{(2\sigma y-yy-n)}}$ 

 $=\frac{2du}{pun-a}=d\varepsilon.$ 

Dal che si vede che la integrazione della formola, e la costruzione della curva dipende dai logaritmi. Si eviteranno le quantità immaginarie, se prendasi a > r, il che si può fare senza pregiudizio dell' universalità. Dimostro essere questa curva l'ellisse Apoltoniana. Essendo ds = dx + dy, farà  $ds = \frac{2ay - y^2}{2ay - y^2} dy$ . Questa formola, senza cangiarne le quantità, così si disponga

le quantità, così si disponga  $ds = \frac{aa - rr \cdot vv + aavv + 2av \cdot rr - av}{2ayrr - yyrr + aavv - aayy - (aa - rr - aa)} dy^2, e fatta <math>\sqrt{aa - rr}$  = c si metta  $y = \frac{cx + aa}{a}$ , da cui viene  $dy = \frac{cdz}{a}$ ; poichè  $c = \sqrt{aa - rr}$ , fatta la sostituzione di cc in vece di aa - rrsarà  $ds' = \frac{ccyy + aayy + 2ay \cdot r - ay}{ccyy - (cc - aa + ay)^2} dy^2$ , ed eseguite l'altre,

sarà  $\frac{y^2dz' + yydy' - 2y \cdot z + c}{ccyy - (zc - aa + ay)^2} dy^2$ , ed eseguite l'altre,

 $(y^2-(z+c)^2) dz^2+ydy-(z+c)dz^2): (y^2-(z+c)^2)$   $= dz^2+\frac{ydy-(z+c)dz^2}{v^2-(z+c)^2}. \text{ Si ponga } \frac{ydy-(z+c)dz}{\sqrt{(yy-(z+c)^2)}} = du, \text{ farà } u$   $=\sqrt{py-(z+c)^2}, \text{ offia } \frac{aa}{rv} uu = aa - zz, \text{ equazione all'ellisse}$ Apolloniana. Ma indipendentemente dall'equazione 2a-y  $= \frac{ydsC\mu^2}{rdzC\mu-2rydS\mu}, \text{ fi conosce subito essere la curva una ellisse}$ 

Apolloniana; imperocchè essendo nel caso nostro z=2a-f,

farà z+y=2a; dunque la curva ha questa proprietà, che condotte a ciascun punto di essa due rette da due punti la somma loro è eguale alla quantità costante 2a; il che sappiamo ad altro non convenire che all'ellisse Apolloniana.

XII. Poste le stesse cose del problema precedente, cangiata soltanto la legge dell'eguaglianza dell'angolo d'incidenza coll'angolo d'inflessione nell'altra, che vuole il seno dell'angolo d'incidenza al seno dell'angolo d'inflessione in ragion costante: vuolsi determinare la curva inflettente. Posta questa ragione 1:1, sarà Sumpsu, onde 2014.

$$\int \frac{dsS\tau}{r} = A - n \int \frac{dsS\mu}{r} = A - n\gamma, \ e \ z + n\gamma = A. \ Se$$

dunque da due punti fissi inclineremo alla curva due rette z, y, nel medesimo punto, varrà l'equazione z+ny=A.

Da questa equazione, anzi dall'equazione  $z=A-\int \frac{dsS\pi}{r}$ purchè sia  $\int \frac{dsS\pi}{r} = F : \overline{y}$ , e li raggi escano, e si riuniscano

in un punto, si ritrova l'equazione della curva instettente nel modo, che sono per dire. Il problema adunque sarà: si debbe ritrovare una curva tale, che condotte da due punti sissi A, B a qualunque punto della curva M, due Tav. II. rette AM, BM, sia BM più una funzione di AM eguale Fig. 4. ad una costante: condotta AB passi la curva per C, e pongasi CB=c, AB=a, CD=p, DM=q, sarà AM= $\sqrt{a-c+p^2+qq}$ , e BM= $\sqrt{c-p^2+qq}$ ; dunque  $\sqrt{c-p^2+qq}+F$ :  $\sqrt{(a-c+p)^2+qq}=A$ . E posta  $F:\sqrt{a-c+p^2+qq}$ , la quale equazione liberata dai radicali monta al quarto grado. Per determinare A si noti essere CA= $\frac{A-c}{a}$ ; dunque  $\frac{A-c}{a}=a-c$ , ossi na

-nc+c=A; che fia  $CA=\frac{A-c}{n}$  fi raccoglie fubito dalla condizione del problema, dovendo effere nCA+CB=A.

XIII. La caustica, che si suppone data, sia una spirale logaritmica, che ha per proprietà caratteristica l'angolo Fig. 1. AKP, fatto dal raggio AK e dal latercolo KP della curva costante; ed in oltre li raggi diffusi da un punto vengano inflessi da una curva in modo, che l'angolo d'incidenza eguagli quello d'inflessione: si cerca la curva inflettente. Sarà dunque  $\varphi$ , e per ciò la ragione di r:  $C\varphi$  costante: ed essendo  $r: C_{\phi}:: du: dq$ , sarà  $dq = \frac{C_{\phi}}{r} du$ , e integrando  $q = \frac{C\phi}{a+a}$ , per ciò nel problema presente l'equazione fopra ritrovata al § 3.  $yy = u + A - \int \frac{d sS \pi}{r} + qq - \frac{2qC\phi}{r} \times$  $(u+A-\int \frac{dsS\pi}{s})$ , (poste le due costanti A, a eguali al zero per non inoltrarci in calcoli troppo scabrosi), si troverà eisere uu-2uy=0; dal che avremo u=0, u=2y; ma è z= z + A - y; dunque z = -y, z = y. Pertanto F : y,  $\int \frac{ds S \pi}{s} = \frac{ds S \pi}{s}$ ydsCπ'Cμ
rdπCμCπ-yrCμdSπ-yrGπdSμ nel caso presente diventa +y=  $\frac{ydsC\mu^2}{dsC\mu^2-2rydS\mu}$ , dal che fi ricava  $+dsC\mu^2-dsC\mu^2=+$  $2yrdS\mu$ ; onde abbiamo  $dS\mu = 0$ , e  $\frac{ds}{v} = \frac{rdS\mu}{Cu^2}$ . Integrata la prima di queste equazioni ricaviamo, che la µ sia costante; laonde essendo costante l'angolo ABQ, sarà costante altresì l'angolo fatto dal raggio incidente AC colla curva inflettente BC, poiche amendue presi insieme sanno un retto; dunque la curva inflettente ricercata è una spirale logaritmica,

29 TH

Rimane a determinare l'angolo  $\mu$ , ovvero più tosto l'angolo ACB satto dal raggio y colla curva instettente, vale a dire sa d'uopo scoprire la relazione, che passa sra l'angolo accennato e l'angolo cognito  $\varphi$ . Nel caso nostrogli angoli BAC, PAK, perchè eguali al terzo BPC, sono eguali fra loro; sarà dunque y:dx::q:dp, chiamato dp l'archetto infinitesimo PT. Abbiamo in oltre y:dy:q:dq, poichè s'è provato  $q=\frac{uC\varphi}{r}=\frac{C\varphi}{r}$ 2y. Dunque dx:dp:2 dy:dq, ed alternando dx:dy:dp:dq; e perciò li triangoli rettangoli BMC, PTK sono simili, e gli angoli BCM, PKT sono eguali; laonde la nostra curva inslettente è simile alla caussica.

Esaminiamo ora l'altra equazione  $\frac{ds}{v} = \frac{rdS\mu}{Cu^2}$ , e vediamo che cosa indichi. Essendo  $ds = \frac{rdy}{Su}$ , si tramuta in  $\frac{dy}{y} =$  $\frac{S\mu dS\mu}{C\mu^2} = -\frac{dC\mu}{C\mu}$ ; ed integrando  $\frac{rr}{r} = C\mu = \frac{rdx}{ds}$ ; da questa equazione fi ricava  $\sqrt{\frac{rdy}{(yy-rr)}} = dx$ , offia  $\frac{rrdy}{y\sqrt{(y^2-rr)}} = dx$ . Si ponga  $\sqrt{yy-rr}=g$ , farà  $\frac{dy}{\sqrt{(yy-rr)}}=\frac{dq}{yy}$ , ed yy=gg+rr; onde  $\frac{rrdy}{\sqrt{(ry-rr)}} = \frac{rrdg}{gg+rr} = d\varepsilon$ ; ed integrando, l'arco del quale sia raggio r, tangente g, sarà eguale ad e+A; dunque y è la secante dell'angolo &+A, e perciò la linea inssettente ricercata è una linea retta. Abbiamo sopra veduto che nella ipotesi di questa equazione sia u = 0, e z = -y; dunque la caustica sarà un punto; e li raggi si uniranno di là dalla retta inflettente per riguardo al punto radiante. Vale a dire che nel presente caso l'inflessione si riduce a rissessione, e li raggi riflessi sono divergenti, li quali si uniscono virtualmente in un punto di là dalla retta in maniera, che congiunti li due punti radiante e caustico per mezzo di

una retta, questa sarà perpendicolare alla retta rissettente;

e verrà divisa da questa per metà.

XIV. Giova esporre un altro metodo, nel quale facendo uso dei primi differenziali solamente, con maggior facilità si ritrovano l'equazioni delle curve inslettenti, data la caustica, la legge d'inflessione, e il punto radiante. Nel triangolo BAP fatto al solito AB=y, AP=q, l'angolo ABP =φ, ed ABP=μ+π, avendosi dalla trigonometria li dati di ciascun triangolo în ragion dei seni degli angoli opposti, fara  $y:q::S_{\varphi}:S_{\mu+\pi}$ ; dunque  $yS_{\mu+\pi=q}S_{\varphi}$ . In questa equazione  $\pi$  è dato per  $\mu$ , poichè si suppone nota la legge tra l'incidenza, e l'inflessione. Dunque  $S_{\mu+\pi}$  sarà una funzione di y, dx, dy. S $\varphi$  poi è una funzione di q, essendo data la caustica; pertanto avremo q per y, dx, dy. In oltre abbiamo già dimostrato esser  $z=u+A-\int \frac{dsS\pi}{r}$ , e perchè u è data per q dall'equazione della caustica, sarà z data per q, y, dy, dx; furrogato questo valore nella terza equazione  $zz=yy-qq+\frac{2zqC\varphi}{r}$ , troveremo similmente q per y, dy, dx. Finalmente paragonando li valori di q, ne verrà l'equazione tra y, dy, dx, la quale determina la curva inflettente ricercata. Se torni più conto, potremo adoperare u in vece di q; poichè essendo data la caustica vi sarà equazione fra q, ed u. Coll'ajuto adunque di tre equazioni si risolve il nostro problema, cioè I.  $yS = qS\varphi$ , II.  $z=u+A-\int \frac{ds^2\pi}{r}$ , III.  $yy-qq+\frac{2\sigma zC\phi}{r}=zz$ .

XV. Dilucidiamo l'esposta dottrina coll'esempio della spirale logaritmica nell'ipotesi, che l'angolo d'incidenza sia eguale a quello d'instessione, la caustica sia una logaritmica spirale, e li raggi incidenti partano da un punto. Essendo l'angolo d'incidenza eguale a quello d'instessione, l'equazione y  $S_{\mu+\pi}=qS_{\varphi}$  diventa  $yS_{2\mu}=qS_{\varphi}$ , e z=u+A-y è quella in cui si cangia  $z=u+A-\int \frac{dsS_{\pi}}{r}$ . Avendosi ora dalla

Trigonometria  $S_{2\mu} = \frac{2S\mu C\mu}{r}$ , ed essendo  $S_{\mu} = \frac{rdy}{r}$ ,  $C_{\mu} = \frac{rdy}{r}$  $\frac{rdx}{ds}$ , e  $S\varphi = \frac{rdp}{ds}$ , eseguite le sostituzioni sarà  $\frac{2vdydx}{ds^2} = \frac{qdp}{ds}$ ; Ma è du : dp in ragion costante per la nota proprietà della logaritmica spirale, la quale se mettasi come 1:n, sarà  $\frac{2ydydx}{ds^2}$  = qn, offia  $q = \frac{2ydydx}{nds^2}$ . Di più essendo z = u - y(lascio la costante, che non altera la natura del metodo), ed avendosi dalla caustica  $du: dq::1:\sqrt{1-nn}::1:m$  (posto  $\sqrt{1-nn}=m$ ), farà mdu=dq, ed integrando mu=q, cioè  $u = \frac{q}{m}$ ; farà pertanto  $z = \frac{q}{m} - y = \frac{2y dy dx}{m} - y$ . questo valore nell'equazione  $zz=yy-qq+\frac{2QzC\phi}{z}$ , sarà  $\frac{4yydy^2dx^2}{n^2m^2ds^2} - \frac{4yydydx}{nmds^2} + yy = yy - \frac{4yydy^2dx^2}{n^2ds^4} + \frac{4ydydx}{nds^2} \times$  $m\left(\frac{2ydxdy}{nmds^2}-y\right)$ , ovvero  $\frac{4yydy^2dx^2}{n^2m^2ds^4}$   $\frac{4y^2dxdy}{nmds^2}$   $\frac{4y^2dy^2dx^2}{n^2ds^4}$  $\frac{4myydxdy}{nds^2}$ ; e dividendo per  $\frac{yydxdy}{nds^2}$ , farà  $\frac{dydx}{nm^2ds^2} = \frac{dydx}{nds^2}$ -m,  $e \frac{dydx}{dx^2} \times \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{m} - m$ , cioè  $\frac{dydx}{dx^2} = nm$ , offia dydx=nm. dx+dy; e ordinando per dx farà dx= dydx ===  $dy^*$ , la quale se risolvasi da  $dx = \frac{dy + \sqrt{1 - 4n^*m^*}}{2}$  $\frac{dy \pm dy(1-2n^2)}{2}$ , cioè  $dx = dy \times \frac{2-2nn}{2} = \frac{mdy}{n}$ ,  $dx = \frac{ndy}{m}$ . Queste equazioni sono alla logaritmica spirale, la seconda delle quali è totalmente simile alla caustica proposta, dp==  $\frac{ndq}{m}$ . La curva  $dx = \frac{ndy}{m}$  ferve alla soluzione del proposto problema, in cui si suppone la caustica  $dp = \frac{ndq}{m}$ .

dell'equazione  $dx = \frac{mdy}{n}$  vale per la caustica  $dp = \frac{mdq}{n}$ ; nell'uno e nell'altro problema si giunge alla stessa equazione  $\frac{dxdy}{ds^2}$  mn, che risulta da due equazioni soddisfacenti ai sopraddetti due problemi. Ma dimostriamo, che la curva inflettente e la caustica debbano essere totalmente simili. Dovendo essere la curva RBC la logaritmica spirale, e fegnatamente una delle due  $dx = \frac{mdy}{n}$ ,  $dx = \frac{ndy}{m}$ , come già si è veduto, l'angolo ABR sarà costante; sarà ancora costante l'angolo d'incidenza, e quello d'inflessione eguale a questo: dunque tutto l'intero angolo ABP sarà costante; e perciò gli angoli ABP, ACP sono eguali. Per la qual cosa essendo nei triangoli BAO, POC gli angoli ad O eguali, ed eguali ancora gli angoli ABO, PCO, faranno parimente eguali gli angoli BAM, NPC; ma BM, CN sono eguali, come si è dimostrato, poiche l'angolo d'incidenza è eguale a quello d'inflessione; saranno dunque eguali ancora AB, BP, e il triangolo ABP sarà isoscele, e sopra la sua base AP cade normalmente BQ, che divide l'angolo ABP in due parti eguali; la quale essendo normale ancora alla curva BC. faranno AP, BC parallele; adunque l'angolo APB farà eguale a PBC alterno, ossia all'angolo ACB per adequazione, e perchè l'angolo ABP eguaglia l'angolo K; pertanto nei triangoli rettangoli BMC, PTK, gli angoli BCM, TKP fono eguali; dunque dx:dy:dp:dq; ma è dp:dq::n:m; ficche dx: dy::n:m. Laonde se l'equazione della caustica sia  $dp = \frac{ndq}{m}$ , l'equazione della curva inflettente sarà dx = $\frac{ndy}{m}$ ; se quella sia  $dp = \frac{mdq}{n}$ , que sia sarà  $dx = \frac{mdy}{n}$ , e perciò la caustica e la curva inflettente sono la stessa curva.

XVI. Ancora nel presente caso dei raggi, che si dissondono in giro da un punto, se l'angolo d'incidenza sia eguale

eguale all'angolo d'infiessione, collo svolgimento dei fili che avvolti sieno intorno alle caustiche, si possono delineare le carve inflettenti. S'avvolga un filo che ha una estremità Tav. II filla in A intorno alla caustica PR, e si distenda in maniera. Fig. 5 mentre si svolge, che la porzione BP continuamente tocchi: la caustica: io dico, che lo stilo posto in B e che scorre lungo il film steso, come si è detto, descriva la curva ricercata. Sieno due posizioni dello stilo infinitamente vicine ABP, ACR, e si produca BP sino che concorra con CR in K, farà AC+CR=AB+BP+PR=AB+BK+RK; e coi: centri A, K descritti gli archi BM, CN, e tolti gli equali AB, AM; KC, KN, e la comune KR, rimane CM. =BN. Dunque li triangoli rettangoli BCN, BMC fono eguali e simili; e perciò gli angoli MBC, BCN sono sra loro egueli; ma condotta QB normale alla curva BC è l'angolo-MBC eguale all'angolo d'incidenza ABQ, e l'angolo NCB è eguale all'angolo d'inflessione QBP. Dunque dalla curva BC. Il raggi che si uniscono nella caustica PR sono talmente inflessi, che l'angolo d'incidenza eguaglia l'angolo 

XVII. Prima di lasciare questa materia, piacemi di dire qualche cosa dell'uso, che può avere la nostra dottrina nell'Ottica

1. Venendo il vertice della parabola ad avere per circolo osculatore quello, il cui raggio è la metà del parametro pied umendosi tutti i raggi di luce paralleli all'asse, che urtano nella cavità della parabola in un punto dello siesso asse, dopo che sono stati dalla parabola rissessi, il qual punto è distante dal vertice per la quarta parte del parametro, quindi i raggi di luce parabeli all'asse di uno specchio concavo circolare, che in questo urtando sieno rissessi, purobe lo specchio sia una porzione picciola: di un circolo, si raccoglieranno in un punto dell'asse, che sarà distante dallo specchio la quarta parte del diametro, imperocchè le due

Æ

34 MW

superficie del circolo e della parabola nel presente caso si confondono.

2. Se da un punto posto nell'asse di uno specchio concavo circolare diffondendosi i raggi della luce sieno dallo specchio rislessi, facilmente si trova il punto del concorso dopo la rissessione. Imperocchè lo specchio circolare, se sia picciola porzione di sfera, si può considerare come ellittico. fecondochè insegna la teoria dei circoli osculatori. Si chiami r il raggio di esso circolo, il diametro primario dell'ellisse sa =2y, il secondario =2x, sarà per la natura dell'ellisse il diametro del circolo osculatore nel vertice, cioè 21 = 2xx. Inoltre nell'ellisse la distanza del suoco dal vertice è p ± √yy-zx; e chiamata a la distanza del punto radiante dal medefimo vertice, avremo a=y+vyy-x==y+vyy-yr; dunque -- y = yy -yr; e perciò aa-2ay = -yr, ed y =  $\frac{aa}{2a-r}$ , e  $2y-a=\frac{ra}{2a-r}$ , che è appunto la distanza ricercata. Se sia azz, sarà la distanza del concorso dei raggi ristessi dallo specchio =r, cioè i raggi ritornano a unirsi nello stesso punto, da cui si sono sparsi. Se sia a= -, la distanza del concorso sarà infinita, cioè li raggi dopo la riflessione cammineranno paralleli. Se finalmente sia  $a < \frac{r}{2}$ , la distanza è negativa, cioè i raggi riflessi sono divergenti in maniera, che se si producano di là dallo specchio, concorrono nella distanza dallo specchio = ra

Licraggi della luce paralleli all'asse di una sente eincolare, che sia per altro picciola porzione di ssera, sieno nifratti dalla lente; si vuole il punto del concorso dei raggi nifratti. Per la dottrina dei circoli osculatori, questa picciolissima porzion di superficie sserica si può consondere con un vertice di ellisse, o d'iperbole, anzi se il raggio del

circolo dicasi r, il parametro dell'ellisse, o dell'iperbole osculata nel vortice da questo circolo sarà 21; ma nel § 6. abbiamo dimostrato essere l'ellisse e l'iperbole quella curva che rifrange li raggi, posto che gl'incidenti sieno paralleli che il seno dell'angolo d'incidenza sia a quello di rifrazione in ragion costante, e che il concorso dei rifratti sia in un punto; dunque se si trovi questo punto per riguardo al vertice di lenti ellittiche e iperboliche, si saprà ritrovare ancora per, rispetto alle lenti circolari. Chiamata la relazione del seno dell'angolo d'incidenza al seno dell'angolo di refrazione 1:n fi faccia nn-1:1:: r alla quarta che chiamo c. Se m-t fia quantiță negativa, si faecia 1-nn:1::r alla quarta che pur dicafi c; col parametro 2r e col diametro ac si supponga descritta l'iperbole nel primo caso, e l'ellisse nel secondo. La distanza del fuoco dal vertice di queste curve (come con non lungo calcolo si potrebbe dedurre dal § 6., se la cosa non fosse assai nota) è appunto la distanza del concorso dei raggi rifratti dal vertice d'esse curve; e perciò dalla lente circolare. Ora si sa dalle sezioni coniche che quella distanza è c+Ves+cr, ovvero c+Ves-cr, ossiz  $\frac{r}{ns-1}+\sqrt{\left(\frac{rr}{(nn-1)^2}+\frac{rr}{nn-1}\right)}$ , ovvero  $\frac{r}{1-nn}+\sqrt{\left(\frac{rr}{(1-nn)^2}-\frac{rr}{1-nn}\right)}$ . Dalle quali formole per l'iperbole si ricavano le distanze del due fuochi  $\frac{r}{n-1}$ ,  $\frac{r}{n+1}$ , e per l'ellisse  $\frac{r}{1-n}$ ,  $\frac{r}{n+1}$ . Posto n eguale a 🚉, il che prossimamente si verifica, quando li raggi di luce passano dal vetro nell'aria; allora la distanza del punto di concorso dalla superficie circolare sarà eguale a 27, cioè eguale al diametro, come si ricava dalla prima formola per l'iperbole. Questa distanza poi è eguale a 3r, come indica la prima formola per l'ellisse, se sia  $n=\frac{1}{2}$ , il che si ha prossimamente, quando sa luce dall'aria passa nel vetro. Le altre formole non fanno al caso. Non mi sermo a trattare minutamente di queste cose, nè a diciserarle conforme la loro dignità vorrebbe, perchè non è mis

E 2

intendimento di dare un trattato pratico d'Ottica; ma di far vedere soltanto l'influsso delle nostre teorie nella pratica adducendone un qualche esempio.

4. Se i raggi incidenti non sieno paralleli, ma da un punto spandendosi urtino in una superficie, che sia una picciola porzione di circolo, il cui raggio sia = r, questa porzione di circolo si può consondere col vertice di una curva, della quale parlammo al § 12., e la cui equazione è

 $na-nc+c=n\sqrt{a-c+p+qq}+\sqrt{c-p+qq}$ ; a è la distanza

Tav. II. del punto radiante A dal punto B, dove eoncorrono i raggi Eig. 4. rifratti, cioè abbiamo —AB; c è la distanza dello stesso punto B dal vertice della curva C; B: n è la ragione del seno dell'angolo d'incidenza al seno dell'angolo di rifrazione.

Supposta p infinitamente picciola, sarà n(a-c)+c-

 $2\sqrt{c-p}+qo \times n.a-c+c+c^2-2cp+qq=nn.a-c^2+2n^2p^2,a-c$ 

Annqq, cioè (2nc.a-c+2cc-2cp-2nnp.a-c-nnqq+qq):

 $(2.n(a-c)+c)=c+\frac{-cp-n^2p(a-c)+\frac{1-nn}{2}qq}{=\sqrt{cc-2cp+qq}},$ 

ed alzando a quadrato, e tralaseiati i termini che svaniscono,

farà  $2c \times -cp - nnp. \overline{a-c} + \frac{1-nn}{2}qq - na-nc+nnc.qq - 2cp$ , cioè

 $\frac{2c \cdot m-1 \cdot c-a}{a-c+nc} p=qq$ . La distanza del punto radiante A dal vertice della curva C si dica =b, sarà c=a-b, ed eseguita

la sostituzione sarà  $\frac{2b \cdot n-1 \cdot a-b}{b(1-n)b+na}p=qq$ ; per la qual cosa la

parabola del parametro  $\frac{2b \cdot \overline{n-1} \cdot \overline{n-b}}{(1-n)b+na}$ , oppure il circolo,

il cui diametro fia questa stessa quantità, sarà l'osculatore della nostra curva nel vertice C, e perciò le curvature loro del tutto si consondono. Si chiami dunque r il raggio di questo circolo, che sarà lo stesso del raggio della nostra lente circolare proposta; avremo  $r = \frac{b \cdot n - 1 \cdot a - b}{(1-n)b + na}$ , dal che si ricava  $\frac{rb - bb \cdot 1 - n}{b(n-r) - nr}$ ; avremo pertanto cognita la distanza del punto radiante dal punto di concorso dei raggi ristratti. Acciocche si scuopra la distanza di questo punto dalla lente, dal valore di a si dee togliere la b; ciò eseguito sarà a  $\frac{rb}{b \cdot n - 1 - nr}$ . Gli esempi proposti bastino per dare a divedere quale uso possa farsi comodamente della dottrina, in questa memoria dichiarata, intorno alle curve instettenti, e alle caustiche, per risolvere i questi più interessanti dell'ottica pratica.



•

. .

• • •

-

•

.

.

•

.

.

• .

.

•

-

٠.

# THE SHEET SHEET

## III

# COMPASSO SFERICO

ESEGUITO DAL SACERDOTE

### GIAMPAOLO ANDERLINI DI BOLOGNA

COLLA DIREZIONE DEL CANONICO SALADINI,

Memoria trasmessa alla Reale Accademia nel 1782.

#### DESCRIZIONE.

### 6 I.

Il nostro compasso sserico ha la sigura della lettera I l'rovesciata, come vedesi nella Tavola III. Le aste verticali, e orizzontali rappresentano parallelepipedi lunghi, alquanto larghi, e poco alti; e sono cavi, e terminati da lastre d'ottone. L. L sono due laminette d'acciajo, a cui corrispondono le simili dalla parte opposta, terminano alla linea m n, e sono sermate ad un pezzo d'ottone, che vedremo, colle viti g, g, le quali abbracciano l'asta AA, nè possono concepire altro moto, che lungo l'asta. Tolte le viti g, g, e liberata l'asta dalle laminette L, L, levate similmente le sei viti a, e la vite c del fregio G dell'asta verticale, la lamina AAA si scioglie dal restante dello strumento, e permette che si veda l'interno, come nella Tavola IV. T è un pezzo d'ottone parallelepipedo fermato

alla lastra orizzontale posteriore con le viti che sermano la lastra AAA al rimanente dello strumento; B, B sono altri due pezzi similmente d'otrone infilzati, e sostenuti dalle viti H, h, ne' quali sono le madri viti; l'estremità h delle viti sono un tantino inserite nelle sponde z, z dell'asta verticale, per cui viene impedito il moto verso T, venendo anche impedito il moto verso H, per effere le viti in R alquanto più grosse dei fori, e questa grossezza si fuol dire spalla; per tanto altro moto non possono avere le viti, che il rotatorio. Volgendo adunque, mediante il. pomo H, le viti in un senso, portasi il pezzo B verso T. volgendolo in senso contrario, il pezzo B da T si discosta. Le viti I, I servono per stringere, e sermare li pezzi B, B alle coste dell'asta orizzontale. Nell'estremità inseriore dei pezzi B, B, sono inserite le punte d'acciajo O, O, mediante le punte r, r, che vengono strette dalle viti M, M: Le punte O, O si possono levare, e mettere a piacimento; e si veggono separate nella figura terza della quinta Tavola.

Rispetto all'asta verticale è da notare in primo luogo il telajo d'ottone N.N.N.N. armato di punta d'acciajo Q , il quale separato vedesi di prospetto nella figura terza della Tavola V.: per lo regolo superiore del medesimo telajo. in cui havvi la madre vite, passa una vite fina d'acciajo come di prospetto vedesi nella Tavola IV.; il telajo è incastrato tra il pezzo T, e le sponde z z dell'asta verticale, nè può in altra maniera moversi che in su, ed in giù; l'estremità y della vite poggia sopra il pezzo T. In x la vite ingrossa alquanto, o, come vogliam dire, sa spalla, acciocche maggiore del fore dell' inferimento non possa moversi in ssu; sopra x in P la vite si cangia in quadro, donde ritorna vite in b; voltandosi, la vite in un senso abbassa il telajo, e voltandosi in altro senso lo rialza. Ritarnando alla Tav. III. si noti il fregio G: che tiene unito il pezzo verticale della lastra AAA alle altre tre. dell'asta

41 TH

dell'asta coll'ajuto della vite c; d, d sono altre viti, che fermano il fregio colle sponde dell'asta; al fregio dalla parte superiore evvi attaccato un piastrino d'ettone rotondo ff: il fregio unitamente al piastrino si vede segregato dallo strumento nella Figura quarta della Tav. V : venendo alla Figura 1 della stessa Tavola, che mostra il profilo dello strumento, sopra il piastrino ff posa il piastrino più grande FF che di prospetto si vede nella Figura 2 della stessa Tavola; questo piastrino si vede diviso in parti 360, ed ha quattro viti per fermarlo all'altro plastrino ff; sopra il piaîtrino grande s' infila in P la sottile laminetta d'ottone circolare E. dipoi l'indice d'acciajo D di foro quadro, come vedesi nella Fig. 5, il che obbliga l'indice a seguire esattamente il moto rotatorio della vite; sopra l'indice giace altra laminetta circolare C, indi il pomo P è inserto nell'asta quadra P, e finalmente la testa b, mediante la vite b, stringe tutti li descritti pezzi insieme. Nella superficie dell'asta orizzontale dalla parte superiore nella Tav. III si vede notato il mezzo piede Bolognese 3 3. diviso in sei once esistenti tre da una parte, e tre dall'altra dal panto medio; queste once sono suddivise in mezze once; inferiormente si è notato ancora il mezzo piede Parigino 3.3 i milmente situato, e diviso; e rivolgendo lo strumento, si vedono dalla parte opposta segnate le sei once e del piede di Londia, e del palmo Romano. Si è detto che, voltando il pomo P della vite del telajo N, questo si abbassa; ora dopo replicati esperimenti, osservazioni, e cautele, si è screto che un'oncia Bolognete d'abbassamento richiede rivoluzioni complete dell'indice quarantanove, e parti trecentovenți delle 360 n tate nella periferia del piastrino F, F, che nominiamo parti minime; onde un'oncia Bolognese richiede parti minime 17960. Nella prima colonna della Tavola A, sono notate le once, e mezze once Bolognesi lino alle once tre; nella seconda colonna vi sono le rispettive rivoluzioni, e parti minime; nella terza tutto è ridotto a

parti minime; nella quarta vi sono li quadrati delle parti minime necessarii per l'uso dello strumento. Lo stesso vedesi nelle Tavole B,C,D, per le once del piede Parigino, del piede di Londra, e del palmo Romano.

### II. Uso della Strumento.

1. Serve il compasso sserico a ritrovare li raggi delle ssericità dei piatti da tornire le lenti otti he, e delle ssericità delle lenti stesse, delle quali non se ne sappia il valore. Questo punto è molto interessante appresso gli ottici, e le vie sin qui battute per giungere a determinare con tollerabile precisione li raggi sopraccennati, sono mal sicure, e intralciate, nè sempre praticabili. Non ci dissonderemo qui a giustificare le nostre asserzioni, poichè ne abbiamo le pruove maniseste nella Dissertazione del chiarissimo Abate Boscovik inserita nel Tomo V Parte II degli Atti dell' Accademia delle Scienze di Bologna.

2. Quando si voglia adoperare lo strumento prima d'ogni altra cosa girando le viti H, H si debbono spingere li pezzi interni B, B (T. IV) e in conseguenza (T. III) le punte O, O, e le lastre L, L, ai pezzi B connesse nel segno del piede, per esempio, Bolognese, che già si vede, a cagion d'esempio nel segno delle due once marcato colla cisra 2.; in questo luogo stringendo le viti I, I li pezzi B, B verranno sermati contro le coste dell'asta orizzontale si sattamente, che non sia possibile alle punte O, O moto

ben minimo in niun senso.

3. Fa d'uopo in oltre aver preparata una riga, che sia ben retta, ed in cui delineato sia il mezzo piede Bolognese diviso in once, e mezze once, come nella superficie dell'asta orizzontale (1). Tirato in su tutto il telajo N

<sup>(2)</sup> Questa riga vedess appiè delle Tavole A, B, C, D delle parti minime nella Tavola IV.

ST 43 TH

finchè il battente che è in N combaci perfettamente colla cotta inferiore della lamina AA orizzontale, le tre punte, O, O, O debbono essere in una persettissima linea retta: ma per assicurarsi meglio di ciò, converrà ricorrere alla riga. sopra cui facendo cadere le punte osserveremo, se veramente sono in persetta linea retta; esamineremo altresì colla stessa riga, se le punte O, Q, O sieno esattamente distanti once Bolognesi due, e caso che non lo fossero, si dia la debita correzione. Ciò fatto guarderemo, se l'indice D sia sopra il segno 360 del piastrino F, F, e facilmente vedremo che no, ma che un poco più avanzato, girando il pomo P si rorti l'indice D sul segno 360, il qual moto non ne produrrà alcuno nel telajo N, perchè le viti maschia, e femmina, comecchè sieno a contatto, tuttavia fra loro permettono qualche picciolissimo intervallo, perlochè succede, che la vite maschia giri un poco, senza che il telajo N si risenta di questo moto.

5. Rettificato con tal metodo lo strumento s'applichi ad un piatto concavo, di cui si desidera la sfericità per modo, che le punte O, O poggino sulla superficie concava, e mentre si gira il pomo B secondo l'ordine dei numeri 1, 2, 3, ec., e si abbassa il telajo, acciocchè la punta Q giunga alla superficie concava del piatto, si noti il numero delle rivoluzioni dell'indice, e le parti minime sopra cui l'indice si ferma; queste rivoluzioni, e queste parti minime daranno tutte le parti minime appartenenti allo spazio scorso dalla punta Q. Ognuno comprende, che l'intervallo fra le punte O, O sia la corda dell'arco corrispondente, e che lo spazio per cui si è abbassaro il telajo, ovvero la punta Q sia quella retta, che dicesi saetta dell'arco; sappiamo in oltre qual proporzione abbia la metà di essa corda alla saetta. che è appunto quella proporzione, che paila fra 35920 (numero che esprime le parti minime corrispondenti ad once due Bolognesi secondo la Tavola), e il numero, che esprime le parti minime appartenenti alla saerta ritrovato di

44 TW

sopra. Con questi due dati la Trigonometria insegna a trovare il raggio della concavità del piatto; imperocchè fappiamo effere la faetta di un arco alla metà della corda. come questa al rimanente del diametro; se dunque si prenda il quadrato di 35920 parti minime della metà della corda. che dalla Tavola A si sa essere 1290246400, se dividasi pel numero delle parti minime corrispondenti alla saetta, si avranno le parti minime corrispondenti al rimanente del diametro; a queste si aggiungano le parti minime della saetta, e si avranno le parti minime di tutto il diametro, che divise per due risulteranno le parti minime del raggio ricercato. Per avere il raggio di once Bolognesi si faccia come 17060 al numero delle parti minime del raggio ritrovate, così l'unità al quarto; cioè dividasi il numero delle parti minime del raggio per 17960, numero corrispondente ad un' oncia Bolognese, ed il quotiente darà l'once Bolognese contenute dal raggio.

6. Se poi vogliasi chiamare in ajuto il compasso sferico per ritrovare il raggio della convessità di qualche lente, o di qualche piztto, allora è necessario togliere dallo strumento le due punte O, O coll'assentare le viti M, M, e restituirne due altre assar più lunghe. Di poi si debbono applicare alla convessità dei piatti, o delle lenti le stesse punte, e dopo calato il telajo N, fino che giunga la punta Q alla convessità, si tolga lo strumento dal piatto, o dalla lente, avvertendo di notare quante rivoluzioni, e parti minime abbia scorso l'indice; in seguito si pongano le punte O, O sopra la costa di una riga rettissima di metallo, e si continui a calare il telajo, fino che la punta Q tocchi la riga, seguitando a contare le rivoluzioni e parti minime, si sottragga il numero delle rivoluzioni e parti minime qui sopra notato; l'avanzo sarà il numero delle parti minime appartenenti allo spazio, per cui scende il telajo, o la punta Q, dalla convessità alta riga, il quale spazio è appunto la saetta dell'arco compreso fra le punte 0, 0, di cui è corda la distanza di esse punte. Questa corda, o per meglio dire la sua metà, sarà data in parti minime coll'ajuto della Tavola: sapendosi pertanto le parti minime della corda, e della saetta, troveremo il raggio, come abbiamo satto di sopra per riguardo ai piatti concavi.

7. Lo strumento dee essere lavorato con somma finezza, e rettissicato nella maniera da noi indicata al SIV. Per assicurarsi meglio del valore del raggio si può replicare l'operazione, applicando lo strumento in varie parti del piatto, e variando ancora la distanza delle punte O, O.

8. Noi abbiamo fatto l'esperimento in piatti, di cui sapevasi il valore, e ne abbiamo avuti li risultati, che si rilevano dalla Tavola seguente, i quali differiscono dai veri raggi per quantità piccolissime, e disprezzabili nella pratica, oltrechè si può ragionevolmente sospettare, che li piatti cangiato avessero alquanto di valore, per esservi state lavorate le lenti.

Tavola degli esperimenti fatti con un'apertura di once 2 del piede Bolognese, a cui corrispondono parti minime 35920, che danno parti quadrate 1290246400.

Uno di piedi 50 ha dato rivoluzioni 0, e parti minime 60, dal che ricavasi il raggio di parti minime 1075208 eguale a piedi 49, once 10, linee 8;, che disferisce dal vero raggio di oncia 1, e linee 3;.

Uno di piedi 27, ha dato rivoluzioni o, parti minime 111, corrispondenti ad un raggio di parti minime 5811576, eguale a piedi 26, once 11, linee 7<sup>1</sup>, che differisce di

once o, linee 42.

Uno di piedi 13, ha dato rivoluzioni o, parti minime 231, corrispondenti ad un raggio di parti minime 2792856, eguale a piedi 12, once 11, e linee 6; che differisce di ince 6.

Uno di piedi 12, ha dato rivoluzioni o, parti minime 250, corrispondenti ad un raggio di parti minime 2580618, eguale a piedi 11, once 11, e linee 84 che differisce di linee 34.

Uno di piedi 6, ha dato rivoluzioni 1, e parti minime 140, che fanno parti minime 500, corrispondenti ad un raggio di parti minime 1090496, eguale a piedi 5, once 11, linee

10 ed - circa, che differisce di una linea e -.

Uno di piedi 4, e once 4, ha dato rivoluzioni 1, e parti minime 340, corrispondenti a parti minime 921954, eguale a piedi 4, once 3, e linee 4, che differisce di linee 8.

Uno di once 6, ha dato rivoluzioni 17, parti minime 160, corrispondenti a parti minime 6280, eguale ad once 5, linee 10-1; differisce di una linea e 1 circa.

# の地元を発生の主命の

## IV.

## SULLA STADERA UNIVERSALE

DISSERTAZIONE

#### DEL CANONICO SALADINI

Presentata alla Reale Accademia l'anno 1783.

#### I.

CHe cosa sia la stadera, quale l'uso di essa, e quali cautele debbansi avere si nel costruirla, che nell'adoprarla, se può facilmente vedere nei libri d'illustri Matematici, come farebbono il Desciales, s-Gravesand, Varignone, Desaguliers, ed altri non pochi. Buona parte di queste cose non sono incognite agli artefici di colte città, li quali comecchè non ajutati da teorica, sono istruttissimi dalla pratica. Ma le stadere sino a questo tempo conosciute sono di tal indole, . che soltanto servono a quelle libbre, per cui sono state satte: così la stadera satta per la libbra Napoletana, a cagion di esempio, riesce inutile affatto per la Bolognese, e per altre di qualunque specie sieno; nè mai ho saputo, che alcuno abbia usato la stessa stadera per le libbre di specie disserente, che hanno in cossume varie nazioni. Uno strumento di questa natura, e che sissò la mia attenzione, fu da me veduto solamente pochi mesi sa, ed era lavoro elegante del Sig. Lorenzo Micheli cittadino di Bologna, artefice industrioso e di nome per altri suoi meccanica ritrovamenti.

II. Conviene esporre la cosa più disfusamente, acciocchè fi possa comprendere con chiarezza la natura della Stadera Universale, l'uso a cui destinasi, e la dissicoltà di superarsi. Si fa la stadera volgare, detta romana, col prendere una verga Fig. 1. di ferro CBH dividendola in parti disugnali, e sospendendo'a in B a un sostegno BA, perchè altro moto aver non possa che il rotatorio circa B: le parti disuguali BH, BC distanti nella verga si dicono braccia, il sostegno trutina, e il punto centro di moto. Il braccio BH lungo e tenue suol farsi in forma di piramide quadrangolare, cioè co' piani un tantino convergenti verso l'estremità H. Dall'altro BC assai più corto e molto largo pende un uncino da attaccarvi li pesi, ovvero una scodella, ossa lance di metallo per mezzo di cordoncini o catenelle, sopra cui li pesi si collocano; e non è raro vedervi sì l'uno che l'altra. Il braccio CB cogli annessi si fa preponderare, si attacca poi al braccio lungo BH un peso M arbitrario (di tal grandezza per altro, che sostenti in equilibrio il braccio CB) messo in un punto D non molto discosto dal centro del moto B; il peso M nominasi equipondio, romano, marco, marchio. Volendo lo strumento per la libbra Napoletana, si mette essa sulla lance X e si porta il marchio M in quel punto del braccio BH, onde nasca equilibrio tra la libbra, e il marchio, come sarebbe in F; la distanza DF, che pur libbra si nomina, si divide in dodici porzioni eguali a DF egualmente divi'e per quanto permette la lunghezza del braccio. c'e si proporziona al numero delle libbre che si vogliono far levar dalla stadera. Non percorro minutamente le regole tutte e le avvertenze, che si debbono avere nel lavorare la stadera romana, che sono molte e necessarie, perchè è mio impegno soltanto diffondermi sulla Stadera Universale. Fabbricata la stadera per la libbra Napoletana, perchè tante libbre, ed once Napoletane sa un peso, che sia sulla lance X, quante sono le libbre ed once lineari comprese tra il punto D, ed il marchio M, mentre avvi equilibrio tra il marchio

marchio e il peso. Si voglia ora con questo istesso strumento ordinato per libbre napoletane rappresentare li pesi in libbre ed once bolognesi, o con altre a piacimento diverse dalle napoletane? Ciò appunto è quello, che si cercz, e che non può apportare alla società se non se comodi non dispregevoli, e intorno a ciò non so che altri prima del Sig.

Micheli abbia pensato o eseguito cosa alcuna.

III. Potrebbe cadere in mente, che sia facile cosa da conseguirsi ciocchè si cerca colla sola mutazione del marchio: ma a render palese quanto vada errato chi così la pensasse. si metta sopra la lance X la libbra bolognese in vece della napoletana, e dal punto F sospeso un nuovo marchio M diverso sicuramente dal napoletano, si faccia equilibrio colla libbra bolognese; sgravata la lance della libbra, e sospendendo il nuovo marchio in D, se la stadera così scarica sia equilibrata dal marchio bolognese in D, essa servirà senza fallo ancora per le libbre bolognesi; ma ciò è impossibile, perchè due pesi disserenti appiccati successivamente allo stesso punto D, non possono ridurre la stessissima stadera ad equilibrio, nella quale niente abbiamo cambiato, fuorchè il marchio; così insegnano le regole della statica. Se non si fusse adunque avuto ricorso ad altro artificio, presentemente ancora non saprebbesi con una stadera stabilmente divisa riferire li pesi dei corpi a quella specie di libbra che più piace, nè saprebbonsi paragonare le libbre di specie differente fra loro; ma o si dovrebbero aver pronte tante stadere diverse quante sono le libbre, o introdurre calcoli e supputazioni lunghe e fastidiose con incomodo del commercio. Sarà pertanto il prelodato Sig. Micheli benemerito della focietà, il quale, comecche nudo di teorie, pure al barlume dell'esperienza e della pratica, seguendo il metodo di tentare, è giunto finalmente a fabbricare uno strumento che piacquegli di chiamare Stadera Universale, con cui per mezzo di lievi e facili cangiamenti ci dà i pesi dei corpi in quella specie di libbra che vogliamo fra le principali e più utate in Europa.

IV. Sembrandomi quest' impresa degna di essere trattata scientificamente con ittabilire regole generali e corroborate da dimostrazioni, onde alleviare la pena all'artesice nella manifattura esatta di questa delicata macchina, non farà da maravigliare, che io abbia scelto un tale argomento per la differtazione, che nel presente anno sottopongo al gravissimo giudizio della nostra Reale Accademia. Oh di quanto la meccanica vien promossa, quando la scienza e l'esperienza scambievolmente si giovano! Prima di ogni altra cosa notar dobbiamo, che quantunque non sia possibile col solo cangiar del marchio, come vedemmo, ottenere la stadera universale, ciò non ostante se si cangi il marchio M, e se si faccia preponderare diversamente il punto C del braccio BC sopra il braccio BA, il quesito può ricevere la risoluzione che in vano senza questo secondo cangiamento si tenterebbe. E vaglia il vero, allora la stadera CBH già divisa in libbre ed once può servire a libbre di vario peso, quando s'abbia un marchio di tale condizione per la libbra che si vuole, il quale appeso in D nella stadera scarica la riduca all'equilibrio esistendo nella lance X la libbra che abbiamo presa per le mani: ciò si sa dalle regole di fare la stadera comune, e sarà da noi dimostrato in appresso. Supponghiamo che preponderi il punto C di un determinato peso, si troverà certamente un marchio, che soddisfarà alli due equilibrii in D, ed in F, posta per altro la libbra anch' essa di una determinata misura; ma se la libbra non sia tale, non evvi altro ripiego che far preponderare diversamente il punto C, perchè in tal caso varierà ancora il peso del marchio da collocarsi in D per l'equilibrio della stadera scarica; ed essendo infinite le variazioni da indursi nella gravità del punto C, d'altrettanto numero saranno quelle del marchio, perchè posto in D riduca all'equilibrio la stadera scarica; onde fra queste esser vi debbe quella che conviene alla libbra che ci siamo proposti, e che vogliamo sostentata dal marchio in F.

AT (1 1964)

V. L'Algebra, quella scienza prodigiosa, ne insegna a determinare con tutta precisione quanto debba preponderare il punto C per quella libbra che meglio piace, e di quanto peso debba essere il marchio che soddissaccia ad ambidue gli equilibrii, cioè in D per la stadera scarica, ed in F per la stadera sopraccaricata in X dalla libbra. A questo sine propongo il teorema meccanico che segue.

### TEOREMA.

Sia il vette CH di braccia disuguali CB, BH; B sia T. VII il centro del moto, ossia di rotazione; nel braccio lungo Fig. 2. BH venga notata a piacimento la porzione BD; da C penda un peso X arbitrario sossentato dal marchio in D: si sopraccarichi di poi il punto C d'altro peso qualunque, ed il marchio trasportato nel punto conveniente G tenga equilibrati ambidue li pesi, cioè X, e l'altro che chiamo P: tolto P da C, e sostituito un'altro P' sieno X e P' sostenuti dallo stesso marchio M in F, io dico che come P sta a P', così sarà DG: DF.

Dimostrazione. Si nomini CB=a, BD=d, DG=d', DF=d'. Poichè X+P per supposizione sa equilibrio col marchio M posto in G, sarà per la legge fondamentale del vette Xa+Pa=Md+Md'; ma si suppone ancora che il solo X pendente da C saccia equilibrio con M in D; dunque per la stessa legge sarà Xa=Md. Sottraggasi questa equazione dall' equazione precedente, e nascerà la terza equazione Pa=Md'; collo stesso metodo dimostrasi P'a=Md'. Adunque potremo formare la seguente proporzionalità appunto, che accinti ci siamo a dimostrare.

Corollario. Posto pertanto X in C equilibrato dal marchio in D, se successivamente si cangi il peso P, il quale si faccia equilibrare dal marchio stesso situato a varie distanze dal punto D, queste distanze seguiranno sempre la proporzione dei pesi.

#### PROBLEMA.

VI. Nel vette CH di braccia disuguali CB, BH, e precisamente nel braccio più lungo BH notati sieno a piacimento due punti D, F: si vogliono due pesi X, M, il primo dei quali attaccato in C, l'altro in D facciano equilibrio tra loro; e che in oltre sopraggiavando il punto C di un peso P determinato, e trasportando da D in F il peso M, s'abbia similmente equilibrio tra X+P ed M.

Risoluzione. Mettasi come sopra CB = a, BD = d. Avremo subito per condizione del primo equilibrio tra X ed M, a tenore delle leggi di statica,  $\lambda a = Md$ . A cagion poi del secondo equilibrio tra X+P ed M, per la stessa ragione sarà Pa+Xa=Md+Md. Dunque sottraendo da questa equazione la prima, ne verrà Pa=Md. Esse do in conseguenza  $M=\frac{Pd}{d}$  ossia d:a::P:M, ed essendo determinate le tre quantità d',a,P, sarà determinato altresì il peso ossia il marchio M. Questo valore sostituiscasi nella prima equazione Xa=Md, ed avremo  $X=\frac{Pd}{d}$  cioè d:d::P:X:, e perchè sono determinate le quantità d',d,P, avremo ancora determinato l'altro peso ricercato X.

VII. Corollario. Posto il vette come sopra, se in C e in D si attacchino due corpi pesanti  $X = \frac{Pd}{d}$ ,  $M = \frac{Pa}{d}$ , rappresentando P qualunque peso, e se in oltre venga sopraccaricato successivamente il punto C di varii altri pesi a volontà, li quali si facciano sostenere in equilibrio dallo stesso marchio M trovato  $= \frac{Pa}{d}$  sospeso dal braccio B H nelle rispettive e convenienti distanze dal punto D, varieranno li pesi in C soprannominati, come variano appunto le distanze predette del marchio dal punto D, come si deduce

chiaramente dal già dimostrato teorema col suo corollario. Avrassi ancora l'altra prerogativa, cioè che sopraccaricato il punto C dal peso P, come dicemmo, arbitrario, al quale per altro da principio ci sissammo, e collocato il maschio M in F, si ottenga equilibrio.

Da ciò si comprende come si possano ottimamente riserire li pesi dei corpi al determinato peso P; perchè attaccati essi in C, e sostenuti dal marchio nelle rispettive distanze dal punto D del braccio BA, staranno queste distanze alla DF come li pesi rispettivi al peso determinato P. Sia a cagion d'esempio P una libbra di Napoli, e si chiami d = 1, d = 8, a = 2; eseguite le debite sostituzioni sarà  $X = \frac{Pd}{d} = \frac{P}{8}$ ,  $M = \frac{Pa}{d'} = \frac{P}{4}$ . Adunque se si attacchi in C un ottavo della libbra napolitana, e se si sopraccarichi C della libbra stessa, questa farà equilibrio col marchio del peso di un quarto di essa libbra situato in F, e se rimossa la libbra si sostituisca in C qualunque altro peso sostentato dal prenotato marchio nel punto G, starà questo novello peso alla libbra napoletana, come la distanza DG alla DF.

VIII. Dalle cose che sin qui abbiamo stabilite e dimostrate, ci si apre la strada di far servire con facilità una stadera già divisa nelle sue libbre ed once a quella specie di libbra che più torni conto. Soltanto a titolo di maggior chia ezza suppongo costantemente, che la BD entri due volte in CB, ed otto volte in DF persettamente. La proporzione di queste parti è di sua natura affatto arbitraria; ma le circostanze e l'uso, a cui la stadera destinasi, debbono indurre l'artesice alla scelta piuttosto di una che dell'altra, come vedremo. Presa la DF di tal grandezza, che in essa con facilità, e senza consusione si distinguano le parti duodecime, che chiamammo once, e le parti sedicesime di queste, di F verso H si notino tante porzioni eguali a DF, quante permette la lunghezza del braccio BH, la quale si dee determinare secondo l'uso, che si vuol fare

della stadera, e queste parti, che saranno altrettante libbre. come lo è la DF, si dividano nelle sue once, e nelle parti decimeseste d'oncia. Ciò preparato si ha da applicare lo strumento alla libbra napoletana. Si attacchi in C un peso eguale a  $\frac{Pd}{d}$ , che è appunto un ottavo della libbra di Napoli; questo peso dovendosi aggiungere alla stadera. acciocche possa adattarsi alla libbra che si sceglie, si può con qualche proprietà chiamare in appresso Giunta; si adoperi in oltre un marchio eguale a  $\frac{Pa}{d}$ , cioè a un quarto d'essa libbra, ed otterremo l'intento. Imperciocchè qualunque peso che sopraccarichi il punto C, e che sia sostentato dal marchio. uguaglierà tante libbre, tante once, e decimesesse parti di oncia di Napoli, quante libbre appunto, quante once, e fedicesime d'oncia lineari si contengono nella distanza del marchio dal punto D. Tutte quelle cose si raccolgono chiaramente dal corollario del problema da noi ilioluto. Per tanto se avremo apparecchiati e le giunte e li marchi per molte specie di libbre, potremo sul momento colla stessa stadora ridurre gli stessi pesi alla libbra di quella specie a piacimento.

IX. Finora si è supposto, che il vette sposliato sia di gravità, ovvero che abbia le braccia equilibrate, che torna lo stesso; ma se esso tale non sia, come si sa comunemente, allora avvi di bisogno di maggiore artissicio. Supponghiamo in primo luogo, che il braccio BC preponderi sopra il braccio BH, e nominiamo g quel peso, che situato in H renda la stadera equilibrata, chiamata BH=b si faccia BH. a CB, come la giunta X= $\frac{Pd}{d}$  alla quarta; cioè b:a così  $\frac{Pd}{d}$   $\frac{Pad}{bd}$ , questa dicasi =r, e sottraendola da g si ponga g-r=q, il peso q così determinato sarà la giunta da applicarsi alla stadera per poterla adattare a quella specie di libbra

55 TH

che vogliamo. Tre casi si debbono qui distinguere, o abbiamo q=o, ovvero q>o cioè positiva, ovvero q<o cioè negativa. Io dico che nel primo caso niente debbo aggiungere alla stadera; che nel secondo caso debbo aggiungere q all'estremità H; e che nel terzo si debba aggiungere C al peso  $=\frac{bq}{a}$ . Dimostro queste verità ad una ad una.

X. Fatto q=0, come richiede il primo caso, avremo g-r=0, è perciò g=r; ma si suppone g essere quel peso, il quale attaccato in H renda la stadera equilibrata; dunque ancora r farà lo stesso; cioè la nostra stadera è di tal condizione che appeso r in H rendonsi le braccia equilibrate. Ma per le leggi di Statica r in H sostenta in C un peso eguale ad  $\frac{rh}{a}$ ; dunque nella stadera prepondera il punto C di un peso eguale ad  $\frac{rb}{a}$ ; ma abbiamo r eguale a  $\frac{Pad}{ba}$ , come costa dal paragraso precedente; onde il punto C prepondera di un peso eguale a  $\frac{Pd}{d}$ . Essendo per tanto nel punto C quello sbilanciamento, che è necessario, acciocchè la stadera non grave, ovvero equilibrata possa esserio di uso. Dunque nel caso, che q sia eguale a zero abbiamo nella stadera quelle condizioni, per cui essa può adattarsi alla libbra P; e perciò niuna giunta vi si dovrà fare.

XI. Suppongasi ora q maggior del zero, ossia quantità positiva. Perchè abbiamo q=g-r, ovvero g=q+r la nostra stadera in questa i potesi si è di tal condizione, che appiccato in H un peso eguale al peso q+r messo in H sostenta un peso in C eguale al peso  $\frac{qb}{a} + \frac{rb}{s}$ ; dunque la stadera ha il punto C preponderante del peso  $\frac{qb}{a}$ , cioè del peso  $\frac{Pd}{s}$  come sopra.

XII. Finalmente sia q minor del zero, ovvero quantità negativa. Collo stesso raziocinio del paragrafo antecedente si prova doversi situare in H il peso q, e perchè questo è negativo, si dovrà situare in senso contrario del positivo, cioè si dovrà alleggerire il punto H di un tal peso; il che per le leggi di statica si riduce ad aggravare il punto C del peso bq come si è asserito. Ma piace di soggiungere ancora la seguente dimostrazione. Essendo g quantità negativa avremo g=r-q. Dunque r-q in H renderà la nostra stadera equilibrata; e perciò prepondererà il punto C del peso  $\frac{br}{a} - \frac{bq}{a}$ , e sopraccaricato questo istesso punto C del peso  $\frac{bq}{a}$ , sbilancerà esso punto del peso  $\frac{br}{a} = \frac{Pd}{a}$  come si richiede, perchè la stadera possa adattarsi alla libbra P. Se in vece di supporre preponderante il braccio BC, si finga tale il braccio BH, allora si dee appiccare in C il peso opportuno all'equilibrio delle braccia, ed oltracciò si debbe aggravare esso punto del peso eguale a rd, e la stadera sarà in acconcio per la libbra P.

XIII. Dalle cose sopra esposte si comprende apertamente che tutto l'artissicio per adattare una data stadera ad una data specie di libbra si riduca a rendere in primo luogo le due parti o braccia della stadera equilibrate, e a sopraccaricare in secondo luogo il punto C del peso  $\frac{Pd}{d}$ . Alla pratica per altro giova costruire la stadera in maniera, che preponderi il punto C, anzi, denotando P la libbra massima fra quelle a cui la stadera vuolsi applicare, si dee far sì, che lo sbilancio di C superi il peso  $\frac{Pd}{d}$ : questa avvertenza è necessaria perchè la giunta q non altrove si debba appiccare che nel punto H; perciocchè q in tal caso sarà sempre maggiore

57 mg

maggior del zero, ossa quantità positiva; conciossachè la quantità g che renderebbe la stadera equisibrata, se sosse in H, dovrà essere maggiore del peso  $\frac{Pd}{d}$  ( di cui più si suppone sbilanciare il punto C) moltiplicato per la frazione  $\frac{a}{b}$ , come assi dalla statica; dunque g sarà maggiore di r,

che è eguale al peso  $\frac{Pda}{db}$ , come vedesi nel paragraso nono. Laonde  $g_{-}r$ , ossia q, sempre sarà quantità positiva, e si dovrà perciò attaccare al punto H, dal che ne derivano parecchi comodi, come si farà manisesto in appresso.

XIV. Volendo nella stadera le parti decimeseste dell'oncia assai sensibili e distinte, la distanza DF, che dee rappresentare la libbra, convien che sia molto grande, perchè se la stadera dee notare più d'una libbra, il braccio BH verrebbe lungo suor di misura, ed impossibile assatto a maneggiarsi, oltracciò dovendo esser sottile, acciocchè il troppo peso non accresca la fregagione dell'asse, che toglie la sensibilità alla stadera,

facilmente incurvandosi vizierebbe lo strumento.

XV. Ecco un metodo ingegnoso, col qua

XV. Ecco un metodo ingegnoso, col quale si scanza l'incomodo quì sopra rilevato. Si saccia il braccio BH di tal lunghezza da poter distinguere la DH assai sensibilmente in once dodici, e nelle parti sedicesime dell'oncia: si destini la DH ad indicare la libbra; e rispettivamente ai punti D,H si determini sì il marchio che la giunta g per quella libbra che a senno sarà scelta, e situata la giunta in H, e il marchio in D si renda la stadera equilibrata; di poi si carichi il punto C della libbra P, la quale si faccia sossenti il punto C della libbra P, la quale si faccia sossenti il punto C della libbra P, la squale si faccia sossenti il punto C della libbra P, la squale si faccia sossenti il punto C della libbra P, la squale si faccia sossenti il punto C della libbra P, la squale si faccia sossenti il punto C della libbra P, la squale si faccia sossenti il punto C della libbra P, la squale si faccia sossenti dell'altre; egli è certo, che due libbre in C saranno sossenti dell'altre; onde in H eguale a  $\frac{2Pa}{b}$ , tre da  $\frac{3Pa}{b}$ , e così dell'altre; onde

con quindici pezzi eguali a  $\frac{Pa}{h}$  fi possono pesare libbre quindici. Se oltre le libbre vi fossero le once, e le parti decimeseste, le libbre verranno equilibrate dai pesi in H: l'once poi, e le parti decimeseste si equilibreranno dal marchio situato nella corrispondente divisione della libbra. Ma neppure quindici pezzi sono necessarii all'uopo, bastando soltanto questi quattro  $\frac{aP}{b}$ ,  $\frac{2aP}{b}$ ,  $\frac{8aP}{b}$ , perciocche questi variamente combinati possono equilibrare in H da una libbra in su fino alle quindici. Così a cagion d'esempio, se un peso appiccato in C richiegga in H per essere sostentato i tre pesi  $\frac{aP}{b}$ ,  $\frac{2aP}{b}$ ,  $\frac{4aP}{b}$ , e di più il marchio sulle once otto, e cinque sedicesimi, saremo sicuri, che quel peso sia precisamente libbre sette, once otto, e cinque sedicesimi d'oncia, di quella libbra, a cui ci siam determinati. Non oltrepassiamo le libbre sedici, da che l'esperienza c'insegna, che in un numero maggiore con tutto che la stadera lavorata sia con ogni finezza, cautela, ed avvertenza conforme l'arte, pure le parti decimeseste dell'oncia poco risaltano. 2 cagion che il fregamento dell'asse, pe'l soverchio peso, e l'incurvamento delle braccia portano dissessi, che hanno Proporzione sensibile colla parte decimasesta dell'oncia.

XVI. Un artificio a quetto similissimo si può adoperare eziandio nella fabbrica delle stadere, avvegnacchè non si abbia in mira di renderle universali: e certamente non si dee riputare di picciolo vantaggio avere uno strumento, che vi levi sedici libbre, alle quali faccia ragione delle parti sedicesime di un'oncia. Quì in Bologna si sono fatti lavorare alcuni di questi stromenti, che servono insieme per Itadera romana e per bilancia; e in Napoli ancora una se n'è costrutta per la Maestà del Re Nostro Signore dal prelodato Sig. Micheli; ma per non dilungarmi in cosa per

le stessa patentissima, ritorno alla stadera universale.

XVII. Trattandosi di dover sabbricare una stadera universale, sa d'uopo, che il peso  $\frac{Pa}{h}$  da collocarsi in H per equilibrare la libbra P in C includa la condizione, che P disegni la libbra più picciola fra quelle, alle quali vuolsi applicare la stadera; un tal peso dicasi = s. Sia ora una libbra più grande di P, che nomino P, e sia la stadera guernita della sua giunta in H, e del suo marchio in D conveniente a P', onde lo stromento sia equilibrato. Ciò posto cerchiamo di poter pesare fino a quindici libbre P' usando li quattro pezzi s, 2s, 4s, 8s. Ognuno che sia iniziato nella statica, vede, che non potremo mai conseguire quello che vogliamo senza allungare il braccio BH d'una porzione HL. Determinasi questa porzione col supporre equilibrio fra P' in C, ed s in L; dal che nasce l'equazione

aP'=sb+sHL, onde  $HL=\frac{aP'-sb}{s}=\frac{aP'}{s}-b$ : questa  $HL_{Fig. 3}$ .

senza fallo sarebbe la porzione voluta, se spogliata fosse totalmente di gravità, cosa impossibile; dunque altro artificio vi bisogna per liberarci da questo novello incomodo. Rivolgo l'attenzione alla giunta q da metterfi in H per ciascuna specie di libbra, ed osservo potersi ottimamente fare, che il peso della porzione HL raccolto nel suo centro di gravità abbia lo stesso momento, che la giunta q situata in H, onde la porzione HL può nello stesso tempo soddisfare a due fini; colla lunghezza può fare, che il pezzo s in L fi equilibri con P in C, e colla sua gravità può far le veci della giunta q in H.

XVIII. Se la grossezza della porzione HL sia sempre la stessa, o come si suol dire, sia sempre costante, a cagion d'esempio, se sosse di figura cilindrica, parallelepipeda, prismatica ec., allora con picciol giro di calcolo scopriremo il pefo da darfi all'HL; ma se c'impegnassimo in altre figure variabili, e irregolari, cosa che sarebbe inutile, saremmo spetso forzati a chiamare in ajuto l'algebra più recondita e sublime, e converrebbe, che c' innoltrassimo in calcoli intralciati e prolissi. Supponendo adunque la grossezza di HL costante, si ponga  $\frac{P'a}{=}c$ ; sarà HL=c-b, e la sua metà HO= $\frac{HL}{2}=\frac{c-b}{2}$ ; onde BO= $\frac{b+c}{2}$ . Il peso, che si ricerca da dare ad HL si chiami =x, il quale potendosi supporre raccolto in O, sarà il suo momento  $\frac{b+c}{2}$ . x; ma questo momento dee essere eguale al momento  $\frac{b+c}{2}$ . x; ma questo momento dee essere eguale al momento  $\frac{b+c}{2}$ . x= $\frac{c+c}{b+c}$ .

XIX. Dalla formola  $x = \frac{2qb}{b+c}$  si ricavano alcune avvertenze opportune alla pratica. In primo luogo io dico, che quanto più cresce P', tanto più decresce il numeratore 29b; imperocchè abbiamo  $q = g - r = g - \frac{P'ad}{hd'}$  pel paragrafo nono; dunque essendo tutte l'altre quantità fuorchè P' costanti, crescendo P', crescerà  $\frac{P'ad}{a}$ , e si diminuirà  $g = \frac{P'ad}{b}$ , cioè q, e per conseguenza si sminuirà ancora 296. Il denominatore poi b+c crescerà, perchè nel paragraso precedente s'è posto == ra; onde essendo a ed s quantità costanti, al crescere del P' crescerà c, e per ciò crescerà ancora  $\delta + c$ . Dunque al crescere di P' si sminuisce in una porzione più grande la frazione  $\frac{2qb}{b+c}$ , e perciò il peso x della porzione HL. All'opposto la lunghezza di HL eguale alla quantità c-b cresce, crescendo P'. Per la qual cosa la porzione HL per le libbre, che molto si scostassero dalla libbra minima, che abbiamo chiamato P, potrebbe riuscire di tal sottigliezza da

piegarsi e frangersi con non molta dissicoltà. Egli è vero, che si potrebbe aggravare il punto C in maniera da farlo preponderare di un peso, che di molto sorpassasse il peso  $\frac{P'd}{d'}$ , denotando P' la libbra massima: allora sicuramente il peso da darsi alla porzione HL nel caso ancora della libbra massima, potrebbe essere bastantemente grande, perchè la HL non riesca troppo sottile; ma dall'altra parte l'asse della stadera sostrendo peso grande, grande sarebbe ancora la fregagione, a cui toggiacerebbe: oltrechè per la libbra minima, e per quelle alla minima prossime, la grossezza di HL sarebbe eccessiva e sconcia; tanto più, che in tal caso la sua lunghezza sarebbe minima, come il suo valore il dimostra: perchè essendo  $c = \frac{Pa}{s}$ , ed  $s = \frac{aP}{b}$ , sarà  $c = \frac{bP'}{P}$ , e posto P' eguale alla libbra minima, cioè P'=P, avremo c=b; onde HL=c-b=b-b=o. Raccolgasi pertanto da ciò, che per l'esattezza e persezione della stadera universale debba l'artefice stare dentro certi limiti, nè debba applicare lo strumento a specie di libbra, che mosto differiscano sra loro.

XX. Veggiamo se dalla proporzione delle parti BC = a, BD = d, DH = d', BH = b si possa ricavare un qualche vantaggio, acciocchè il peso x della porzione HL non riesca suor di modo picciolo nelle libbre più pesanti. Nel paragrafo nono abbiamo veduto essere  $q = g - r = g - \frac{P'da}{d'b}$ , e nel paragrafo decimottavo abbiamo  $c = \frac{P'a}{s} = \frac{bP'}{P}$ ; si chiami in oltre G quel peso pel quale il punto C della stadera prependera, ende sia  $g = \frac{Ga}{b}$ : satte le debite sossitiuzioni nel valore di  $x = \frac{2qb}{b+c}$  ne risulta  $x = 2P \cdot \frac{Gad' - Pad'}{d'b}$ , e supposto P' = P sarà  $x = \frac{Ga}{b} \cdot \frac{Pad}{db}$ . Se nella espressione

di » qui ritrovata si diminuisca la quantità b, crescerà sicuramente x, ma bisogna avvertire, che lo sminuimento di 6 non è in nostro arbitrio; perciocche BH dee essere tale da permettere, che le parti sedicesime di oncia sieno sensibili e distinte: oltrecchè converrebbe sminuire di molto b, perchè cresca notabilmente x; ed al contrario crescendo la quantità a crescerà ancora x come desideriamo, anzi l'ingrandimento di a offia della distanza BC renderà più sensibile il momento delle parti minime della sibbra; ma effendo il marchio eguale a  $\frac{Pa}{d^i}$ , e il contrapeso s= $\frac{Pa}{b}$ , se di troppo si aumenti a, questi pesi verrebbero troppo grandi; dunque in riguardo ancora alla quantità a offia alla distanza BC non si possono oltrepassare certi confini. Il partito migliore si è d'impicciolire quanto più si può la quantità d, ossia la BD coll'approssimare al possibile il punto D al centro del moto B; in questo caso rimanendo  $\frac{Ga}{h}$  la stessa quantità, si verrà a diminuire la quantità Pad di molto; onde la  $\frac{Ga}{b} = \frac{Pad}{db}$  risulterà assai più grande. Questa avvertenza unitamente a quella accennata nel paragrafo superiore ci farà schivare l'incomodo di avere le giunte estremamente lottili.

XXI. Sapendosi dall'artesice la giunta q da collocarsi in H, e la lunghezza HL (le quali cose si possono determinare mediante il calcolo con somma precisione) con replicati tentativi, dando ancora alla HL quella sigura, che più gli aggrada, e che reputi più elegante, diminuendo a poco a poco il peso q convenientemente, del quale sul principio sarà la HL, giugnerà senza gran dissicoltà a colpire nel peso, che dee avere la HL, assinchè equivalga alla giunta q in H.

XXII. Determinato il marchio M, e la giunta HL. per riguardo ad una specie di libbra, che chiamo P, si potrà determinare speditamente il marchio M', e la giunta HL per altra qualunque specie di libbra, che nomino P'. E la ragione è, che essendo generalmente il marchio  $=\frac{Pa}{d}$ , denotando P qualunque libbra, sarà M: M':: Pa : P'a :: P: P', cioè abbiamo li marchi come libbre. Nella stessa maniera si dimostra, che li pesi da noi chiamati r eguali a Pad come si disse nel paragrafo nono, sieno come le libbre; onde ancora questi si potranno speditamente determinare. Ed essendo il peso g sempre lo stesso, il qual peso si scopre subito nel principio della costruzione della stadera col rendere equilibrate le braccia BC, BH; quindi da g sottratto r si ha immediatamente il q. Questo peso q, come sopra abbiam detto, serve di guida all'artefice per proporzionare alla lunghezza, ed alla figura che vuole indurre in HL il peso che si cerca, e che di poco dee essere minore di q: perciocchè il centro di gravità di HL è distante dal centro del moto B poco più del punto H, poichè si suppone, che le libbre non molto differiscano; anzi quelta differenza di distanze, cioè del punto H dal centro del moto B, e di questo dal centro di gravità di HL, darà anche essa norma all'artefice per incontrare il giusto peso di HL: posciachè questo star debbe al peso q, come la distanza di H da B alla distanza del sovraccennato centro di gravità dallo fleffo B.

Il Sig. Micheli senza la luce della teoria, con pazienza per altro sicuramente ammirabile, ma non del pari imitabile, è giunto sinalmente a determinare con tutta esattezza li marchi e le giunte per molte libbre delle più samose di Europa: ma a dire il vero, se sosse stato fornito di cognizioni scientische, e avesse avute quelle avvertenze che ho esposte

G4 76.

in questa mia Memoria, incomparabilmente più presto sarebbe pervenuto dove tendevano i suoi ssorzi, ed avrebbe schivati molti incomodi e vizii, che lo imbarazzavano, e dai quali non ha potuto liberare totalmente il suo lavoro. Ciò per altro non iscema la gloria dell'ingegnoso artesice, che in cosa sì inviluppata col solo lume naturale ha saputo penetrare tant'oltre.

争光谱影响

# の世紀の世紀本の世紀の世紀

 $\mathbf{V}_{\bullet}$ 

LAVERA MISURA

### DELLE VOLTE A SPIRA

DISSERTAZIONE

DEL SOCIO D. NICCOLO FERGOLA

Letta nel 1783.

A superficie di una volta a spira, tuttoche sia a duplice curvatura e da ciò paja trascendere ogni geometrica investigazione, credesi non pertanto da molti Architetti, che senza la guida del calcolo integrale possa quadrarsi agevolmente: pareggiando quest'aja un rettangolo, che ha per altezza la sua generatrice, e per base quella linea spiralocilindrica, che al punto medio di questa retta corrisponde. Or un tal teorema che lor sembra assai chiaro, ed elegante, e donde trarsi sicuramente la misura di siffatte volte, chi 'l crederebbe? egli non è che falso: imperciocchè, analizzati que' principj, da cui si dimostra, si trovan essi precarie supposizioni a verità di geometria direttamente opposte. Ed in vero essi suppongono che la superficie di una volta a spira possa considerarsi qual aggregato d'innumerabili trapezi infinitesimi, ciascuno dei quali fia commesso al suo contiguo sotto un angolo ottusissimo, e si comprendan poi tutti fra il giro di quella spira che va rasente il di lei suso, e di quell'altra che nel cilindro vuoto

circoscrittole si arresta. Suppongono di vantaggio che suffatti trapezi abbian tutti per altezza la retta generatrice: ed in fine che di ciascun di essi sien paralleli fra loro due lati opposti, cioè i due elementi di quelle spire che in una stessa orizzontale si corrispondono. Ma chi concesse che questi trapezi, la di cui superficie è pur anche a doppia curvatura, sieno della medesima indole degli Euclidei, onde le passioni di questi si possano a quelli convenevolmente adattare? Di più gli elementi delle linee spiralocilindriche, che si corrispondono su di una stessa orizzontale, non son fra se paralleli, come si vedrà chiaramente nel corollario 5 della I proposizione: e poi ancorchè loro si accordino tali supposizioni, pur ne verrebbe cosa strana, e fuor di ogni ragione, che in un trapezio rettilineo vi si trovino insieme quattro angoli retti. Per tali difetti non meno della teoria, che della pratica misura delle volte a spira, m'ingiunse questa R. Accad., che di un tal problema rio tentassi la soluzione co' lumi del calcolo integrale. Onde recandomi ciò ad onore, ho quadrata cogli ajuti della geometria e del calcolo non men la superficie della volta retta spiralocilindrica, che quella dell'obliqua: e ne ho pur anche ottenute le loro cubature, servendomi di uno stesso principio, e generalizzando in fine codeste soluzioni, qualunque ne sia la linea generatrice.

## Definizioni.

I. Se la retta AN giacendo perpendicolarmente sull'altra Fig. 1. AQ volgasi intorno al punto A con movimento circolare, ed equabile, e nello stesso mentre con moto a se parallelo uniformemente ne salga per AQ, si verrà a descrivere con sissatti moti una superficie a doppia curvatura, che comunemente suol dirsi Volta a Spira, e da ciascun punto di lei si genererà una linea ben anche a doppia curvatura, che dicesi Linea spiralocilindrica.

II. La retta AN dicesi Generatrice, ed AQ Asse della

volta a spira.

III. Se la retta generatrice infista perpendicolare sull'asse della volta a spira, come si è supposto nella desin. I, la volta si dirà Retta; e se non le giaccia perpendicolare, si addimanderà Scalena.

IV. Il cerchio descritto dalla retta AN che si aggira

intorno ad A, dicesi Base della volta.

V. Se il rettangolo AanN si aggiri coi due moti divisati T.VIII nella defin. I, descriverà un solido formato ben anche Fig. 4. a spira: é di questo rettangolo generatore dirassi AN late erizzontale, ed Nn verticale.

## PROP. I. PROBL. I.

Determinare la superficie di una Volta spirale retta.

Disegni la retta AQ l'aise della mentovata volta, e l'altra AN ne sia la retta generatrice. Prendasi nella T.VIII medesima AN la parte Bb infinitesima, e s'intendano pei Fig. 1. punti Be b passare le linee spiralocilindriche BRSQ, brsq. Egli è chiaro, che le velocità onde sollevansi col movimento verticale i due punti B, b, come tutti gli altri della medesima retta, sieno tra se uguali: e che la velocità, con cui circolarmente aggirafi il punto B, debba pareggiar quell'altra, onde volgesi in girò il prossimo punto b intorno ad A. Imperocchè effendo tali velocità nella ragione dei raggi AB, Ab, e questi tra se uguali, perchè differenti tra loro della porzione infinitesima Bb, saranno quelle anco tra se uguali. Per la qual cosa se prendansi gli archetti circolari BO, bo, che nel primo momento dai punti B e b col solo moto rotatorio si descriverebbero, essi saranno tra se uguali: e confondendosi questi colle loro tangenti (1), sissatte tangenti saranno eziandio eguali non men che parallele tra loro.

I 2

<sup>(1)</sup> Newt. Princ. Mathem. Lem. VII.

circofor' animato a muoversi non che per BC verticalmente primo tempuscolo separatamente e giverebbe) è d'uopo che con ambi questi pria media BR, ch'è il primo elemento primo ciemento B. Similmente defignando in che separate de la primo ciemento de la primo ciem projetti, in che separatamente e con uniformità punto b coi due anzidetti moti (quali rette ebbe mostrato son rispettivamente uguali e parallele BO, BC), compiuto il parallelogrammo oc, alle prime la sua direzione media. alle prime la fua direzione media. Ed essendo, come ognun posto all'altro co a l'altro co a l'al ognun posto all'altro oc, e i lati di quello ai lati di questo paralleli, le loro diagonali BR, br saranno ben anche que uguali e parallele: e quindi, congiunta Rr, la figura BRro ne sarà un parallelogrammo. Ma essendo la retta generatrice AN perpendicolare non meno a BO, che a BC, farà perpendicolare al piano OBCR, e quindi alla diagonale BR, che in esso ritrovass. E' dunque la figura BRrb un rettangolo, e l'armilla spiralocilindrica BRQqsrb si potrà considerar senza errore come un composto d'infiniti rettangoletti, che non giacciono nello stello piano, ma che ciascuno al suo contiguo s'inclini fotto un angolo ottufissimo, e che gli altri di loro lati eziandio comprendano angoli infinitamente ottusi.

Ciò posto perchè il primo elemento BR della linea spiralocilindrica descritta dal punto B sta al contemporaneo elemento BC in una costante ragione, cioè del moto medio per BR al moto verticale per BC; sarà ben anche nella stessa ragione l'intera linea spiralocilindrica BRSQ alla parte QA dell'asse che al punto Q'corrisponde. E perciò se la velocità, onde verticalmente sale il punto B, ovvero ogni altro della retta AN si chiami q, e p quell'altra, con cui l'estremo N della retta generatrice circolarmente intorno ad A si volge, e sia di più AN=a, AB=a, AQ=b; sarà

la velocità onde intorno ad A il punto B si volge  $=\frac{p_M}{a}$ , il moto medio del medesimo punto  $B=\sqrt{\left(q^2+\frac{p^2M^2}{a^2}\right)}$ , e finalmente la linea spiralocilindrica BRSQ  $=\frac{b}{q}\sqrt{\left(q^2+\frac{p^2M^2}{a^2}\right)}$ . Or essendo Bb=da, e l'anello spiralocilindrico BRSQ qsrb uguale alla linea BRSQ moltiplicata per Bb, sarà esso anello  $=\frac{bdx}{q}\sqrt{\left(q^2+\frac{p^2x^2}{a^2}\right)}$ . E perciò l'intera superficie della spira chiusa da BRSQ  $farà = \int \frac{pbdx}{aq}\sqrt{\left(\frac{a^2q^2}{p^2}+x^2\right)}$ .

Cor. I. L'indeterminata quadratura della volta a spira, come di per se comprendes, dipende dalla quadratura della iperbole Apolloniana, o dalla rettificazione della parabola conica quali cose scambievolmente dipendono l'una dall'altra. Ma per gli usi architettonici, e per la comun pratica conviene richiamarla a logaritmi iperbolici, lo che sarassi nel seguente modo.

Pongali 
$$uz = \sqrt{\left(\frac{a^2q^3}{p^3} + x^2\right)}$$
  
fart  $x^2z^2 - x^2 = \frac{a^2q^3}{p^2}$ ,  $x = \frac{aq}{p\sqrt{(z^3 - 1)}}$ ,  $du = -\frac{aqzdz}{p(z^2 - 1)^{\frac{3}{2}}}$ ,  $e \int \frac{pbdx}{aq} \sqrt{\left(\frac{a^2q^3}{p^3} + \kappa^2\right)} = -\frac{abq}{2p} \int \frac{2z^2dz}{(z^2 - 1)^2}$ .

Or adoperando gli ovvj metodi d'integrazione, rilevasi

$$-\frac{aqb}{2p}\int_{\left(\frac{z^2-1}{2}\right)^2} \frac{2z^2dz}{p(z^2-1)} + \frac{aqb}{p}\log\left(\frac{z+1}{z-1}\right)$$

70 Th

Dunque restituendosi il valore di z, avrassi

$$\int \frac{pbdn}{aq} \sqrt{\left(\frac{a^{3}q^{3}}{p^{3}} + x^{3}\right)} = \frac{\frac{a}{2}bx}{p} \sqrt{\left(q^{3} + \frac{p^{3}x^{3}}{a^{3}}\right)} + \frac{\frac{a}{2}aqh}{p} \log \left(\frac{\sqrt{\left(\frac{a^{3}q^{3}}{p^{3}} + x^{3}\right) + x}}{\sqrt{\left(\frac{a^{3}q^{3}}{p^{3}} + x^{3}\right) - x}}\right)$$

E moltiplicando tanto il numeratore, che il denominatore della parte logaritmica per lo stesso numeratore, avrassi

$$\int \frac{pbdx}{aq} \sqrt{\left(\frac{a^{3}q^{2}}{p^{3}} + x^{2}\right)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{bx}{q}} \sqrt{\left(q^{3} + \frac{p^{3}x^{3}}{a^{3}}\right)} + \frac{\frac{2}{3}}{\frac{aqb}{p}} \log \left[1 + \frac{2p^{3}x^{3}}{a^{3}q^{3}} + \frac{2px}{aq^{3}} \sqrt{\left(q^{3} + \frac{p^{3}x^{3}}{a^{3}}\right)}\right] B$$

Cor. 2. L'integrale esibito nella formola B espone, come di per se comprendesi, l'indeterminata quadratura della volta a spira, cioè di quella che vien generata dalla parte AB della retta AN, allorchè la generatrice siane salita al punto Q. Che se vogliasi la quadratura della spira descritta dall'intera generatrice AN, converrà nella sormola B surrogare a in luogo di x: ond'essa cangerassi in quest'altra

$$\frac{2}{3} \frac{ab}{q} \sqrt{(q+p')} + \frac{2}{4} \frac{aqb}{p} \log \left[ 1 + \frac{2p'}{q'} + \frac{2p}{q'} \sqrt{(q'+p')} \right]$$
 C

Cor. 3. E volendosi determinare la superficie di quella spira, la di cui altezza pareggi l'intervallo di due prossimi giri della linea spiralocilindrica descritta dal punto N; converrà nella sormola C scrivere q in luogo di b. E quindi si trasmuterà la precedente sormola in quest'altra semplicissima

$$\frac{1}{2} a \sqrt{(q^2 + p^2) + \frac{1}{4} \frac{aq^2}{p} \log \left[ 1 + \frac{2p^4}{q^2} + \frac{2p}{q^2} \sqrt{(q^2 + p^2)} \right]} D$$

Cor. 4. Rappresenti finalmente il cilindro di AQ il T.VIII fuso di una volta a chiocciola, e l'altro di AP quello in Fig. 3. cui essa contengati: sia AT raggio del suso  $= \infty$ , e la sua periferia  $= \pi$ ; sarà quella parte della riferita volta, che dentro del suto di AQ si comprenderebbe (form. C) uguale

ad 
$$\frac{1}{3}\frac{\alpha b}{q}$$
  $\sqrt{(q^3+\pi^2)}$   $+\frac{\pi}{4}\frac{\alpha qb}{\pi}$  log.  $\left[1+\frac{2\pi^2}{q^3}+\frac{2\pi}{q^2}\sqrt{(q^3+\pi^4)}\right]$ .

E perciò la volta ch'è rinchiusa tra la superficie concava del cilindro di AP, e tra la convessa del suso di AQ, sarà

$$\left[ -\frac{1}{2} \frac{ab}{q} \sqrt{(q^2+p^2)} + \frac{1}{4} \frac{aqb}{p} \log \left[ 1 + \frac{2p}{q^2} (p + \sqrt{(q^2+p^2)}) \right] \right]$$

$$\left[ -\frac{1}{2} \frac{ab}{q} \sqrt{(q^2+\pi^2)} - \frac{1}{4} \frac{aqb}{\pi} \log \left[ 1 + \frac{2\pi}{q^2} (\pi + \sqrt{(q^2+\pi^2)}) \right] \right]$$

Cor. 5. Sieno NL, NP i due spazietti, che nel primo T.VIII. momento si percorrerebbero dal punto estremo N col moto verticale, e coll' orizzontale, e sia NF la direzione media del medesimo punto N, che, come si è mostrato, è il primo elemento della linea spiralocilindrica descritta dal punto N. Si unisca AL e da un punto qualunque B si menino BS, BC rispettivamente parallele ed uguali ad NL, NP, e si compiano i parallelogrammi BO, BT; sarà BT parallela ad NF. Ed essendo BR spazietto orizzontale descritto nello stesso tempo di NL, sarà (per la prop. pres.) BO il primo elemento della spira descritta dal punto B. Ma si è dimostrata BT ad NF parallela: dunque BO a quella inclinata non sarà parallela ad NF; nè quindi son tra se paralleli quegli elementi delle spire che si corrispondono in una stessa orizzontale, come comunemente si suppone.

Cor. 6. Finalmente niuna retta può adattarfi fulla superficie spiraloeilindrica, che non combaci colla generatrice.

Avv. 1. Ma prima di foggiungere la quadratura della spira scalena, vuolsi avvertire che la Cost. da aggiungersi all'integrale B nel nostro caso è o: dovendo essere Cost.

Log. 1=0. E quindi l'Integrale B sarà determinato.

Avv. 2. A fin di ragguagliare i risultati di queste Fig. 1. formole con que' della pratica comune ho voluto misurare una volta, di cui la generatrice fusse di palmi 10, e l'intervallo di due prossime spire di palmi c2 (quali dimensioni convengono presso a poco a quella volta a chiocciola che dal Palazzo Reale di Napoli mette giù alla Darsena) ed ho trovato cotesta superficie esser di 346 palmi quad. nell'altezza di palmi 12: laddove secondo la pratica comune si valuterebbe di palmi qu. 336. E' dunque 10 palmi qu. tal differenza, ed essa volta di 120 palmi di altezza misurata nella comune maniera mancherebbe dalla vera dimensione per palmi 100: ciocchè a' Fabri arrecherebbe non lieve discapito.

Avv. 3. La quadratura della nostra volta si avrebbe potuto col feguente metodo anche agevolmente ottenere. Si prenda un anello spiralocilindrico descritto dall' elemento Bb, la cui altezza adegui quella parte dell'intero lato della volta, ch'è tra due prossimi giri: sarà la di lui superficie a quella dell'anello circolare generato da Bb nella ragione degli archi, onde son tali anelli terminati, cioè di  $(q^2 + \frac{p^2x^2}{a^2})$  a  $\frac{px}{a}$ : essendo la generatrice Bb la stessa, e ai mentovati archi perpendicolare, come si è qui su mostrato. Laonde essendo  $\frac{px}{dx}$  la superficie dell'anello circolare, sarà  $dx \vee (q^3 + \frac{p^3x^3}{a^3})$  quella dell'armilla spiralocilindrica. E quindi farà  $\frac{bdx}{4}$   $\sqrt{\left(q^2 + \frac{p^2x^2}{4^2}\right)}$  la superficie di quell'armilla la cui altezza è b, come sopra si è avvisato.

PROP.

#### PROP. II. PROBL. II.

Determinare la superficie di una Volta Spirale Scalena.

Rappresenti la retta AQ l'asse della volta, ed AN ad T.VIII esso inclinata la retta generatrice. Si prenda in AN una Fig. 2. qualunque parte AB, e da questa se ne tronchi la porzione infinitesima Bb, pe' di cui estremi passino le linee spiralocilindriche BRQ, brq: sarà l'armilla spiralocilindrica BRQqrb un aggregato d'infiniti parallelogrammetti l'uno inclinato al suo contiguo sotto un angolo grandemente ottuso. Lo che dimostrerassi come sopra.

Ma l'angolo ABR qui non è retto, nè di un'altra grandezza costante; onde sa d'uopo rinvenirne il suo seno, perchè si possa determinare la superficie della mentovata armilla. A tal effetto sia BO l'archetto circolare infinitesimo. che nel primo momento si descrive dal punto B aggirato con moto conico intorno ad A, e BC l'elemento della verticale CBY contemporaneamente descritto col moto verticale, che il primo BO. Si meni dal punto A la retta AS perpendicolare su di CB protratta verso Y, e da B nel piano ABC si alzi BL perpendicolare alla medesima BC: saranno BL, AS tra se parallele. Ma di queste la prima è perpendicolare al piano OBC: dunque l'altra AS farà ben anche perpendicolare al piano steso per BO, e BC (cioè prolungata RB verso G) al piano steso per BS, e BG. Si cali di vantaggio SG perpendicolare su di BG, e si unisca AG. Il quadrato di AB è uguale alla somma dei quadrati di AS, e di SB: ma il quadrato di SB pareggia la fomma dei quadrati di SG; e di BG., e l'altro di AS adegua la differenza dei quadrati di AG, e di GS (essendos dimostrata AS perpendicolare al piano BSG): dunque il quadrato di AB sarà uguale alla somma dei quadrati di AG e di GB: e con ciò l'angolo AGB farà retto.

Pongafi come fopra AB = x, AN = a, la velocità onde verticalmente fale il punto N, ed ogni altro della retta generatrice =q, e quella con cui aggirafi con moto conico il punto N fi dica p: farà la velocità onde ne gira collo stesso moto conico il punto  $B = \frac{px}{a}$ , e la di lui velocità media  $= \sqrt{\left(q^2 + \frac{p^2x^2}{a^2}\right)}$ . Si chiami di vantaggio NF m, ed AF n, farà  $BS = \frac{mx}{a}$ , ed  $AS = \frac{nx}{a}$ . E dovendo effere BS:BG::BR:BC,

farà 
$$\frac{mx}{a} : BG :: \sqrt{\left(q^2 + \frac{p^2 x^2}{a^2}\right)} : q$$

E quindr BG = 
$$\frac{qmx}{\sqrt{(q^2s^2+p^2x^2)}}$$

fard in oltre AG' = AB'-BG'= $x^a - \frac{q^2m^2x^2}{q^2s^2+p^2x^2}$ 

Ed AG = 
$$\sqrt{\frac{q^{2}a^{2}x^{2}+p^{2}x^{4}-q^{2}m^{2}x^{2}}{q^{2}a^{2}+p^{2}x^{2}}}$$
 =  $x\sqrt{\frac{q^{2}n^{2}+p^{2}x^{2}}{q^{2}a^{2}+p^{2}x^{2}}}$ 

Ma sta AB:AG::Rag::Sen. ABG. Dunque posto Ragg.=1,

farà Sen. ABG = 
$$\sqrt{\left(\frac{q^2n^2+p^2x^2}{q^2a^2+p^2x^2}\right)}$$

Pongasi intanto come sopra Bb = dx, QL = b, e la linea spiralocilindrica descritta dal punto  $B = \frac{b}{q} \sqrt{(q^2 + \frac{p^2 x^2}{a^2})}$ : farà

l'anello spiralocilindrico BRSQqprb

$$=\frac{bdx}{aq}\sqrt{\left(a^{2}q^{2}+p^{2}x^{2}\right)\left(\frac{q^{2}n^{2}+p^{2}n^{2}}{a^{2}q^{2}+p^{2}x^{2}}\right)}=\frac{pbdx}{aq}\sqrt{\left(\frac{q^{2}n^{2}}{p^{2}}+x^{2}\right)}$$

E quindi l'indeterminata quadratura della superficie spiralocilindrica descritta dalla parte AB della generatrice sarà

$$\int \frac{pbdx}{aq} \sqrt{(\frac{q^{2}n^{2}}{p^{2}} + x^{2})} = \frac{nbx}{2aq} \sqrt{(\frac{p^{2}x^{2}}{n^{2}} + q^{2})}$$

$$+ \frac{1}{4} \frac{bn^{2}q}{pa} \log \left[ 1 + \frac{2p^{2}x^{2}}{q^{2}n^{2}} + \frac{2px}{q^{2}n} \sqrt{(q^{2} + \frac{p^{2}x^{2}}{n^{2}})} \right] F.$$

E nella formola P surrogando a in luogo dell'indeterminata x. si avrà la superficie della spira descritta dall'intera retta

generatrice AN=
$$\frac{nb}{2q}\sqrt{(\frac{p^2a^3}{n^2}+q^2)}$$

$$+\frac{1}{6}\frac{bn^{2}q}{ap}\log\left[1+\frac{2a^{2}p^{2}}{q^{2}n^{2}}+\frac{2ap}{q^{2}n}V(q^{2}+\frac{p^{2}a^{2}}{n^{2}})\right]$$
 G.

Cor. 1. Fatto l'angolo retto NCQ, prendasi CN quarta T.VIII proporzionale in ordine a p, q, ed n, e col centro C, ed il Fig. 5. semiasse primario CN si descriva l'iperbole equilatera NMP: di poi collo stesso parametro di lei, col vertice N, e coll'asse la retta NC prodotta in giù si descriva la parabola conica NRB: sarà la superficie spiralocilindrica descritta dalla retta CO a quella, che ne descrive il di lei segmento CT, come l'aja iperbolica COPN all'altra CTMN, o come l'arco parabolico NB all'altro NR.

Cor. 2. E quindi se data la superficie spiralocilindrica descritta da CO, se ne voglia ritrovare un'altra ugualmente alta, che le stia in una data ragione, ridurrassi il problema a ritrovare un arco parabolico, che stia al dato NB in quella data ragione. Qual problema è stato egregiamente risoluto dall'illustre Geometra Giovanni Bernulli negli Atti di Lipsia

pag. 261 giugno 1698, e da altri sommi Analisti.

Cor. 3. Per aversi l'anello spiralocilindrico generato dalla T.VIII retticciuola Bb, si dovrà moltiplicare la linea spiralocilindrica Fig. 2. del punto B per essa retticciuola Bb, e per AG, e divider

poi per AB un tal prodotto.

Avv. Il rimettere alla rettificazione delle curve algebraiche l'integrale di qualche formola, cui ne manca l'affoluta integrazione, è nella pratica utilissimo ripiego: poichè al convesso di tali curve implicandosi un filo slessibile, la sua lunghezza n' espone quell'integrale. Ed un tal artisizio sarà molto più conducente, qualora la mentovata curva con moto organico possa agevolmente descriversi. Dunque potendosi con moto organico descrivere la parabola conica, dalla cui rettificazione dipende la quadratura non meno della volta spiralocilindrica retta, che dell'obliqua, si potrà eziandio con vantaggio adoperare in pratica cotesto metodo.

#### PROP. III. PROBL. III.

Determinare la solidità di una Volta retta Spiralocilindrica:

Prendasi ovunque nel lato orizzontale del rettangolo T.VIII generatore la parte Bb infinitesima, e sia BRQqrb l'armilla spiralocilindrica chiusa dalle spire descritte da' punti B, b. Sia di più CB un'altra parte infinitesima del lato verticale del medesimo rettangolo, e Cc una retta uguale, e parallela a Bb, di cui l'armilla spiralocilindrica sia CckmMK.

Si erga dal punto B la retta BD perpendicolare a BR, che giaccia nel piano CBO; ed essendo essa eziandio perpendicolare a Bb (conciosiache si è dimostrato, princ. prop. I, essere Bb perpendicolare al piano CBO) sarà la medesima retta BD perpendicolare al piano steso per BR, Bb, cioè a quello dell'armilla spiralocilindrica BRQqrb: e perciò una tale retta indicherà la distanza, che sissatta armilla serba dall'altra CckMK. Or condotta dal punto P estremo del lato verticale dello stesso rettangolo una retta perpendicolare all'armilla BRQqrb, essa starà al lato verticale PB, come DB a BC, cioè come sta al raggio il seno dell'angolo BCD, o CBR, che la spira forma col lato verticale del rettangolo generatore. E chiamandosi fil lato verticale, sarà

 $V(q^2 + \frac{p^2 x^2}{a^2}) : \frac{px}{a} :: f:$  Perp. E quindi sarà una tal perp. =

av (q²+\frac{p^2x^2}{a^2}). Ciò posto, perchè l'anello solido, che si genera dal rettangoletto bP rivolto coi due moti quassù divisati, può senza tema di errore considerarsi come composto d'infiniti parallelepipedi che hanno per base gl'infiniti rettangoletti BRrb e per altezza quella perpendicolare di magnitudine costante, che dal punto P si mena sul piano BRQqrb: si avrà la di lui solidità dal prodotto dell'armilla BRQqrb nell'anzidetta perpendicolare. E quindi sarà tal anello

$$= \frac{bdx}{q} \bigvee (q^{2} + \frac{p^{2}x^{2}}{a^{2}}) \times \frac{fpx}{a\sqrt{(q^{2} + \frac{p^{2}x^{2}}{a^{2}})}} = \frac{bfpxdx}{aq}, e'1 \text{ folido}$$

spiralocilindrico descritto dal rettangolo AP sarà  $=\frac{bfpx^2}{2aq}$  M.

Cor. Se nell'espressione M si ponga in luogo della variabile x la grandezza determinata a, che dinota l'intero lato orizzontale del rettangolo generatore, si avrà il solido spiralocilindrico, che da questo vien generato, uguale a

 $\frac{b}{q} \times \frac{fpa}{2}$ . Ma  $\frac{fpa}{2}$  dinota la solidità del cilindro, che dal medesimo rettangolo si genererebbe rivolgendosi intorno al suo lato verticale. Sarà dunque

1. , La solidità della volta spiralocilindrica retta a quella , del cilindro retto che seco abbia la stessa base, e per , altezza il lato verticale del rettangolo generatore, come , b a q, cioè come l'intera altezza della volta a quella di , lei parte, che n'è compresa tra due prossime spire.

2. " Sarà quindi uguale al mentovato cilindro una parte

" di essa volta, che abbiane cotessa altezza.

3. " E nella medesima ragione sarà la solidità di una " volta retta spiralocilindrica compresa tralla superficie del " suso, e quella del cilindro vuoto, ov' ella si contiene, " all'anello cilindrico descritto da quella parte del rettangolo " generatore ch'è chiusa tralle medesime superficie ".

### PROP. IV. PROBL. IV.

#### Determinare la solidità di una Volta Spiralocilindrica Scalena.

T.VIII
Fig. 11 parallelogrammo generatore, e BP il verticale. Si prenda, come nel probl. sup., di AB la parte infinitesima Bb, di cui l'armilla spiralocilindrica sia BRQgrb. Si meni AS perpendicolare su di BS, ed SG su di GBR, sarà (congiunta la retta AG) l'angolo BGA retto, come si è dimostrato prop. II. E quindi abbassata SX perpendicolare su di AG, sarà essa perpendicolare al piano ABR (9 Elem. XI), e la sua ragione alla retta BS si troverà col seguente artissio.

Effendo l'angolo ASG retto farà (8 elem. VI) AG: AS:: SG: SX

Cioè ritenendo i medesimi simboli del probl. II

$$x \checkmark \left(\frac{q^3n^3+p^3x^3}{q^3a^3+p^3x^3}\right) : \frac{nx}{a} :: \frac{mpx^3}{a^4 \checkmark \left(q^3+\frac{p^3x^3}{a^3}\right)} : SX$$

Ed SX = 
$$\frac{mnpx^a}{a^2\sqrt{(q^2a^2+p^2x^2)}} \times \sqrt{(\frac{q^2a^2+p^2x^2}{q^2n^2+p^2x^2})} = \frac{mnpx^a}{a^2\sqrt{(q^2n^2+p^2x^2)}}$$

E' poi SB ad SX come l'intero lato verticale del parallelogrammo generatore a quella perpendicolare, che dal punto P si cala sul piano dell'armilla BRQ qrb. Sarà dun que detto f questo lato verticale.

$$\frac{mx}{a} * \frac{mnpx^3}{a^2 \sqrt{(q^2n^2+p^2x^2)}} :: f: \text{ Perp.}$$

E farà tal perpend.  $=\frac{fnpx}{aV(q^2n^2+p^2x^2)}$ 

E finalmente l'anello solido generato dal parallelogrammo PBb, che coi due riferiti moti si aggira, sarà

$$\frac{fnpx}{\sqrt{(q^2n^2+p^2n^2)}} \times \frac{bdx}{aq} \sqrt{(q^2n^2+p^2x^2)} = \frac{bfnpxdx}{a^2q}.$$

E l'indeterminata cubatura del folido spiralocilindrico sarà espressa dalla formola  $\frac{pbfnx^*}{2a^2q}$  N.

Cor. La solidità della volta spiralocilindrica scalena, la di cui altezza sia quella parte del lato del cilindro, che è tra due prossime spire, sta alla solidità di quel cilindro, che seco abbia la stessa base, cioè (sig. 2) il circolo di LB, e per altezza il lato verticale del parallelogrammo generatore, come ne sta al raggio il seno dell'angolo che due di essi lati comprendono fra loro.

Il Signor Grippa dotto Professore di matematica in Salerno e degno nostro collega avendo sullo stesso argomento più cose meditate e prodotte, ha sinteticamente dimostrato un bellissimo teorema riguardo alla cubatura della volta retta, che si è stimato riserire nella storia de' tentativi matematici del 1783; non solo perchè agl' inventori diasi quella lode, che lor si conviene, ma per mostrare il consenso del risultato di questi calcoli, e di ciò ch'egli ne dimostra con sintesi nitida ed elegante.

#### PROP. V. TEOR.

Muovasi la figura mistilinea NCB co'moti esposti nella des.

V., e sia QB un' ordinata all'asse NQ; sarà tal solido
spiralocilindrico al solido generato dalla figura NCB col
solo moto rotatorio intorno ad NQ, come l'intera di lui
altezza a quella parte di questa che framezza due prossimi
giri della spirale del punto B.

S' intenda la tangente verticale NC divisa in parti infinitesime uguali fra loro, come PR, RT, CT ec.: e pei punti delle divisioni condotte Pp, Rr, Tt, ec. parallele all'asse.

Ciò posto l'anello spiralocilindrico generato dal rettangoletto PprR sta all'anello cilindrico, che il medesimo descriverebbe aggirandosi intorno ad NQ col solo moto di rotazione, com'è l'intera altezza di quel solido a quella parte della medesima che resta tra due prossimi giri della spirale di B. Ma in questa medesima ragione è qualunque altro anello solido spiralocilindrico generato da qualunque altro rettangoletto al suo corrispondente anello cilindrico: sarà dunque nella medesima ragione l'intero solido spiralocilindrico al solido generato dalla figura NCB rivolta intorno ad NQ.

Cor. Sia la curva NpB una parabola Apolloniana, di cui NQ sia l'asse, sarà il solido generato dallo spazio esterno NCB rivoluto circolarmente intorno all'asse sudduplo del cilindro generato da NQBC aggiratosi intorno ad NQ. E quindi sarà il solido spiralocilindrico che coi due anzidetti moti si descrive dalla figura NQB a detto cilindro come la metà dell'altezza di esso solido a quella parte di lei ch'è

tra due prossimi giri.

### PROP. VI. PROB.

Poste le medesime cose della prop. prec. ritrovare la superficie spiralocilindrica descritta dalla curva NBF.

Si prenda nell'asse di tal curva una qualunque ascissa T.VIII NQ, la cui corrispondente ordinata sia QB, e BA la Fig. 8. tangente menata per esso punto B, che incontri i asse in A. Sia di vantaggio Bb un archetto infinitesimo, e BR il primo elemento della linea spiralocilindrica descritta dal punto B, che si protragga indefinitamente verso G. Si tiri per lo punto B la retta BS parallela all'asse, e su di lei si meni dal punto A la perpendicolare AS: ed in sine calata da S la retta SG perpendicolare a BG, si unisca AG: sarà AG perpendicolare a BG, si oche mostrerassi come sopra probl. 2.

Ciò posto sia p la velocità con cui volgesi in giro il punto F intorno a D, e q quell'altra, onde la figura DNF lungo il di lei asse verticalmente ne sale. Sia di più DF =a, NQ=x, QB=y, NB=s: sarà  $\frac{py}{a}$  la velocità, con che volgesi B circolarmente intorno a Q, il di lui moto medio,  $V\left(q^{2}+\frac{p^{2}y^{2}}{a^{2}}\right)$ , e la spira descritta dal punto  $B=\frac{b}{q}V\left(q^{2}+\frac{p^{2}y^{2}}{a^{2}}\right)$  (detta b l'intera altezza di tal superficie). Di più se pongas la sottangente AQ=X, sarà la tangente AB= $V\left(X^{2}+y^{2}\right)$ . E poichè pe' triangoli simili BRC, BGS sta

BR: BC:: BS: BG, cioè  $\sqrt{(q^2 + \frac{p^2 y^2}{a^2})}$ : q:: X: BG,

farà BG =  $\frac{qX}{\sqrt{(q^2 + \frac{p^2 y^2}{a^2})}}$ 

Ed AG = 
$$\sqrt{(AB'-BG')} = y\sqrt{(\frac{a^2q^2+p^2y^2}{2})}$$

Ma per lo cor. 3 prop. 2 sta BA ad AG come il prodotto dell'archetto Bb nella spira del punto B alla superficie dell'armilla spiralocilindrica descritta dal medesimo archetto Bb. Sarà dunque

$$\sqrt{(X^{2}+y^{2})}:y\sqrt{(\frac{a^{2}q^{2}+p^{2}X^{2}+p^{2}y^{2}}{a^{2}q^{2}+p^{2}y^{2}})}::\frac{bds}{aq}\sqrt{(a^{2}q^{2}+p^{2}y^{2})}:arm. di Bb$$

E quindi l'armilla di  $Bb = \frac{byds}{aq} \sqrt{(\frac{a^3q^3}{X^2+y^3} + p^3)}$ 

Ed integrando sarà la superficie spiralocilindrica descritta da BN

$$= \int \frac{byds}{aq} \sqrt{\left(\frac{a^2q^3}{X^2+y^3} + p^3\right)} \quad R.$$

## Esemp. I.

Siz la curva NBF una parabola conica, e'i parametro del fuo asse ND sia c, sarà y=cx,  $X'=4x^2$ ,  $yds=dx\sqrt{(cx+\frac{1}{2}c^2)}$ , e la formola R si trasmuterà in quest' altra

$$\int \frac{bpdx\sqrt{c}}{2aq} \sqrt{\left(\frac{p^2+4x^2+cx}{x^2}\right)}$$
: di cui l'integrazione dipende

dalla rettificazione delle curve coniche.

## Escimp. 11.

T.VIII Sia la generatrice NF un circolo, e l'asse NQ della Fig. 8. volta sia un suo diametro. Sia di più il raggio ND=r, una qualunque ascissa dal centro DQ=x, sarà BQ=V(r'-x'),

e l'archetto  $Bb=ds=\frac{-rdx}{\sqrt{(r^1-x^2)}}$ . Ed essendo, per la natura del circolo DQ:DN::QB:BA, ovvero DQ::DN<sup>2</sup>::QB<sup>2</sup>; AB<sup>2</sup>, farà  $x^2:r^2::r^2-x^2:AB^2=(\frac{r^2-x^2}{x^2})r^2$ . Ciò posto nella formola  $\int \frac{byds}{aq} \sqrt{(\frac{a^2q^2}{X^2+y^2}+p^2)}$  si surroghino in luogo di y, e di ds i valori di già ritroyati, ed in luogo del quadrato di AB, cioè di  $X^2+y^2$ , quest' altro  $(\frac{r^2-x^2}{x^2})r^2$ : farà yds=-rdx, ed  $\frac{a^2q^2}{X^2+y^2}=\frac{a^2q^2x^2}{r^2(r^2-x^2)}$ .

E quindi la formola superiore  $\int \frac{byds}{aq} \times V(\frac{a^2q^2}{X^2+y^2}+p^2)$  cangerassi nella seguente  $-\int \frac{brdx}{aq} V(\frac{a^2q^2x^2}{r^2(r^2-x^2)}+p^2) = -\int \frac{brdx}{aq}$ 

$$\frac{\sqrt{(\frac{a^{2}q^{2}x^{2}}{r^{2}}+p^{3}r^{2}-p^{2}x^{3})}}{\sqrt{(r^{2}-x^{2})}} = -\int \frac{bdx}{q} \sqrt{(\frac{q^{2}x^{2}+p^{3}r^{2}-p^{2}x^{6}}{r^{2}-x^{3}})}, \text{ effends}$$

in questo caso r=a. E perchè, come d'ordinario addiviene, è p>q, e quindi  $q^2-p^2$  una grandezza negativa  $=-m^2$ ; perciò sostituendosi tal valore nell'ultima formola, essa muterassi nella seguente

$$-\int \frac{bdx}{q} \sqrt{\left(\frac{p^2r^2-m^2N^2}{r^2-x^2}\right)} = -\int \frac{brdx}{q} \sqrt{\left(\frac{p^2-\frac{m^2}{r^2}x^2}{r^2-x^2}\right)}.$$

L'integrazione di questa formola dipende dalla rettificazione dell'ellisse conica, come chiaramente si conosce.

Ed

AG = V(AB'-BG') = y

Ma per lo cor. 3 prop. 2 sta BA ad bodell' archetto Bb nella spira del pur dell' armilla spiralocilindrica descritta la Bb. Sarà dunque

 $\checkmark(X^{3}+y^{3}):y\checkmark(\frac{a^{3}q^{3}+p^{3}X^{3}+p^{3}y^{3}}{a^{3}q^{3}+p^{3}y^{3}})$ 

E quindi l'armilla di Bb

Ed integrando sarà la da BN

Sia la curvi fuo affe?

e la fe

r i

mi lla da

Na.

ella

eff2

# SUNDER LESSEN

## VI

## DEL SALIRE DEI CORPI IN ARIA

PER LA LORO SPECIFICA LEGGEREZZA

#### LEZIONE DEL CANONICO SALADINI

comunicata alla R. A. l'anno 1784.

TEll'indagare le leggi meccaniche, con cui la natura movendo ed agitando il grande ammasso de' corpi, dà vita e vaghezza all' universo che l' uomo misero e passegiere abitatore di questo globo terraqueo a sua consolazione e vantaggio pur conoscer vorrebbe, siamo costretti ad ogni passo di arrestare il piede. Quegli spiriti generosi e sublimi, che hanno avuto il coraggio di tentare si dissicili vie, fanno amplissima testimonianza di questa infelice condizione umana. Ma qual è egli l'inciampo il più frequente e che maggiormente scoraggisce? Coloro soltanto, che mai posti non si sono al cimento, il possono ignorare. L'algebra, lo stato fanciullo in cui ritrovasi ciascuna delle sue parti più nobili, e specialmente il non sapersi, se non se pochissimo circa il modo di passare dalle differenze alle somme, è una delle principali cagioni, per cui non lice a noi il penetrare negli arcani più reconditi della natura. Testimone ne sia la famosa teoria lunare del grande Eulero, dove se quasi nulla per parte della

meccanica, quasi tutto per parte dell'algebra ancor si desidera. Ottimo consiglio sarà pertanto quello di coloro, che non si arrendono alle prime difficoltà, e che entrando in alcuno spinoso campo algebraico non abbandonano l'impresa

senza progredire per quanto possono.

Fra molte investigazioni, alle quali hanno dato occasione i Signori di Montgolfier, nome a di nostri celebratissimo, hayvi ancora il ricercare le proprietà del moto di un corpo spinto a salire per l'aria dalla di lei gravità. Matematici di grido hanno creduta questa ricerca non indegna di loro. Vi meditava, e ne discorreva con Lexell il soprallodato Eulero poco prima del fatal momento, in cui venne colpito da mortale accidente. Il Sig. Meusnier in una dottissima lettera al Signor Foujas di San-Fond vi si è distinto: ma tutti hanno incontrato nell'algebra il frequente spiacevole intoppo. Nulladimeno ho voluto ancor io esperimentare in ciò la mia qualunque industria. E questo si è il motivo per cui ricorro al vostro esteso sapere e al vostro acuto discernimento, Accademici sapientissimi, acciocchè vi degniate d'illuminarmi circa l'esito di mie fatiche; sicuro che se non potrete commendare le cose che sono per esporvi, la vostra discretezza avrà almeno alcun riguardo al desiderio che ho avuto di essere utile. E per entrare subito in materia intraprendo a risolvere i problemi che seguono,

#### PROBLEMA I.

Un corpo specificamente più leggiere dell'aria vicino la superficie della terra abbandonato a se stesso salga per questo liquido: si cerca la legge tra la forza acceleratrice, è l'altezza.

## Risoluzione.

I. La forza acceleratrice della gravità, in vigore di cui si sà, che un corpo vicino la superficie della terra percorre in un secondo quindici piedi parigini e un pollice (1), si prenda per unità. La massa del corpo, che si suppone rotondo, si dica m, e per m si disegni ancora il suo peso. giacche li pesi sono proporzionali alle masse; il peso d'un volume di aria eguale al volume del corpo in quella altezza in cui esso ritrovasi sia = z; di questo peso si suppone minore il peso m, sarà pertanto l'eccesso del peso di esso volume di aria sopra il peso del corpo = z-m. Se il corpo nel falire non incontrasse alcuna considerabile resistenza, z-m sarebbe la forza che lo eleverebbe. Ma è noto, che l'aria, oltre le resissenze-cagionate dalla tenacità e dalla fregagione, le quali senza pericolo di grave errore si possono trascurare, oppone altra gagliardissima resistenza, che ha sua origine dall'elasticità e dall'inerzia. Se una superficie Piana fi mova per l'aria con direzione perpendicolare a se stessa, e con velocità, che non sia estremamente grande, nè estremamente picciola, la resistenza che essa incontra, fi fa eguale al peso d'un cilindro, ossa colonna aerea, la

<sup>(1)</sup> Tale si ritrova la gravità a Parigi. In diverse latitudini essa varia, onde gli spazii percorsi in un secondo si rinvengono disserenti; ma queste variazioni sono troppo picciole, e da non tenerne conto in smili ricerche.

cui densità sia quella, che ha lo strato aereo, dove si ritrova la superficie stessa, la base sia essa superficie, e l'altezza sia il doppio di quella, da cui scender dee uu grave vicino terra per acquistare la velocità, con cui la superficie anzidetta cammina (1). Chiamata pertanto Δ la densità variabile

<sup>(1)</sup> L'altezza del nostro cilindro da alcuni Autori riputati si fa eguale alla semplice altezza della discesa; altri la vogliono doppia e l'opinione di questi ci sembra meglio fondata. Eccone secondo me una dimostrazione. La ricerca dell'urto di un solido contro un fluido, e di un fluido contro un solido comunemente si tengono per la stessa cosa e in realtà non avvi gran diversità. Si mova un fluido contro una superficie piana normale alla direzione del moto; lo stato del fluido sia permanente, cioè nè gonfi, nè diminuisca: la velocità del fluido, ossia lo spazio percorlo equabilmente dal fluido in un secondo si disegni per u; la superficie percossa si dica m; sarà mu la quantità del fluido, che in un secondo percuote la superficie, ed mu sarà la quantità di moto estinta in tal tempo successivamente; la massa, che viene a contatto col piano nell'urto, e che perde il moto contemporaneamente, si dica mdu, la sua quantità di moto sarà mudu, che si estinguerà nel tempo dt, il quale deve stare ad un secondo, che nomino s, come mudu ad mu<sup>2</sup>, cioè come du ad u : ciò esige la supposizione, che lo stato del fluido sia permanente. Urti il fluido in vece della superficie m una colonna solida mu della stessa densità del fluido, sarà per le leggi della mudu collisione la velocità di questa massa dopo l'urto mu+mdu - mu du. Se la massa solida sosse animata da una sorza acceleratrice contraria alla direzione dell'urto, tale che nel tempo de vi possa produrre la velocità du, la massa solida spinta dal fluido non saprebbe moversi. Si chiami o tal forza, e sia U la velocità acquistata da un grave nel tempo t, cioè in un secondo; per le leggi del Galileo avremo g:φ:: U: u; disegna g la sorza acceleratrice della gravità; onde  $\varphi = \frac{pu}{U}$ . Si cerchi ora che massa animata dalla gravità vi voglia per agire contro il fluido, come agisce la massa mu animata dalla sorsa o; converrà a ciò, che le forze motrici sieno eguali, cioè dovranno essere le masse reciproche alle forze acceleratrici; sarà pertanto la massa ricercata e sostituito

e chiamato \* il peso d'un piede cubico parigino di essa acqua, sarà il peso d'un piede cubico parigino d'aria della denfità  $\Delta$  eguale a  $\pi\Delta$ ; e chiamata U la velocità, che acquista un grave vicino la superficie della terra cadendo per un secondo; cioè chiamato U lo spazio, che un grave percorrerebbe equabilmente con essa celerità in un secondo, che si sà essere piedi parigini trenta e due pollici; e supposto, che u denoti la velocità della superficie, cioè quello spazio, che con velocità si percorrerebbe equabilmente in un secondo, e finalmente rislettendo, che U è quell'altezza; da cui deve cadere il grave, perchè acquisti la velocità U; dovendo essere per le leggi del Galilei le altezze come li quadrati della celerità, farà uu l'altezza ricercata, da cui deve eadere il grave per acquistar la velocità u, ed  $\frac{uu}{11}$  sarà l'alrezza del cilindro. Il Sig. Cav. de Borda dopo replicati e diligenti esperimenti si assicurò, che la resistenza sofferta da una sfera, che viaggia per un fluido, sia eguale a quella, che incontra una superficie piana, che sia due quinte parti del circolo massimo, e che si muova colla stessa celerità, e per la stessa direzione. Chiamato pertanto C il circolo massimo della sfera farà  $\frac{2C}{5}$  la base del nostro cilindro. queste premeise deducesi che la resistenza assoluta opposta dall' aria al corpo che ascende, sia eguale al peso espresso per  $\frac{2C}{5} \times \frac{uu}{U} \times \Delta \pi$ , e posta  $\frac{2C}{5} \times \frac{\pi}{U} = g$ , che è una

ŧ.

e sostituito il valore di p, si ottiene  $\frac{mu^{\bullet}}{U}$ ; ma  $\frac{uu}{U}$  è la doppia altezza da cui scender deve un grave per acquissare la velocità u, dunque è vero &c.

7 90 W

quantità costante, sarà il peso, ossia la resistenza = pari e perciò chiamata sa forza elevatrice x, avremo l'espazione

(A) 
$$x=z-m-g\Delta uu$$
;

for ponge n il peso d'un volume di acqua eguale al volume del corpo m, sarà  $n\Delta = z$ ; onde

(B) 
$$x = n\Delta - m - g\Delta uu$$
.

La forza motrice x divisa per la massa m da la forza acceleratrice; ed espressa la forza acceleratrice della gravità per la celetità, che produce in un corpo nel tempo di un secondo, ossa per U, cioè per trenta piedi parigini e due pollici, sarà \frac{Ux}{m} la forza acceleratrice, che innalza il globo, espressa per la celerità, che produrrebbe in un corpo nel tempo di un secondo; ossa espressa per lo spazio percerso per questa celerità in un secondo. Ora abbiamo per le leggi del Galilei, che la sorza acceleratrice si debba esprimere per la massa moltiplicata nella metà dell'elemento del quadrato della celerità diviso per lo spazio elementare; dinque chiamando questo spazietto de, e non curando la massa, giacchè si tratta dello stesso globo, cioè del moto di un sol corpo, avremo

Si differenzii l' equazione (B), si otterrà

(D) 
$$D = \frac{x - n\Delta + m}{-2g\Delta} = udu$$
; e combinando infleme

le due equazioni (C), (D), nascerà l'equazione

(E) 
$$D \frac{n\Delta - x - m}{2g\Lambda} = \frac{U \times ds}{m}$$
,

effia

$$\mathcal{B} \xrightarrow{\mathbb{Z}_{2g\Delta}}^{m} = \frac{U_{xds}}{m}.$$

II. Rimane soltanto di eliminare la variabile A. A. questo fine suppongo la densità degli strati aerei in ragione de' pesi comprimenti, che sono proporzionali all'altezze barometriche. Tal supposizione, per comune consentimento de' fisici, in altezze che non sieno estremamente grandi. non fi scosta gran fatto dalla verità; che anzi il Signor Bouguer, uno de' compagni della famosa spedizione degli Accademici Francesi inviati al Perù per decidere la granquestione della figura della terra, avendo fatte osservazioni diligentissime sulle alture della Cordigliera del Perù sotto l'equatore, porta ferma opinione, come vedesi nella sua Dissertazione sopra le dilatazioni dell'aria nell'atmosfera. che l'anzidetta legge fi offervi con tutta esattezza nelle alte regioni aeree. Comunque la cosa sia, egli è sicuro. che i più diligenti e i più famoli scrutatori della natura. i quali nelle offervazioni atmosferiche hanno saputo dare il vero valore alle cagioni accidentali perturbatrici, hanno altresi ravvisata costantemente la legge già stabilita dal Boyle e dal Mariotte. Il valentissimo matematico Padre Gregorio Fontana usando la stessa legge nel suo saggio analitico delle altezze barometriche ha incontrați risultati mirabilmente concordi coll'offervazione e profimi oltre ogni credere alla verità. Ma nessuno ha contribuito tanto al dilucidamento di un punto di fisica sì interessante, quanto Mr. De-Luc. All'autorità adunque di fisici cotanto illustri m'acqueto, e: stabilisco senza altro la legge semplicissima della densità degli strati aerei, che la fa proporzionale a' pesi comprimenti. Si chiami pertanto l'altezza del mercurio nel barometro =p; essendo il peso della colonna di mercurio in equilibrio colla pressione della colonna aerea, a cui si vuole proporzionale la densità, sarà  $\Delta = \rho$ , perchè la densità e l'altezza barometrica variano nella stessa proporzione. Sia ds l'altezza dello strato aereo, a cui competa la densità A', e A' la densità A variata per lo spazietto ds. Dovendo essere la Pressione della colonnetta infinitesima aerea della densità 4,

92 TH

e dell'altezza de eguale al cilindretto infinitesimo di mercurio dell'altezza dp, li quali solidetti infinitesimi hanno la stessa base; ed essendo la pressione eguale, o almeno proporzionale al peso assoluto della colonnetta infinitesima aerea (1), farà il peso assoluto della colonnetta aerea, se non eguale, almeno proporzionale al peso del cilindretto di mercurio. Ma il peso assoluto della colonnetta aerea, non computando la base, è proporzionale alla densità \( \Delta' \) moltiplicata per l'altezza ds; dunque fisseremo questa equazione  $\Delta' ds$ Mdp; denoto per M il mercurio. Perche questa equazione non ci conduca ad assurdi, conviene farle esprimere una condizione, che propriamente dipende dal nostro arbitrio, e per cui ingiustamente si accuserebbe l'algebra, se da se stessa non l'esprima. Noi facciamo fluire l'altezze atmosseriche e barometriche per modo, che al crescere delle une calino le altre; dunque le ds e dp, se vogliamo, che l'algebra esprima questa nostra determinazione, debbono essere con fegno contrario; onde si dovrà scrivere  $-\Delta' ds = M dp$ ; ma abbiamo  $\triangle' = \triangle + d\triangle$ , e  $dp = d\triangle$ , dunque  $-\triangle ds = Md\triangle$ ,

onde  $-ds = \frac{Md\Delta}{\Delta}$ , ed integrando prendendo i logaritmi nel

fistema iperbolico, sarà  $C-s=M/\Delta$ . Per determinare la costante C si chiami a la densità dell'aria vicino la superficie della terra, dove si vuole eguale a zero l'altezza atmosferica, sarà C=M/a; dunque  $M \cdot \overline{Ia-I\Delta}=s$ . L'altezza atmosferica pertanto è proporzionale alla differenza dei logaritmi delle due densità a,  $\Delta$ , ovvero delle due altezze barometriche a tali densità corrispondenti. Onde se da sicuri e replicati esperimenti venga determinata l'altezza atmosferica s' conveniente ad una data altezza barometrica, avremo

<sup>(1)</sup> Veggasi la Sez. X dell'Idredinamica del Sig. Daniele Bernoulli.

 $M.la=l\Delta': s'$ , come  $M.la=l\Delta: s$ , e perciò  $la=l\Delta=$  $s \frac{la-l\Delta'}{s}$  e posta la quantità costante  $\frac{la-l\Delta'}{s} = c$ , sarà

; e disegna la base logaritmica del finalmente  $\Delta = ae$ 

fistema iperbolico.

III Per ottenere l'integrazione delle nostre formole faremo in appresso costretti di ricorrere alle circostanze particolari del presente quesito, poichè li metodi finora cogniti d'integrare si rendono in questa ricerca inutili: onde conviene sapere all'in circa il valore delle quantità costanti, ossia delle quantità cognite, per vedere se si possa senza pericolo di grave errore tentare qualche approfimazione; il che ci fa determinare ad un esempio. Sia il raggio del globo da innalzarsi piedi 12 parigini, sarà C ossia la superficie del suo cerchio massimo 452 piedi quadrati in circa; dunque

 $\frac{2U}{\epsilon}$  = 181. La lettera  $\pi$  che disegna il peso di un piede

cubico parigino d'acqua piovana, unità la più costante che si possa avere in questo genere, cioè trattandosi della relazione della densità dei corpi, e delle gravità loro specifiche, denota libbre 70 parigine, che è la più

verificata opinione; onde sarà  $\frac{2C\pi}{5} = gU = 12670$  libbre

parigine. La folidità del'a sfera è 7240 piedi cubici in circa; e posta la densità dell'acqua piovana alla densità dell'aria prossima alla terra come 800: 1; cioè posta

 $a = \frac{1}{800}$ , che è la maggiore leggerezza, che dar si possa

all'aria vicina al fuolo, un piede cubico parigino di quest'aria peserà un' oncia e due quinti. Noi per comodità del calcolo

- 94 W

e per metterci al sicuro, come sa d'uopo in simili ricerche, riduciamo un tal peso a una sola oncia; sicchè il volume di 724c piedi cubici parigini, se sosse di tal aria, peserebbe ad un di presso libbre parigine 453. Acciocchè poi una di queste macchine aereostatiche s' innalzi con ispeditezza, dee essere più leggiera di un egual volume di aria almen di un quarto, come spesse volte ho sperimentato in globi, che ho satto ascendere con l'aria dilatata; adunque il peso della macchina che si è chiamato m, sarà eguale a 339 libbre;

farà per tanto in tali supposizioni  $\frac{m}{gU} = \frac{339}{12670} = 0.0 26$ .

Volendo determinare il valore di e tra le molte esperienze fatte dal Cassini, Condamine, Bouguer, Feuille, e da altri che hanno somministrato i fondamenti alla tavola Bougueriana della relazione tra le altezze delle montagne del Perù, e l'abbassamento del mercurio nel barometro, che ritrovasi nelle ristessioni concernenti la sisica generale del Sig. Daniele Bernoulli, e all'altra tavola ancora del celeberrimo Sig. Enrico Lambert dataci nel suo bellissimo opuscolo intorno alla via della luce per l'aria, sceigo la famosa esperienza di M. De Luc fatta al monte Saleva, la quale dà un risultato medio, che moltissimo si accosta 2 quelli, che deduconfi dalle offervazioni fatte nelle Alpi, ed in particolare da M. Sauffure nel 1781. Alle radici del monte Saleva osservò M. De Luc, che il mercurio nel barometro, che seco aveva, era all'altezza di pollici 29, ossia a linee 348, ed essendo asceso, finchè il mercurio nel barometro calaise una linea precisamente, misuro con tutta l'esattezza possibile la verticale tralle due situazioni del barometro, e la ritrovò di tese 12, 497, eguali a

piedi paragini 74, 982 (1); dunque  $e = \frac{la-l\Delta'}{3} = \frac{l_348-l_347}{74,982}$ .

<sup>(1)</sup> Per far uso di questo esperimento sa d'uopo assicurarsi, che le

1 95 W

Fa d'uopo ricordarsi, che in questo valore di c le altezze barometriche sono espresse in lime, e le altezze atmosferielle in piedi parigini. I nostri logaritmi sono del sistema iperbolico. Ora abbiamo, che la disserenza di questi logaritmi presi nelle tavole dei logaritmi volgari è o, co 2250; dunque mel sistema iperbolico surà o, co 2878, poichè in tale proporzione sono se sortangenti de dite sistema; cioè o, 434294, ed 1, a cui sono proporzionali i rispettivi

logaritmi; onde farà  $c = \frac{0.002878}{74.982} = 0.00038$ ; ed essendo

$$a = \frac{1}{800}$$
, farà  $\frac{C}{a} = 0$ , 0,0304, e pereiò  $\frac{mc}{gUa} = 0$ ,000790

quantità picciolissima. Avremo ancora cs, quando s nossi sia molto grande, per esempio sino a piedi parigini duemina, quantità assai picciosa, cioè non siaggiore di o, 076. Di queste determinazioni a suo tempo saremo uso; torniamo intanto in cammino.

IV Sostituiscasi il valore di  $\Delta$  trovato per s (§ 2)

nell'equazione (E) 
$$D = \frac{1}{2g\Delta} = \frac{U_{nds}}{m}$$
,

$$D = \frac{m}{2ga} e^{-cq} = \frac{Uads}{m},$$

offiz 
$$dx = -\frac{2g\alpha}{mc} U cxdse^{-cs} - cnds - mcds.$$

circostanze dell'aria, che appartiene al problema da risolversi, non siene molto disserenti da quelle dell'esperienza de MADELLud, e specialistante la temperatura dell'aria; altrimenti dovrebbonsi fare le opportune correzioni secondo i metodi, che s'incontrano nello sesso autore, ed in altri celebri fissi.

Per abbreviare si ponga  $\frac{2Uga}{mc} = k$ ; nascerà

(F) 
$$dx = -kxcdse^{-cs} - cxds - mcds$$
.

Tentiamo d'integrare questa equazione con separare le indeterminate. Si ponga pertanto

$$kcdse^{-cs} + cds = \frac{-dz}{z};$$

integrando farà

**%=**6

SP faccia

$$rdz+zdr=dx=-x\times(kcdse^{-cs}+cds)=meds$$

$$\frac{mdz}{z} - m c ds;$$

fara 
$$dr = \frac{cmds}{z} + \frac{xdz}{zz} - \frac{rdz}{z} = \frac{cmds}{z} = -mcdse^{-ke^{-cs}} + cs$$

ed integrando  $r = -\int cmdse^{-ke^{-cs}} + cs$ .

Sia 
$$e^{-ke^{-cs}}=q$$
, farà  $-ke^{-cs}=lq$ , e  $cds=-\frac{dq}{qlq}$ ;

eleguite le sostituzioni sarà

$$= mk \int \frac{dq}{(lq)};$$

$$2=e^{-cs+ke^{-cs}}=-\frac{lq}{kq};$$

$$z=rz=\frac{mlq}{q}\int \frac{dq}{(lq)^2}=-m+\frac{mlq}{q}\int \frac{dq}{lq}$$

Adunque l'integrazione della nostra equazione dipende dall'integrazione della formola differenziale  $\frac{dq}{da}$ .

V. Lo stesso addiviene applicando all' equazione dissernziale il metodo dei moltiplicatori. Sia M il moltiplicatore ricercato funzione della sola s, che renda integrabile l'equazione, avremo

onde per la regola dei moltiplicatori, che si espone nel nostro Compendio d'Analisi tom. 2 cap. 7, sarà

$$\frac{dM}{ds} = Mc + Mkce^{-cs}$$

$$\frac{d\mathbf{M}}{\mathbf{M}} = ds \times kce^{-cs} + cds$$

$$M = e^{-ke^{-cs}} + cs;$$

e perciò l' integrazione dell'equazione sarà

più una funzione di c. Per determinare questa funzione si disserenzii la formola

#### 46 AM

e il differenziale si sottragga dall'equazione; ciò satto ritroveremo la ricercata funzione di

$$= m \int e^{-ke^{-cs}} + cs_{cds},$$

onde l'integrale della proposta equazione sarà

offia 
$$\frac{\pi}{z} = r - m \int cds e^{-k} e^{-cs} + cs$$
 come fopra:

Con altri metodi ancora ho incontrato la stessa formola differenziale  $\frac{dq}{da}$  da integrarsi per ottenere in termini finiti la legge delle forze elevatrici riferite alle altezze

atmosferiche.

VI. Volendo costruire questa formola, colla tangente T. VII CA, e collo stesso protonumero eguale ad uno, sia descritta la logistica XAZ, e presa una qualunque ascissa BP =q,

farà PH=1q, e posta PL=1 = 1 fi descriva la curva

SLT; l'area di questa curva sarà  $\int \frac{dq}{lq}$ . La curva ha

due rami, uno SLT afintotico, e verso MS, e verso TN; l'altro BQ afintotico verso QR. Lo spazio adunque appartenente all'ascissa BP sarà lo spazio infinito AMSLP, e l'altro spazio infinito BAQR. Questo aree infinite impediscono di ritrarre alcuna utilità dalla presente costruzione

della formola  $\int \frac{dq}{la}$ .

A 99 W

VII. Rivolgiamoci alle serie; a questo sine pongo la =h+ly, h è una costante arbitraria, y una variabile, e

posto  $\frac{1}{n}$  il numero di cui h è logaritmo, sarà ndq = dy,

$$e \frac{ndq}{lq} = \frac{dy}{b+ly}.$$

Si getti in serie la frazione  $\frac{1}{b+ly}$ , otterremo

$$\frac{1}{b+ly} = \frac{1}{b} - \frac{ly}{b^2} + \frac{(ly)^3}{b^3} - \frac{(ly)^3}{b^4} + \text{ ec.}; \text{ onde}$$

$$\frac{dy}{b+ly} = \frac{dy}{b} - \frac{dyly}{b^2} + \frac{dy(ly)^3}{b^3} - \frac{dy(ly)^3}{b^4} + \text{ ec.}$$

L'integrazione dei termini di questa serie è in nostra potestà, perchè dipende essa dall'integrazione della formola dy(ly), la quale s'integra nella maniera che segue.

Si differenzii y(ly), avremo

- <del>- - -</del> - - :

D.y(ly)'=dy(ly)'+rdy(ly)'-1; e perciò  

$$y(ly)'-r \int dy(ly)'^{-1} = \int dy(ly)';$$

adunque l'integrazione della formola dy(ly) dipende dalla integrazione di quest'altra  $dy(ly)^{r-1}$ . Nella stessa guisa si dimostra, che l'integrazione della  $dy(ly)^{r-1}$  dipende dall'altra  $ly(ly)^{r-2}$ , e così viz discorrendo si giungerà alla formola dy(ly); integrata questa rimarrà totalmente integrata la formola dy(ly); ora è chiaro che l'integrale della formola dy(ly) sia yly-y; ed in fatti differenziata questa si ottiene dyly.

Dunque  $\int \frac{dy}{b+ly}$  fi trova aver questa forma Ay = Byly+Cy (ly)\* — Dy (ly)\* ec.

A,B,C,D, ec. fono coessicienti positivi. Ma faremo vedere

in appresso essere quantità negativa e picciolissima, e

perciò lq, e in conseguenza ly, quantità negativa e grandissima; dunque i termini di potestà dispari della serie sono positivi; tali sono pertanto tutti i termini della serie i quali crescono continuamente, il che rende la serie divergente e inutile. Altre serie ho posto alle pruove; ma in tutte sono nati tali inconvenienti, che ha bisognato abbandonare l'impresa.

VIII. Senza separare le indeterminate si può costruire

fa nostra equazione disserenziale  $dx = -kxcdse^{-cs} - xcds$ 

T.VII -mede. Presa la retta AC per linea delle ascisse, e il Fig. 5.

punto A per principio, si tagli AY=cs-ke<sup>-cs</sup>, e colla ordinata mcs=YZ si descriva la curva BZ, e segata YC=1, e condotta ad AC la normale CS, da Z sopra CO si cali la perpendicolare ZO; si seghi SO=x, e si congiunga SZ. Sia ora YK=CM una linea infinitesima; dai punti K, M si alzino ad AC le normali KH, MN, una che incontri la curva in H, l'altra che incontri la ZS in N, e si conduca MN: replicando con questo metodo l'operazione s'intenda descritta la curva SN: dico che essa soddisfaccia all'equazione differenziale proposta. Da S sopra MN si cali ST normale; posta AC=z, e CS=u, sarà ST=dz, ed NT=-du;

FOT US

avremo adunque dz: - du::ZO:SO::1:x;

ma abbiamo z=AY-YC=cs-ke<sup>-cs</sup>-1

ed u=YZ+OS=mcs+n.

e perciò r  $dz = cds + kcds \times e^{-cs}$ ,

du = mcds + dx:

dunque farà cds + kcdse -cs: -mcds -dx:: 1:x:

onde  $dx = -meds - xcds - kxcdse^{-cs}$ ,

che è appunto l'equazione proposta. Per determinare la prima posizione di SZ si osservi, che supposto s=0, cioè sul momento della partenza del corpo, deve essere x = na - m, cioè quando sia AC = -k - 1, e AY = -kdeve divenire OS = na - m. La presente curva è del genere delle trattorie, di cui discorro nel Compendio di Analisi tom. 2 lib. 2 cap. 8. Il Sig. Marchese Poleni ha immaginato uno strumento per descrivere simili curve. Incresce per altro che la riferita costruzione non sia libera da ogni difficoltà, perchè la curva da noi descritta, comecche sodisfaccia all'equazione, non me seguita per questo, che sia l'unica; infinite altre potrebbero darsi, a cui competa la stessa equazione differenziale; nè è cosa difficile il provare, che realmente così avvenga; onde se la descritta faccia al caso nostro, non avverrebbe che per mero accidente: credo per altro d'aven motivi da sospettare il contrario.

IX. A qual partito potremo appigliarci mai in sircostanze così spinose? Ecco quel che si è divisato. In primo luogo si ristetta, che questi corpi più leggeri dell'aria salgono sino ad una certa altezza, eve si sermano; il che manisestamente indica, che il moto da accelerato passa a

ritardato; ossia la ferza acceleratrice passa dall'essere positivo al negativo; dunque dovremo in qualche altezza avere un punto, dove la forza sia eguale a zero. Dico in secondo luogo, che un tal passaggio si sa dopo che il corpo ha percorso picciol tratto di spazio. Il che così dimostro. Supponghiamo la densità dell'aria costante = a, cioè eguale a quella, che si ha vicino la supersicie della terra, e cerchiamo la legge della celerità riferita alle altezze atmosferiche. Già abbiamo (s 1) l'equazione

(C) 
$$= \frac{Uxds}{m} = udu$$
,

e sostituendo in luogo di a il suo valore, otterremo

$$ds = \frac{m}{U} \times \frac{udu}{m_a - m - gaun}, \quad ed \quad integrando$$

aggiungendo la costante per modo, che sia u=0, quando

$$s = 0$$
, risulterà  $s = \frac{m}{2 \text{Uga}} L \frac{na-m}{na-m-gaun}$ . Se suppongasi

s infinita, nascerà  $uu = \frac{na-m}{g^a}$ , e perciò la velocità sarà

finita. Adunque il moto sarà continuamente accelerato per tutto lo spazio infinito; e ciò non ostante il corpo non potra mai acquistare se non limitato grado di celerità,

chie mai non sarà maggiore di  $\frac{na-m^2}{ga^2}$ ; questa celerità è

come un afintoto, a cui si accosta senza limite la ceserità del corpo. Ora chi è pratico di queste variazioni afintotiche, facilmente comprende, che esse sul principio procedono a gran passi, in seguito lentissimamente e quasi insensibilmente. L'esperienza conserma questa rissessione, poiche i gravi, che cadono per l'aria vicino la superficie della terra presto dal moto accelerato passano al moto equabile. Ciò tanto maggiormente si verifica, se la forza acceleratrice non fi conservi costante, ma vada continuamente e sensibilmente calando; che anzi in tal caso non solamente il moto accelerato si sa equabile, ma presto si converte in ritardato. Nella falita dei corpi per l'aria la forza acceleratrice, ossia elevatrice riceve alterazione, sì perchè si cangia la densità dell'aria, sì perchè si muta il grado di celerità; per un tratto alquanto considerabile la variazione della densità è quasi insensibile, quando al contrario quella che soffre la celerità per tratto ancor picciolissimo è grandissima; dunque la forza elevatrice presto andrà al niente, cloè vi andrà prima che la variazione della densità degli strati sia considerabile; e perchè il tratto per cui fi accelera il moto è picciolissimo in paragone di quello per cui si ritarda; dunque la forza ritardatrice è spregevole per riguardo all'elevatrice; discorro delle forze medie, essendo si l'una, che l'altra variabile; ma la forza elevatrice comecchè media, ha un qualche ragguaglio non dispregevole al peso, che si vuol dare al globo aereostatico, il quale peso si è detto m; dunque la forza ritardatrice sarà spregevole in confronto ancora di m. Laonde nell'equazione  $m = n\Delta - m - g\Delta uu$  si può senza timore di molto errare supporte x = 0 pel tratto in cui il moto si ritarda. Quantunque non siaci riuscito di determinare la legge delle forze acceleratrici rispettivamente all'altezze atmosferiche, tuttavia potendo noi supporre n=0 nell'equazione n=0-m-g\Duu quando il moto è ritardato, cioè per la massima parte dell'altezza, a cui s'innalza il globo, non sarà

## 104 W

difficile sciorre, per quanto basta alla pratica, altri problemi interessanti concernenti il suo moto.

Si voglia sapere la relazione tralla densità degli strati

e le velocità, avremo subito  $o = n\Delta - m - g\Delta uu$ , e  $\Delta = \frac{m}{n - guu}$ .

Similmente con facilità si avrà la relazione tralla velocità e le altezze ove giunge il corpo, poiche nel (§ 2)

trovammo

$$\triangle = ae^{-cs};$$

Se si desideri la relazione tra gli spazii e i tempi, si avverta, che nel moto variabile sia  $u = \frac{ds}{dt}$ ; satta la

fostituzione nell'equazione precedente si ottiene l'intento: Se finalmente abbiasi da determinare la relazione tralla velocità e i tempi, si disserenzii l'equazione

$$\beta\beta^{-CS} = \frac{m}{s - gus}.$$

e si ritrovi il valore ds dato per u; sossituito questo nella equazione  $u = \frac{ds}{ds}$  si avrà ciocchè si desidera.

X. Ma non rincresca di trattare questa materia con maggiore precisione, adoperando un calcolo più rigoroso.

Si prenda la formola  $\int \frac{dq}{lq}$  che fa tutta la dissicoltà della nostra ricerca, essa è eguale alla formola

$$\frac{q}{lq} + \int \frac{dq}{(lq)^n}$$
;

dunque si avrà

$$D_{\frac{q}{lq}} = \frac{dq}{lq} - \frac{dq}{(lq)^2} = \frac{dq}{lq} \times 1 - \frac{1}{lq}.$$

Si esamini la frazione  $-\frac{1}{l_q}$ 

essa è equale  $\frac{e^{cs}}{k}$  (§4),  $=\frac{mc}{2Ugs} \times e^{cs}$  similmente (§4).

Nel § 3 si è ritrovato  $\frac{mc}{2Ugs} = 0,0004$ , e c=0,000038;

dunque  $-\frac{1}{19}$  =0,0004  $e^{0}$ , 000038s. Se pongafi s =0,

farà  $-\frac{1}{lq}$  =0,0004; se pongasi  $s=\frac{1000000}{38}$ , cioè a piedi parigini 26315, altezza di gran lunga maggior di quella, a cui possono giungere i nostri globi aereostatici i più leggieri, sarà  $-\frac{1}{lq}$  =0,0004 e, denota e la base del sistema iperbolico, che è, 2,7182; satta la moltiplicazione si ritrova  $-\frac{1}{lq}$  =0,001. Da ciò si raccoglie, che  $-\frac{1}{lq}$  sia una quantità, la quale si mantien sempre picciolissima per tutta l'altezza a cui possano mai sollevarsi i nostri

#### 106 W

globi aereostatici; onde non porteremo gran divario nel calcolo, qualora suppongasi  $1 - \frac{1}{lq}$  quantità costante; chiamisi essa Q, sarà

$$D_{\frac{q}{lq}} = \frac{dq}{lq} \times \overline{1 - \frac{1}{lq}} = \frac{dq}{lq} \times Q;$$

ed integrando  $\frac{q}{Q l q} = \int \frac{dq}{lq}$ . Ognun vede qual sia il valore che convengasi dare alla quantità Q per non andare molto lungi dal vero, cioè esser debbe  $Q = 1 - \frac{1}{2 l q}$ 

prendendo di 1 quel valore che conviene all'altezza, dove si vuole sermare l'integrazione: per esempio se si voglia sermare l'integrazione all'altezza sopra indicata di piedi parigini 26315, dee prendersi

$$Q=1+0, \frac{001}{2}=1,0005.$$

Torniamo ora all'equazione esprimente la sorza acceleratrice, che si ha pel § 4, cioè

$$x=-m+\frac{mlq}{q}\times\int\frac{dq}{lq}$$

diverrà essa per le cose qui sopraddette

$$x=-n+\frac{mlq}{q}\times\frac{\overline{q}+C,$$

offia

$$0 = \overline{-x - m} \times \frac{q}{lq} + \frac{mq}{Q lq} + C.$$

Per determinare la costante C si avverta, che quando sia s=0, cioè  $q=e^{-k}$ , lq=-k, allora diventax=nq-m;

onde 
$$\frac{nae^{-k}}{k} - \frac{me^{-k}}{Qk} + C = 0,$$

$$C = \frac{m - Qna}{Qk} \times e^{-k} \cdot \text{ Laonde}$$

$$o = (-x-m) \times \frac{q}{lq} + \frac{mq}{Q^{lq}} + \frac{m-Qna}{Q^{k}} e^{-k}$$

$$e \qquad n = \frac{lq}{q} \times \frac{Qna-m}{Qk} e^{-k} + \frac{m-nQ}{Q}$$

e sostituendo il valore di q sarà

$$= e^{-ke^{-cs}-cs} \times \frac{Qns-m}{Q} = k - \frac{Qm+m}{Q}.$$

Abbiamo voluto, che la quantità Quia eguale 1-14; se

si ponga per brevità  $-\frac{\pi}{lq} = \omega$ , sarà  $Q \Rightarrow 1 + \omega$ ; onde sossituendo, e trascurando i termini moltiplicati per  $\omega$  in confronto di quelli moltiplicati per  $1 + \omega$ , per essere  $\omega$ 

# 108 UM

spregevole paragonata all'unità, si ritroverà finalmente

(G) 
$$x=e^{ke^{-cs}-cs-k}\times \overline{na-m-\omega m}$$
.

XI. Prima di ogni altra cosa determino il punto, in cui x diviene eguale a zero: nell'equazione (G) avremo

$$\omega m = e^{k e^{-cs} - cs - k} \times \frac{1}{na - m}$$

e per essere

$$w = -\frac{1}{4q} = \frac{e^{cs}}{k} (54)$$

farà

$$e^{ke^{-es}-k} \times \frac{me^{2cs}}{k}$$

Essendo s di pochi piedi, come abbiamo provato (§ 9), sarà 2cs una picciolissima frazione (§ 3); dunque 2cs poco

differirà dall'esponente zero, e in conseguenza e<sup>2cs</sup> non differirà dall'unità; onde si potrà in sua vece porre l'unità senza pericolo di grave errore; nella quantità poi

ek (e-cs-1) la quantità ecs non si può prendere per

l'unità; imperocchè quantunque e s\_1 fia una frazione picciolissima, tuttavia essendo k numero grandissimo,

l'esponente  $k [e^{-cs}-1]$  non si può trascurare; dunque

avremo 
$$(na-m)e^{k(e^{-cs}-1)} = \frac{m}{A}$$

offiz 
$$k \frac{na-m}{m} = e^{k(1-e^{-cs})}$$

$$L. k \frac{na-m}{m} = k(1-e^{-cs})$$

e finalmente 
$$s = \frac{1}{c} \times L = \frac{1}{1 - \frac{1}{b} L k \frac{na - m}{m}}$$
.

Per l'esempio nostro abbiamo

$$m = \frac{3na}{4} (\int 3)$$
, dunque  $\frac{na-m}{m} = \frac{1}{3}$ ,

$$na-m \times \frac{k}{m} = \frac{10000}{12}$$
, eL $\frac{10000}{12} = 2/100 - 1/12 = 2$ , 920819

presi i logaritmi nel sistema volgare, e nel sistema iperbolico

$$\frac{2,920819}{0,434294}=6,72;$$

onde

$$L = \frac{1}{1 - \frac{1}{k} L k \frac{na - m}{m}} = L \frac{1000}{997 \cdot 312} = 0,001169$$

nel fistema volgare, e nell'iperbolico

$$=\frac{0,001169}{0,434244}$$
\_0,002691,

quindi finalmente avremo

$$\frac{1}{\epsilon} L \frac{1}{1 - \frac{1}{h} L k^{na-m}} = \frac{0,00269 \text{ m}}{0,000038} = 70 \text{ piedi parigini.}$$

Ecco all'incirca a quale altezza passa il moto dall'essere accelerato all'essere ritardato. Dunque da questo punto in su la forza x nell'equazione (G) sarà negativa, e sarà minore di mω, e perciò dispregevole in paragone di m per essere ω una frazione picciolissima (§ 10).

Anzi dopo picciol tratto il primo termine dell'equazione

(G) 
$$e^{ke^{-cs}-cs-k} \times \overline{na-m} = e^{-cs} \times \frac{na-m}{e^{k(1-\frac{1}{e^{cs}})}}$$

svanisce al confronto del secondo termine — mo. Vediamolo nel nostro esempio. L'altezza del mercurio nel barometro vicino terra sia pollici 27 eguale a linee 324; cali il mercurio per linee 4, il che corrisponde nelle tavole del Sig. Lambert a tese 48 di altezza; sarà

$$\frac{a}{\Delta} = e^{cs} = \frac{324}{320} = \frac{81}{80}, \text{ ed } 1 - \frac{1}{e^{cs}} = \frac{1}{81},$$

$$k \cdot 1 - \frac{1}{e^{cs}} = \frac{10000}{324} = 30 \text{ (1)}$$

$$e^{k(1-e^{-cs})}=e^{30}$$
; ma abbiamo  $e=2$ , 718281;

dunque  $e^{30} = (2,718281)^{30}$ ;

questo numero è di una grandezza immensa, e perciò

<sup>(1)</sup> Trattandosi di esempio si dee permettere qualche disprezzo per comodità di calcolo.

$$\frac{e^{-cs}}{e^{k} (1-e^{-cs})} \times \overline{na-m} = \frac{81}{80} \times \frac{1}{(2,718281)} 3^{\circ}$$

diviene onninamente spregevole in confronto di

$$m\omega = \frac{me^{cs}}{k} = \frac{81}{80} \times \frac{12}{10000} = \frac{81}{80} \times 0,0012,$$

avremo pertanto quasi per tutto il moto riterdato l'equazione

$$x = -\frac{me^{cs}}{k}$$
ed effendo  $e^{cs} = \frac{a}{\Delta}$ , farà  $x = -\frac{ma}{k\Delta}$ ; onde la

forza ritardatrice sarà in ragion reciproca delle densità dell'aria. Questa forza poi è sempre disprezzabile in riguardo ad m a cagione della picciolezza della frazione

$$\frac{e^{CS}}{\kappa} = \frac{81}{80} \times \frac{4}{10000}$$

Pel tratto poi in cui l'equazione appartiene alla forza acceleratrice, convien rislettere, che essendo esso corto, ed innalzandost perciò poco sopra la superficie della terra, si può supporre costante la densità dell'aria; dunque l'equazione

(E) (§ 4) ci dà 
$$s = \frac{m}{2gaU} \times L \frac{na-m}{x}$$
.

fupposto x = 0 si ritrova s infinita, il che prova, che la forza elevatrice non possa divenire zero, se non quando il corpo giunto sia ad una altezza infinita; cosa che viene contraddetta dall'esperienza, posche si vede tutto di giungere i gravi al moto equabile, mentre cadono per l'aria, specialmente se sieno leggieri. Ciò altro non vuol significare

che le perdite delle forze sul principio sieno grandissime. in maniera che per picciolo tratto di spazio la forza sia in massima parte estinta e che l'altra porzione picciolissima si vada estinguendo insensibilmente per un tratto di spazio infinito, come appunto fanno le ordinate delle curve asintotiche rispetto alle ascisse corrispondenti. Questa picciola porzione di forza trattandosi di supposizione non matematica puramente, ma fisica, viene presto estinta da altre cagioni, come sarebbe dalla frizione, dalla tenacità del fluido ec., onde al senso questi moti accelerati si convertono in equabili. Quando poi la forza cali ancora a motivo, che si faccia più picciola la differenza della gravità dell'aria, o per meglio dire la sua densità vada continuamente calando in grado sensibile, come nel caso nostro; allora il moto avrà un punto, dove termina l'accelerazione, ed incomincia il ritardo, il che avviene, come abbiam visto, in altezza non molto grande. Ritrovate due leggi di forze espresse con due equazioni differenti corrispondenti a due porzioni di tutta l'altezza, a cui ascende il globo, converrà risolvere gli altri problemi risquardanti lo stesso moto colla stessa distinzione, cioè per riguardo al tratto dello spazio, dove la forza ha una legge, ossa quando il moto è accelerato, e per riguardo al tratto di spazio, dove vale l'altra legge delle forze, cioè quando il moto è ritardato.

## 113 W

# PROBLEMA II

XII Ritrovare la legge delle celerità riferite alle altezze atmosferiche.

Nel periodo del moto accelerato abbiamo

$$s = \frac{m}{2 \log a} L \frac{na-m}{x} ( \int 11 );$$

ma abbiamo  $x = n\Delta - m - g\Delta uu$  (§ 1); dunque nel case presente in cui è  $\Delta = a$ , sarà

$$s = \frac{m}{2Uga} L \frac{na-m}{na-m-gauu}$$

ciocchè si doveva ritrovare. Supposto gauu = na m sarà e infinita, il che indica che il moto si dovrebbe accelerare per una altezza infinita, e che ciò non ostante la celerità massima sia limitata, la qual cosa non è all' esperienza consorme. Si applichi alla celerità il discorso sopra tenuto per riguardo alla forza, e si concilierà facilmente l'esperienza e la teoria.

Vengo al moto ritardato. Per questo tratto si è ritrovato  $x = -\frac{me^{cs}}{k}$  disprezzabile per riguardo ad m; ma abbiamo  $x = n\Delta - m - g\Delta uu$ ;

dunque sarà  $m = n\Delta - g\Delta uu$ ,

offia  $\triangle = ae^{-cs} = \frac{m}{n-guu}$ ; equazione ricercata.

Volendo determinare la massima celerità conveniente a quella altezza, dove il moto dall'essere accelerato passa al ritardato, dall'equazione superiore si ricavi

$$e^{cs} = \frac{na - gauu}{m}$$

ed 
$$u = \sqrt{\frac{na-me^{\varepsilon s}}{g^a}}$$
:

fi ponga in luogo di s il valore di sopra ritrovato per la massima accelerazione, cioè

$$s = \frac{\cdot}{c} L \frac{1}{1 - \frac{\cdot}{k} L \frac{na - m}{m} k}$$

e avremo 
$$u = \left(\begin{array}{cccc} L & -\frac{1}{k} & \frac{1}{m} & \frac{1}{k} \\ & & & & \\ \hline & & & & & \\ \hline & & & & & \\ \end{array}\right)^{\frac{1}{2}}$$

Eisendo il numero  $L_{1-\frac{1}{k}}L_{\frac{nq-m}{m}k}$  una picciolissima

frazione, quindi la base logaritmica e alzata a potestà di tal numero non disserirà dall'unità. Nel nostro esempio abbiamo ritrovato

$$L_{\frac{1}{1-\frac{1}{k}L}k^{\frac{na-m}{m}}} = 0,002691 = \frac{1}{385}$$

in circa, ora la radice trecentesima ottantacinquesima di e pochissimo differisce dall'unità; dunque senza timore di

# 715 UM

grave errore si potrà prendere per la massima celerità  $u = \sqrt{\frac{na-m}{ga}}$ : sostituiti i numeri ritroviamo pel nostro esempio u = 14.72 piedi parigini. Dunque la massima celerità del nostro globo porta 14,72 piedi parigini per secondo.

#### PROBLEMA III

XIII Ritrovare la legge tra i tempi e gli spazii

In questo problema ancora distinguo i due periodi come sopra. Pel tratto del moto accelerato l'equazione tragli spazii e le celerità è

offiz
$$u = \sqrt{\frac{na-m}{ga} + \frac{m-na}{gae^{\frac{2sUga}{m}}}}$$

$$u = \sqrt{\frac{na-m}{ga} + \frac{m-na}{gae^{\frac{2sUga}{m}}}}$$

$$u = \frac{ds}{st}, \text{ dunque}$$

$$dt = \sqrt{\frac{na-m}{ga} + \frac{m-na}{gae^{\frac{2sUga}{m}}}};$$

fi ponga per brevità  $\frac{na-m}{g^a} = h$ , e  $\frac{2Uga}{m} = i$ ; onde sia

$$ds = \sqrt{\frac{ds}{b-b:s}is} = \frac{ds}{\sqrt{b} \times \sqrt{\left(1-\frac{1}{s}is\right)}}$$
P 2

Sia 
$$V(1-\frac{1}{e^{is}})=r$$
, farà  $1-e^{-is}=rr$ , e

$$ds = \frac{2rdr}{i(1-rr)}$$

onde 
$$d t \checkmark h = \frac{2dr}{i(1-rr)} = \frac{dr}{i(1-r)} + \frac{dr}{i(1-r)};$$

ed integrando  $t+C=\frac{1}{i\sqrt{b}}L\frac{1+r}{1-r}$ . La costante si determina supponendo t=0, quando sia s=0; essendo in tal supposizione ancora r=0, si trova C=0; indi non avvi bisogno di aggiungere costante alcuna.

Volendo determinare il tempo dal principio del moto fino alla celerità massima si sostituisca in luogo di sil suo valore conveniente a questo punto, che già è siato determinato di sopra.

Pel tratto del moto ritardato abbiamo l'equazione tra gli spazii e le celerità

$$u = V\left(\frac{na-m^{cs}}{ga}\right) (\int 12$$

ma  $u = \frac{ds}{dt}$ 

dunque  $d t = \frac{ds}{\sqrt{\frac{na-me}{gs}}}$ 

fi ponga  $r = \sqrt{(na-me^{ec})}$ 

farà  $na - me^{cs} = rr$ 

$$ds = \frac{-2rdr}{mce^{cs}} = \frac{-2rdr}{c(ns-rr)}, e dt = \frac{-\sqrt{ga.2}dr}{c(ns-rr)}$$

$$t+C=\frac{\sqrt{ga}}{c\sqrt{an}}L\frac{\sqrt{an}-r}{\sqrt{an}+r};$$

Volendo determinare la costante C, si ponga t=0, quando

fia 
$$s = -\frac{1}{c} L(1 - \frac{1}{k} L \frac{na - m}{m} k),$$

che è l'altezza dove il moto dall'essere accelerato passa al

ritardato. Posta u = 0, avremo  $\sqrt{\frac{na-me^{cs}}{gs}} = 0$ , e

perciò  $s = \frac{1}{c} L \frac{na}{m}$ , e questa sarà la massima altezza a cui giungerà il globo. Se questo valore si ponga in luogo di s nell'equazione dei tempi e degli spazii, si avrà il tempo impiegato per tutto il moto ritardato; e se a questo si aggiunga il tempo speso nel moto accelerato, il quale si ritrova di pochissimi secondi, avremo il tempo totale della elevazione del corpo.

XIV Si potrebbe demandare se quando il corpo sia giunto alla massima altezza, dove si annulla la celerità si annulli ancora la forza ritardatrice, e perciò se stare debba esso in persetto equilibrio, ovvero se debba oscillare dall'alto in basso? Per rispondere alla presente domanda prendo l'equazione  $x = n\Delta - m - g\Delta u u$ , e suppongo u = 0, avremo  $x + m = \Delta n$ ; ma abbiamo veduto che x si mantiene sempre dispregiabile relativamente ad m, dunque  $m = n\Delta$ ; onde il volume d'aria  $n\Delta$  pesa quanto il corpo m, o per meglio dire il peso d'aria  $n\Delta$ , il cui volume è uguale a quel globo stesso, e per conseguenza questo starà in equilibrio e giungerà alla quiete senza fare oscillazioni, almeno molto sensibili.

XV Prima di por fine alla proposta ricerca, darò un metodo facilissimo per determinare l'altezza, a cui giunger deve un pallone, posto che sia cognito il di lui diametro, e il peso totale. Essendo cognito il diametro, si saprà ancora il peso di un eguale volume d'aria prossima alla superficie della terra. Si prenda nelle tavole dei logaritmi appartenenti a due numeri, uno che esprima il peso anzidetto del volume d'aria e l'altro il peso totale del globo; da questa differenza data in parti milionesime dell'unità, si taglino le due ultime figure; le figure residue verso sinistra esprimeranno il numero di tese parigine per l'altezza ricercata. Così essendo stato nel (§ 3) trovato il volume d'aria vicino la superficie della terra, che uguaglia il volume del nostro globo, pesare libbre parigine 453, ed il globo stesso pesare libbre 337, ed essendo la differenza dei logaritmi volgari di questi numeri in parti milionesime dell' unità 0, 128468, farà il numero delle tese per l'altezza ricercata 1284 in circa. Eccone la dimostrazione. Nel  $\int 13$  abbiamo ritrovato  $s = \frac{1}{2} L \frac{na}{m}$  nel sistema iperbolico; ma il logaritmo iperbolico è eguale al logaritmo yolgare diviso per la propria sua tangente = 0, 434294; dunque  $s = \frac{1}{c \times 0,434294} L \frac{na}{m}$  diviso per b, cioè riducendo differisce da tese 10000. i piedi a tese, pochissimo Dunque 10000  $L \frac{na}{m} = s$ , e perciò pigliando  $L \frac{na}{m}$ parti milionesime nel sistema volgare, si dovrà moltiplicare esso per 10000; il che si sa staccando le due ultime figure. In tal maniera pertanto si avrà il numero di tese = s, come si doveva dimostrare.

## 7 119 W

# SHE SHE THE SHEET WHEN

# $VII_{-}$

# NUOVO METODO

DA RISOLVERE ALCUNI PROBLEMI DI SITO E POSIZIONE

#### DEL SIGNOR FERGOLA

Proposto alla R. Accad. nel 1786.

#### S I

Jun metodo ha tanto conferito ai progressi della geometria, quanto l'averle innestato il calcolo analitico, che le quantità continue e i loro rapporti esprimendo convenevolmente e pareggiando, le grandezze ignote non pur disviluppa, ma lor ne assegna un geometrico valore determinato. Renato delle Carte, cui deesi invenzione si gloriosa, appena esposela nei suoi libri di geometria, che i più prosondi Matematici di Europa seguendo le di lui orme recarono a quest'arte euristica quella persezione, di cui ormai scorgesi colmata. Onde a ragione possiamo pregiarci che agevole or ne riesca risolver con tal metodo infiniti problemi geometrici, e quei ben anche che un tempo travagliarono i più sublimi ingegni dell'antichità, o che a stento or si snoderebbero da chi vosesse giusta la loro analisi imprenderne la soluzione.

§ 2 Ma egli è da dolersi impertanto, che malgrado di si copiosa luce versata sulla soluzione dei problemi geometrici, pur restino al bujo quegli altri che concernon sito e posizione. È quel che ne appare più strano, mentre i Matematici del

del secol nostro di ciò concordemente si dolgono, le lore speculazioni non son dirette, che ai soli metodi analitici, e trascurano assatto ogni ricerca, ch' essi potrebber sare sull'analisi degli antichi, e sulla risoluzione dei mentovati problemi. Non è quindi strano, o vituperevole, ch' io ne abbia intrapresa qualche disamina, e che ora ne comunichi a questa illustre Società un metodo sicuro e facile, in cui mi sono imbattuto per risolverli: sperando non che altri ne abbia di ciò buon grado, ma che qualche illustre geometra con tal esempio inducasi a migliorare il metodo d'invenzione adoperato dagli antichi con tanta venustà, e che ora incolto si giace e derelitto.

§ 3 Ma per esporre con ordine quanto su tale soggetto ne occorre dire, rapporterò i problemi di sito e posizione a tre principali generi. Al primo riserirò quei problemi, nei quali, una grandezza data vuossi con un certo sito adattare entro più linee date di posizione: al secondo quegli altri, ove, la grandezza da adattarvisi non sia data che di spezie, ed al terzo finalmente ascriverò quei problemi di sito, che a queste classi non si appartengono. E perchè questa intera investigazione ne riuscirebbe alquanto lunga, e malagevole, quì mi son ristretto alla sola dissamina dei primi, abbozzando il metodo da tenersi per gli altri, che

a miglior agio tratterò alla distesa.

My Quando una grandezza data si vuole adattare con un certo sito fra più linee date di posizione, ognuno si avvisa che tal problema resti legittimamente risoluto, se pur gli riesca di vicendevolmente adattare alla grandezza data quelle linee che con essa ottenendo il sito addimandato, serbino pur anche fra loro la data posizione. Or questa riduzione sì facile e naturale, chi l' crederebbe? è il principio donde con brevità e nitidezza risolvonsi alcuni difficilissimi problemi di tal genere, ed è in altri la via, che sola metre alla loro risoluzione: che anzi con sissata riduzione rimettonsi moltissimi problemi a pochi problemi cardinali.

cardinali, che qui si diranno Porismi, e che scioglierò

prima di favellare sull'indicato metodo.

f 5 La grandezza che si propone di adattare con un certo sito tra le linee date di posizione, se sia retta o angolo, sarà data di sola magnitudine; se figura, di magnitudine e di specie: ed in entrambi questi casi dirassi semplicemente data. Ma l'adattarle vicendevolmente quelle linee che seco abbiano il sito con cui son date nel problema, si dirà circoscrizione. E questo metodo si dirà Principio di conversione.

# PORISMAI

§ 6 Dati i due circoli EQF, EQAD, che s'intersechino in T. IX. E e Q, tirare per lo punto E la segante ECA, sicchè CA num. 1 parte di essa che resta fra gli archi QC, QA, pareggi la retta M.

Anal. S' intenda tirata la segante ECA, che si addimanda; e s'intendano eziandio condotte le rette AQ, CQ, che uniscano l'altro punto Q cogli estremi A e C

della parte richiesta. Ciò posto,

Essendo dati di posizione e di grandezza i circoli EQF, EQAD, che si tagliano fra loro, sarà data la retta QE che attraversa le loro sezioni Q ed E: onde sarà dato non meno l'angolo QAC, che l'altro QCE, e quindi QCA conseguente di questo.

E' data di vantaggio la base AC del triangolo AQC, che dalle condizioni del problema dee pareggiare la retta M.

E' dunque esso triangolo AQC dato di spezie, e di grandezza (26 lib. I Elem.): e quindi sarà dato di grandezza sì il lato QA che l'altro QC, e sarà risoluto il problema.

#### PORISMA II

T. IX § 7 Data di posizione la retta DC e'l circolo ANB, e date di più il punto A nella sua periferia, applicare tra essa retta e l'arco l'altra retta BC, che fia uguale ad M, e congiunta AB sia l'angolo ABC uguale al dato X.

Cas. 1 La data retta DE incontri primieramente il circolo nei punti D ed E: e s'intenda protratta verso N la retta BC, che si vuole adattare col proposto sito tra l'arco EBN, e la retta DC. Giò posto,

Essendo dato l'angolo ABC sarà dato il suo conseguente ABN, e quindi sarà dato di posizione il punto N della periferia rispetto alla retta DC. Si meni NP perpendicolare su di DC, e sia

NP=a DC = b + xMa per la natura del circolo esser dee PC=c+# DE=6 NC×CB=DC×CE

EC=n farà NC=V(a'+(c+x)')

NC×CB= $f \lor (a'+(c+x)')$  fara dunque  $x'+bx=f \lor [a'+(c+x)']$ P = c

BC=M=f  $DC\times CE=bx+x^*$ 

DP=DE-EP=g

Facciali intanto I.  $y^2 = a^2 + (c+x)^2$ , n'emergerà II.  $fy = x^2 + bx$ Di queste locali la prima si appartiene alla iperbole parilatera, di cui n'è a un dei semidiametri, c+x l'ascissa dal centro presa nel semidiametro secondario, y la semiordinata corrispondente: e l'altra si riferisce alla parabola, di cui

il parametro n'è la retta M,  $y + \frac{b^2}{af}$  è l'ascissa dal

vertice,  $x + \frac{b}{2}$  la sua corrispondente semiordinata.

Che se it doppio della seconda locale sottraggissi dalla prima, ne addiverrà la seguente equazione al cerchio III. y'-2fy=a'+c'-2gx-x', di cui il raggio n' è  $\sqrt{(a'+c'+f''+g')}$ , g+x l'ascissa dal centro, y-f la sua corrispondente semiordinata. Laonde il nostro prob ema si potrà nitidamente costruire colla combinazione della paravola e del circolo, cioè della equazione seconda e terza.

# Altra soluzione dello stesso caso I.

§ 8 Anal. L'angolo ABC è dato dall'ipotesi; L'altro DBA n'è dato eziandio a cagione dei punti dati A, e D. Sarà dunque dato l'angolo DBC di loro somma: e quindi CBL conseguente di questo (intendendosi la retta DB prodotta verso L).

Di più essendo dato l'angolo DBC come si è veduto, ed essendo pur anche dato l'altro DBE, (imperciocchè è dato dall'ipotesi il segmento DBE) sarà dato l'angolo EBC

di lor differenza.

Per la qual cosa essendo dati i due angoli CBL, CBE, e dovendo essere la retta CB uguale alla data M, sarà dato di posizione il punto C rispetto ai lati DB, BE dell'angolo DBE dato. Onde il medessimo problema ridurrassi a quest' altro di cui avvene egregie soluzioni: Dato il punto C suori l'angolo dato DBE, tirare per esso la retta CED, sicchè la parte di questa DE, che resta fra le gambe del dato angolo, sia di una data lunghezza.

# Terza soluzione dello stesso caso I

Anal. Si meni AT perpendicolare su di DE, ed A2M, che saccia colla medesima DE l'angolo A2MO uguale al dato X. Ciò satto sarà  $\triangle A2MO \sim \triangle OBC$ , e perciò A2M:BC::O2M:OB::AO×O2M:AO×OB (DO×OE). Sia intanto

124 W

Onde dovendo esser dalle condizioni AT= far**à** del problema D0 = b - xDE=5

AOXO2M:DOXOE::A2M:BC EO = x

 $TE=c O_2M=g-x$ 

 $AO = \sqrt{(a^2 + (c - x)^2)^2 + (g - x)} \sqrt{(a^2 + (c - x)^2)} = bx - x^2$ 

 $A_2M=e$  $DO \times OE = bx - x^2$ 

BC = f

Or facendosi  $\frac{c^3}{(a-x)^2} = a^2 + (c-x)^2$ , ne verrà  $gy - xy = bx - x^2.$ 

Di siffatte equazioni locali la prima si appartiene alla iperbole scalena, e l'altra alla iperbole rapportata agli alintoti.

# Soluzione del II cafo.

§ 9 La retta DE non incontri il circolo dato NBA. Si num. 2 calino dal centro Q, e dal punto dato N le perpendicolari QR, NP sulla medesima DE: e congiunta la retta CQ, si tiri per C la tangente CS. Giò posto sia

NP=a farà  $QC'=b'+x^2$ E dovendo essere per la natura del cerchio C S' = b' + x' - g'QR = bNC×CB=CS', farà  $fV(a^2+(c+x)^2)=b^2+x^2-g^2$ CR = xCP = c + x

QS = gCN = V(a' + (c+x)')

R = c $NC \times CB = f(a^2 + (c+x)^2)$ BC=f

6 10 Avv. 1 Questa equazione si potrà costruire collo stesso artifizio del I caso n. 1: e di questo caso si potrà ben anche recare altra soluzione seguendo le tracce della terza del caso I.

f 11 Avv. 2 Non si è stimato convenevol cosa qui rapportar minutamente le diverse posizioni, che può avere la retta BC rispetto al circolo, e quindi proporzionare a ciascun caso altra soluzione: poichè gli si posson facilmente adattare quelle quassù esposte con picciol divario, che ben tosto si offre a chi ne imprende lo scioglimento.

# PORISMA III

§ 12 Dati i due circoli ZLN, BLA, e'l punto A nella T. 1X periferia di questo, adattare tra le dette periferie la retta Fig. 3 BC, che sia uguale ad M, e congiunta AB sia l'angolo ABC uguale al dato angolo rettilineo X.

Siassi ottenuto l'intento. Si prolunghi C B sinchè incontri la periseria LA in E: si unisca il centro D del circolo BLA col punto E per mezzo della retta DE, la quale sarà data di grandezza come raggio del circolo BLA e di posizione, perchè l'angolo ABE dalle condizioni del problema dee pareggiare il dato X: e quindi essendo dato un termine A di quell'arco, su di cui dee poggiare, sarà dato eziandio l'altro E. Si meni dal punto D la retta DU perpendicolare su di EB, da C la retta CF perpendicolare su di ED, e sulla stessa ED prolungata verso K si cali TS perpendicolare dal centro T del circolo NLZ. Ciò posto, sia

TK=a faranno CF= $\sqrt{(a^2-(b+n)^2)-r}$ =y-r pel circolo TS=r EC= $\sqrt{(x^2+(y-r)^2)}$  ZLN.

S E=b

ED=c e quindi pei triangoli fimili ECF, EDV, CB=m effendo EC: EF:: ED: EV

S D= ; P E F= x

farà E V=
$$\frac{cx}{\sqrt{(x^2+(y-r)^2)}}$$

ed EB = 
$$\frac{2c\pi}{\sqrt{(x^2+(y-r)^2)}}$$

Ma l'intera EB è uguale ad EC+CB; sarà dunque  $\frac{2cx}{\sqrt{(x^2+(y-r)^2)}} = \sqrt{(x^2+(y-r)^2)+m}, \text{ cioè adoperando}$ 

le dovute contrazioni, e ponendo  $a^2-b^2-2bx-x^2$  per  $y^4$ ,

avraffi 
$$\frac{2c\pi}{V(a'+r'-b'-2bx-2ry)}$$
  $V(a'+r'-b'-2bx-2ry)+m$ 

Facciasi impertanto  $a^{n+r-b}=f^{n}$ , e si liberi tal equazione dalle frazioni,

farà  $2cx=f^2-2bn-2ry+mv(f^2-2bx-2ry)$ cioè  $2cx+2bn+2ry-f^2=mv(f^2-2bx-2ry)$ , cioè  $(px+2ry-f)=m^2(f^2-2bx-2ry)$ . Similmente adoperando le convenevoli riduzioni farà

$$\left(x + \frac{2rv}{r} + \frac{bm^2 - pf^*}{p^2}\right)^2 = \frac{m^2}{p^2} \left(f^2p^2 + b^2m^2 - 2bpf^2 + 2pry(2b - p)\right)$$

Quest'ultima equazione indeterminata si appartiene alla parabola, e l'altra  $y^2 = a^2 - (b+)^2$  n'è al cerchio dato. Laonde colla loro combinazione resterà nitidamente costrutto un tal problema.

Avv. Il metodo di ricavar le locali prima di ordinare l'equazione finale, farà distintamente esposto, quando avrò l'onore di comunicarvi una maniera facile da congegnar le dimostrazioni rigorosamente sintetiche a problemi solidi, che analiticamente risolvonsi.

# § 13 Indicare le leggi del metodo di conversione, onde risolvonsi i problemi di sito del I genere.

Si è detto da principio, che per isciorre tali problemi non abbiasi a sar altro che procurar di circoscrivere alla grandezza data quelle linee (entro cui si propone di adattarla) in modo che le conservino il sito addimandato, e sien quivi disposte come son date nel problema. Or questa circoscrizione otterrassi col seguente metodo.

I Si osservino diligentemente i luoghi, che nascono dalle posizioni di quelle linee, che alla grandezza data voglionsi circoscrivere. Ed essi saranno ordinariamente

rette, o archi di circoli.

II Si vegga di più, se per menare a fine questo problema converso basti determinare le sole sezioni dei mentovati luoghi: qual cosa non di rado addiviene nei

problemi facilissimi di tal genere.

III E se ciò non basti, ristettasi attentamente sulle posizioni delle linee proposte nel problema, perchè si riduca la soluzione del problema converso a situare in mezzo a due circoli, o ad una retta ed un circolo un'altra retta data con un dato sito.

Avv. Quanto qui si è detto astratamente ed in breve esposizione, sarà copiosamente chiarito da molti problemi, che in questa Dissertazione, e nella sua aggiunta si sono recati a tal uopo. Solo è mestiere distinguere tai problemi in due classi; cioè in quei che restano legittimamente sciolti colla sola intersezione dei mentovati luogni (i quali perche sacilissimi sono qui appresso lievemente trattati) e in questi altri che desiderano il designato adattamento.

Esemp.

T. IX § 14 Tirare al dato circolo NL una tangente, Fig. 4 sicchè quella parte di essa, ch'è fra i lati del dato angolo ROC rettilineo satto al suo centro, adegui la data retta M.

Soluzione I Su di ro uguale ad M facciasi il segmento reo capiente l'angolo dato RCO: e sarà l'arco reo luogo

dei vertici di tali angoli.

II Si tiri ce parallela ad rn, che da essa ne disti per CN raggio del dato circolo: e sarà tal parallela luogo dei centri dei circoli uguali al dato, cui è tangente la stessa ron.

E poichè il centro del dato circolo è lo stesso che il vertice dell'angolo dato, ei sarà senza dubbio uno dei punti c, ove la retta le incontra l'arco ver: e quindi sarà sciolto tal problema col metodo di conversione senza sar altro.

# PROBLEMA I

T. IX § 15 Date di posizione le tre rette ae, ad, cf che nè sieno tra fig. 2

s. 1e2 se parallele, nè convergano ad un medessmo punto, iscrivervi il triangolo EFD dato di spezie, e di grandezza; sicchè gli angoli E, F, D giacciano sulle rette ce, ci, ad respettivamente.

I Si descriva su del lato ED del triangolo EFD il segmento circolare EAD, che contenga l'angolo a.

II Si formi parimente sopra l'altro lato EF il segmento

EQCF, che in se comprenda gli angoli uguali ad ecf.

III Si tiri per lo punto E la segante ECA, talche la parte CA che resta fra gli archi dei segmenti costituiti adegui la data ca (porism. I).

IV In fine si conduca per C ed F la retta CF, e per A e D l'altra AD: conserveranno le tre rette AE, AD, CF una posizione identica alle tre date ae, ad, cf, e in esse

esse giacerà adattato il triangolo dato EFD giusta le condizioni del problema.

§ 16 Coroll. I Collo stesso artificio si scioglierà il seguente problema, adattare entro le medesime tre, rette date ae, ad, cf un'altra retta, che sia data di, grandezza, e di sola ragione i suoi segmenti tagliati dalle medesime.

ouest'altro, che sembra dissicilissimo: "date le due rette AD, Fig. 5 "BN terminate ne'punti D ed N, applicarvi il dato triangolo "ACB, sicchè gli angoli A, e B tocchino le date rette "AD, BN, e condotta per lo terzo angolo C la retta "FCM in maniera che i segmenti FC, CM sieno nella "data ragione di P ad R, in altra data ragione stia "FD ad MN ". Imperocchè dovendo essere allogato il punto C in una retta CQ data di posizione (1) converrà adattare il triangolo ABC, sicchè gli angoli A, B, e C giacciano respettivamente su delle rette date di posizione AD, BM, CQ: e quindi sissatto problema ridurrassi al di già esposito.

§ 18 Avv. Riuscendo difficil cosa conoscer le tracce d'invenzione, onde si era condotto l'immortale Isacco Newton a risolvere un tal problema (2); nè venendo queste in verun modo indicate da' di lui commentatori; mi son perciò presa la cura di mostrarne il metodo da tenersi non meno per la soluzione di esso, che di altri assini, ancorchè gli sieno di grado superiore.

<sup>(1)</sup> Lemm. 23. Newt. Princ. Mat. Phil. Nat.

<sup>(2)</sup> Lemm. 26. Princ. Mat. Phil. Nat.

### PROBL. II

T. IX § 19 Dato ovunque l'angolo rettilineo CNO, e'l circolo FAQ, condurgli la tangente ACO, ficchè CO parte di essa che vien tagliata da' lati del dato angolo, pareggi la data retta M.

I S'intenda convertirsi un tal problema: e quindi su di co uguale ad M si costituisca il segmento opne, che comprenda gli angoli uguali al dato ONC. Sarà l'arco opne luogo de' vertici degli angoli uguali ad N.

II Si tiri fp parallela ad ac, distante dalla medesima per una retta uguale al raggio FA: saranno in essa allogati i centri degl'infiniti circoli uguali ad FAQ, dei quali

ciascuno tocchi la retta ac.

III Si applichi tra la retta fp, e l'arco pnc la retta nf, che fia uguale ad NF, e che faccia colla congiunta cn

l'angolo cnf uguale a CNF dato (poris. 2.)

IV Finalmente si unisca no, e col centro f intervallo fa uguale ad FA si descriva il circolo faq: saranno le due rette no, nc similmente tra se inclinate, che le due date NO, NC: sarà di più la posizione che le due prime serbano al circolo aq la stessa di quella, che NO, ed NC conservano ad FAQ. Ed in sine essendo aco tangente del circolo saq uguale ad FAQ, ed essendo altresì co parte di essa compresa fra i lati on, cn uguale ad M, si sarà interamente sodissatto alle condizioni del proposto problema.

§ 20 Avv. Se il divisato principio di conversione si fusse offerto al Cavaliere Isacco Newton nel risolvere un tal problema (Aritm. Univers. Probl. 25); ei non sarebbe certamente imbattuto in quella lunga equazione, che quivi soggiunge, e che riesce molto malagevole non meno a costruirsi geometricamente, che a maneggiarsi in qualunque altro modo. Che anzi (essendo il punto N entro il circolo

FAQ) ne avrebbe rapportata la di lui soluzione a quella di un problema cardinale,, cioè di adattare entro un angolo, dato una retta data, che passi per un punto dato,, cui si studia ridurre non pochi problemi solidi nell'appendice della stessa Aritm. Univers. De Rquat. construct. linear.

#### PROBL. III

§ 21 Dato il circolo FAQ, e comunque fuori del suo centro T. X l'angolo rettilineo CNO, adattare dentro le gambe di esso Fig. 2 la retta CO uguale alla data M, sicchè tirata per C la tangente CA al dato circolo, sia l'angolo ACO uguale al dato X.

I S' intenda fatto l'angolo ACO uguale al dato X, e'l lato CO uguale alla data M, e si procuri di adattarvi il circolo AQG, e l'angolo rettilineo CNO, sicchè serbando fra loro quel sito onde son proposti, ottengano coll'angolo ACO la richiesta posizione. l'er ciò sare

II Sulla retta co uguale alla data M si formi il segmento circolare cno, che gli angoli ivi compresi adeguino il dato CNO: sarà l'arco cno il luogo de' vertici di tali angoli.

III Di poi si conduca la retta fl parallela al lato ac dell'angolo aco uguale ad X, che disti da esso per una retta uguale al raggio FA del dato circolo. E sarà tal parallela il luogo de' centri de' cerchi uguali ad FAQ, che tocchino tutti la retta ac.

Ciò posto, perchè il centro F del dato circolo ha una data distanza dal vertice N dell'angolo dato ONC, ed è data eziandio l'inclinazione della congiunta FN al lato NC; si ridurrà il proposto problema ad applicare tra la retta fl, e l'arco cno un'altra retta fn, che sia uguale alla data FN, e che l'angolo fnc pareggi il dato FNC. Cioè il presente problema non men che l'antecedente si ridurrà al poris. II.

§ 22 Cor. La stessa soluzione converrà praticare, se il triangolo dato COD vogliasi situare entro i lati dello stesso angolo CNO in maniera, che gli angoli C ed O stiano su de' lati CN, ed NO, e'l lato CD prolungato tocchi il circolo dato FAQ.

#### PROBL. IV

T. IX § 23 Dato l'angolo ACO, e il punto B fuori di esso, Fig. 7. applicarvi la retta OA uguale alla data M, sicchè congiunta BA, l'angolo BAO pareggi il dato X.

I Si formi l'angolo eab uguale ad X, e si tagli il lato oa uguale ad M.

II Di poi si costituisca su di ao il segmento circolare oca che comprenda degli angoli uguali al dato ACO: onde

l'arco oca sarà luogo de' vertici di tali angoli.

Vertice C dell'angolo dato ACO, e la medesima CB s'inclina a CO sotto un dato angolo; perciò applicata tra la retta ba e l'arco oca l'altra retta be uguale alla data BC, e che l'angolo och adegui OCB: sarà risoluto tal problema col ridursi al porisma II.

se mai il punto B giaccia dentro dell'angolo dato ACO: e più agevole ne riuscirà la soluzione del problema, se per avventura il dato punto B in ambi i casi giaccia a diritto del lato CO; qual' è il problema 13 proposto dal Cavalier

Newton.

## PROBL. V.

§ 25 Dato l'angolo rettilineo ADC, e dentro di esso il punto T. X R, adattarvi il quadrilineo nacq dato di grandezza, e di Fig. 3 spezie in modo che sottendendo ac l'angolo dato ADC, l'opposto lato nq passi per R.

I Si usi, come sovente abbiam satto, la prescritta Fig. 8 conversione, e perciò si descriva su di ac il segmento adc capiente l'angolo ADC: sarà l'arco adc luogo di quegli angoli infiniti che poggiando sulla medesima ac son tutti uguali al dato ADC.

II Si unisca DR, e si applichi in mezzo alla retta nq, e all'arco fdp un'altra retta che sia uguale a DR, e colla congiunta ad formi l'angolo adr uguale al dato ADR. Sarà questo problema ridotto al porisma II.

#### PROBL. VI

§ 25 Dati di posizione e grandezza i due circoli AS, BZ, T. X e di sito la retta FL giacente suori di essi circoli, trovare n. 1 in essa retta un punto, come T, donde le tangenti TA, TB menate ai medesimi cerchi e dalla stessa parte sormino insieme l'angolo ATB upuale al dato X.

I Si uniscano i centri O e Q per la retta OQ, e u. 1 e 2 dai medesimi si calino le perpendicolari ON, QL sulla retta FL: sarà dato di spezie e grandezza il quadrilineo ONLQ.

II Ciò posto si formi l'angolo atb uguale ad X, e si conduca oy parallela ad at distante per lo raggio OA dalla stessa ta; e pq parallela a tb, che dalla medesima ne disti per lo raggio BQ dell'altro circolo: sarà dato l'angolo y, e'l punto t dentro di esso.

III Si adatti finalmente il quadrilineo dato ONLQ nell'angolo oyq in maniera che il lato di esso oq sottentendo l'angolo dato y, il suo opposto nl passi per lo punto t dato

(probl. prec.)

IV Si descriva col centro o intervallo OA il circolo oas, e col centro q intervallo QB l'altro qbz: questi toccheranno respettivamente i lati ta, th del dato angolo t: e serbando sissatti circoli tra loro e con la retta nl quella stessa posizione ch'è tra i dati circoli OAS, BQZ, e la data retta NL, si sarà adeguatamente risoluto il proposto problema.

#### PROBL VII

T. X § 26 Dati di posizione il circolo OP, la retta LT, e'l punto N, applicarvi l'angolo dato X in guisa che il vertice di esso giaccia nella retta LT, un lato tocchi il circolo dato, e l'altro passi per lo punto N.

Fig. 5

A. 1 Si faccia l'angolo orn uguale ad X, e si tiri cq
parallela al lato or, distandogli per lo raggio OC del circolo
dato. Sarà questa parallela il luogo degl'infiniti centri di
quei cerchi, che di grandezza sono uguali al dato, e toccan
tutti esso lato or.

II Si distenda en finche incontri cf in q: sarà dato

l'angolo q, e di posizione il punto r.

III Si unisca CN, e si calino CL, NT perpendicolari su di LT: onde sarà dato di grandezza e di spezie il

quadrilineo CLTN.

IV Finalmente si applichi tal quadrilineo all'angolo cqn in modo che CN sottenda esso angelo, e che il lato ad esso opposto LT passi per lo dato punto r, vale a dire come clin (probl. 6). Sarà tal problema risoluto come il precedente.

#### ROBL. VIII

6 27 Dato l'angolo rettilineo ACB, e'l punto D fuori di T. X esso, applicarvi in mezzo ai suoi lati una retta, come AB, Fig. 4 che sia uguale alla data M, e che unite le rette AD, BD sien queste in una data ragione.

I Si distenda ab uguale ad M, e sia l'arco ndq luogo Fig. 4 di quei punti, donde le rette condotte agli estremi a e b n. 1 e 2 della data retta ab sieno infra loro nella data ragione: qual luogo, come ogni Geometra ne avvisa, è un arco di cerchio.

II Si formi su di ab il segmento circolare ach che comprenda degli angoli uguali al dato ACB, farà il suo arco luogo dei vertici di tali angoli.

III Finalmente si adatti tra i due archi circolari abc, ndq la retta cd, che pareggi CD, e formi con ca l'angolo acd uguale al dato ACD, farà risoluto il proposto problema.

6 28 Cor. Allo stesso porisma III si rapporterebbe il seguente problema: "Dato l'angolo ACB, e'l punto D fuori di esso, adattarvi dentro i suoi lati la retta AB ugnale. ad M data, sicchè congiunte le rette DA, DB, l'angolo ADB sia dato "·

6 29 Avv. A questo stesso poris. III si riducono infiniti altri dissicilissimi problemi solidà, i quali saranno registrati nella continuazione di questa dissertazione congegnata dal Signor Don Annibale Giordano, giovanetto di sommo acume nell'inventare, tuttoche non abbia di sua età che soli tre lustri.

Abbozzare il metodo per risolvere i problemi Geometrici di sito e posizione che al secondo genere si appartengono.

§ 30 Allorchè una grandezza data di sola spezie vogliasi con un certo sito adattare tra più linee date di

posizione, si praticherà il seguente metodo.

I Si procurerà di circolcrivere alla grandezza data di specie le linee che le serbino il sito addimandato nel problema, e che quivi fra loro ottengano una posizione

timile a quella, onde in esso son proposte.

II Conosciutasi la ragione che serbano le parti di queste linee tagliate dalla grandezza che dentro di esse ne giace applicata, si saprà la ragione che dovranno avere gli analoghi segmenti delle linee date di potizione. Onde di leggieri conoscerassi il modo di adattare entro le linee date la grandezza data di specie.

#### PROBL.

T. XI 5 31 Date di posizione le quattro rette AB, AD, dB, Fig. 1 Gi applicarvi un quadrilineo simile a FGHI, sicchè gli angoli F, G, H, I giacciano su di esse respettivamente.

I Facciasi su di FG il segmento FaKG capiente l'angolo dato BAD: su di FH il segmento FbKH comprendente gli angoli uguali a DBC: e finalmente su di FI l'altro segmento FcnI che comprenda gli angoli uguali al dato C.

II Ciò posto s'intenda tirata dal punto F la retta Fc, i di cui segmenti ab, bc tagliati dagli archi dei tre descritti circoli sieno fra loro come AB a BC. E questo otterrassi col seguente metodo. Essendo dati i punti F e K ove si tagliano i due primi segmenti, sarà data la retta FK, e quindi tanto il segmento FaK, che l'altro FbK

FbK. Dunque il triangolo aKb è dato di specie: e perciò di ragione ab, e bK; ma eziandio è data la ragione di cb a ba: dunque sarà data la ragione di cb a bK, e quindi il triangolo cKb è ancor dato di specie: e perciò sarà dato l'angolo bcK. Per la qual cosa se sopra FK si sormi un segmento capiente un angolo uguale a bcK, che tagli l'arco FcK in un punto c: questo punto sarà il richiesto.

III Si tiri-dunque per c la retta Fc: ed indi si uniscano le rette Gad, Hbd, Ic, sarà la posizione di queste quattro rette Fac, Gad, Hbd, Ic simile a quella delle date

fAC, gAD, hBD, iC.

IV Finalmente si faccia ba ad aF così BA ad Af: di più da ad aG così DA ad Ag ec. e si uniscano i punti f, g, h, i per mezzo delle rette fg, gh, bi, if: sarà il quadrilineo fghi simile ad FGHI, ed applicato in mezzo alle linee date nella maniera richiesta.

§ 32 Avv. Questo probl. è proposto dall'ill. Cav. Nevvton nel Lemm. 28. Princip. Mathem. Phil. Nat.

# PROBL. II

§ 33 Date di posizione le due rette LN, LM, e'l punto P T. X fuori di esse, menare alle sottoposte rette due altre PM, Fig. 7 PN, che saccian seco un angolo uguale ad un dato, e sieno tra loro in una data ragione.

I Facciasi l'angolo FAG uguale al dato e che i suoi

lati sieno nella data ragione.

II Si unisca la retta PL, e si descriva su di AF il segmento AKF, che comprenda angoli uguali a PLM e su di FG (retta che unisce i punti F, G) l'altro segmento FHG i di cui angoli ivi compresi adeguino MLN.

III Si tiri la retta EA, e troncata AB uguale a PL fi menino BD, BC parallele ad EF, EG, e si tiri DC.

IV Si taglino finalmente LM, LN respettivamente uguali a BD, BC, e si uniscano PM, PN: saranno queste

nella data ragione e comprenderanno l'angolo dato.

6 34 Cor. Che se poste le medesime cose di questo problema, si voglian tirare dal dato punto P suori l'angolo NLM le due rette PM, PN, che faccian tra loro un dato angolo, e congiunta NM il triangolo MPN stia alla somma dei quadrati di PM, e di PN come R a T, ne riuscirà agevole la foluzione di questo altro problema colla seguente

analisi geometrica.

S' intenda prolungata NP in m, ficchè sia Pm = PM. E perchè il rettangolo mPN sta al triangolo MPN a cagion dell'angolo dato MPN in una costante ragione, cioè di una qualunque retta S alla retta R, e come R a T così dee stare il triangolo MPN alla somma dei quadrati di mP. e di PN; farà per uguaglianza ordinara mPN: mP+PN:: S:T. e quindi 2mPN: Pm+PN:: 2S: T, ed invertendo e componendo mN': 2mPN:: T+2S:2S: farà dunque data la ragione di mN a PQ: e quindi la ragione di mP, ovvero di MP a PN: e perciò questo problema si ridurrà al precedente.

# SER SER LESS SEED.

## VIII

# CONTINUAZIONE DEL MEDESIMO ARGOMENTO DI DON ANNIBALE NICCOLÒ GIORDANO

DIOTTAJANO

Recitata nella R. Accad. nel 1786.

risolvere i problemi di sito e posizione, e che i metodi de' moderni analisti, o dell'antica analisi niun prositto lor sovente arrechino: imperciocchè i primi, essendo manchevoli del calcolo de' siti, sono allo scioglimento di tai problemi interamente disadatti: e gli altri che consistono nella sola specolazione di quelle conseguenze che discendono dal satto, il più delle volte ci avviluppano in un laberinto di maggiori dissicoltà. Un tal disetto volendo l'acutissimo Leibnitz torre dalla nostra algebra, pensò d'istituire il calcolo delle posizioni ch'ei disse analisi de' siti, e di regolarne il maneggio, perchè essa utilmente e con sicurezza potesse impiegarsi per la soluzione dei problemi di tal genere. Ma i suoi pensieri su di ciò non surono, che soli tentativi: e'l dottiss. Cristiano Wolsio, che ampiamente ha esposto i di lui pensieri, non ci ha lasciato su di ciò, che poche definizioni: onde possiamo

dolerci tuttavia co' fommi analisti i Signori Eulero, e D' Alembert, che malgrado tanta luce sparsa dai moderni Geometri su di altri metodi, niun raggio ne pervenga alla Geometria de' siti.

Il Signor Don Niccolò Fergola esaminando per avventura l'indole dei problemi geometrici di sito, e ciò che ne ha mai sempre costituita la loro malagevolezza, si è sortunatamente imbattuto a ritrovare un metodo, che ne conduce ordinariamente ad una sicura ed elegante soluzione, o che questa si voglia guidare colla nostra algebra, o coll'analisi degli antichi Geometri. Egli ha voluto comunicarmi i suoi pensieri su tal metodo, e mi ha imposto che lo applicassi ad alcuni problemi di tal genere da esso datimi a tal uopo, e ad altri somiglianti, che mi sarebbero per avventura caduti in mente: stimando, che quanto più ampia si mostrasse l'applicazione del suo metodo ai problemi ovvii, tanto ei ne resterebbe vie più illustrato e commendata l'utilità che se ne raccoglie.

La stima, che ho sempre in me nutrita di questo Geometra, e le addotte ragioni mi hanno determinato di buon grado a questo scientifico lavoro; e mi è riuscito non solo illustrare l'orditura del di lui metodo, ma di sciogliere giusta le tracce di esso alquanti problemi dissicilissimi ad isnodarsi pe' metodi comunemente adottati: la qual cosa essendo riuscita di gradimento all'istesso Sig. Fergola, ha egli stimato convenevole, che si aggiunga alla sua Dissertazione come utile continuazione del medesimo argomento. Onde io mi reco a sommo onore presentarla a questa Real Assemblea, abbozzando il metodo rinvenuto dal medesimo Autore, e quanto vi si è da me soggiunto.

## Metodo del Signor Fergola.

Prima d'intraprendere la soluzione di un problema di sito, che, secondo si è sopra avvisato, riuscirebbe ardua ed inviluppata, fa mestieri trasformarne l'enunciazione; sicchè si riduca ad un altro affine, cui facilmente possa innestarsi l'analisi de moderni Geometri, o quella degli antichi. Queste trasformazioni, le di cui leggi saranno quaggiù rapportate, soglionsi dire dal medesimo Autore trassormazioni geometriche, a distinzione delle analitiche, che usiamo nella condotta de'nostri calcoli; ma convengono entrambe in ciò. che siccome mercè le analitiche trasformazioni una sormola ritenendo l'identico di lei valore riducesi ad un'altra più adattata al maneggio del calcolo, o alla pratica: così le geometriche non alterando l'indole del problema, o la natura della quistione, la riducono non pertanto ad una certa e pronta soluzione. Or egli per riuscire in questo intento distingue i problemi di sito e posizione in tre principali generi, regolandone diversamente le soluzioni. Al primo genere rapporta que' problemi, ove una grandezza data di spezie e di magnitudine vogliasi con un certo sito adattare fra più linee date di posizione. Al secondo quegli altri, ove la grandezza da adattarvisi non sia data che di spezie. Al terzo finalmente ascrive quei problemi, ove la grandezza da applicarsi abbia dati di sito e di ragione, o di sito e magnitudine fra se mescolati.

Giò premetto ecco la via, onde si dirige per risolvere i primi, che ho quì l'onore di commendare, riserbandomi in altra occasione d'indicarvi un metodo da me rinvenuto

per risolvere quei della terza classe.

Quando una grandezza data vuolsi adattare con un certo sito fra più linee date di posizione, si dovrà procurare di circonscrivere ad essa grandezza le medetime linee, che le serbassero il sito addimandato, e fosser quivi disposte come son date nel problema. Sissatto adattamento delle linee alle grandezza data suol chiamarsi dal nostro Autore Circonscrizione, e l'artissizio, onde trassormansi in simil guisa i problemi del primo genere, vien chiamato Principio di Conversione. Qual artissizio euristico non alterando punto nè la natura

del problema, come di per se comprendes, nè l'in dole della quistione, maraviglioramente la distriga: imper ciocchè praticate quelle poche leggi ch'ei stabilisce per ottenerne l'indicata circoscrizione, non solo si è in grado di risolvere un proposto problema, ma il più delle volte si riduce ad applicare una retta data fra due archi di circoli, o fra un arco, ed una retta che quivi ne giacesse con un dato sito. Ma quel che rende più elegante sissatto metodo, si è lo snodari una immensa quantità di dissicilissimi problemi con indicibile nitore e brevità; e quel che è più lodevole, ciascuno di essi si rimette ad un de' tre porismi stabiliti dal nostro Autore, ed egregiamente risoluti, de' quali soltanto ne rapporto il terzo con una soluzione dedotta dal medesimo principio di conversione, e condotta a sine coll'analisi geometrica degli antichi.

## Soluzione finterica del Porisma III.

T. XI Dati di sito, e di grandezza i due circoli FAH, BKT, e Fig. 3 il punto F allogato nella circonferenza di uno di essi, applicare tra i medesimi la data retta AB, sicchè unita FA, dato sia l'angolo FAB.

Si congiungano i centri C e D de' circoli dati per la retta CD, che si prolunghi in E. Si uniscano le rette AE, AH, che indesinitamente si protraggano verso X ed Y: e col centro B intervallo BD s'intenda descritto il cerchio DKR. Per esser dato l'angolo FAB, come altresi per la natura del circolo l'altro FAE, sarà dato l'angolo EAB di loro differenza; ma è fra di loro data la retta AB, e l'angolo EAH, ch'è retto: saranno dunque dati di posizione l'angolo EAH, e'l cerchio DKR: sono di più date le rette EH, HD. Dunque il proposto problema ridurrassi ad applicare tra l'angolo retto XAY la data retta EH, sicchè prolungata, se bisogni, incontrando il cerchio DKR, HD pareggi una data.

A tal uopo si cali da D su di AY il perpendicolo DN: e pe' triangoli simili AEH, HND sarà EH ad HD, così AH ad HN, ed ED ad AN, siecome HD ad HN, ed il quadrato di ED a quello di AN, così il quadrato di HD a quello di HN, e convertendo e permutando sarà il quadrato di ED a quello di HD, siecome la differenza dei quadrati di ED, e di AN stà al quadrato di DN; e quindi da AY tagliandosi AP uguale ad ED, e prolungandosi XA in Z, siechè AZ uguagli HD, sarà il quadrato di AP a quello di AZ, come la disserenza de' quadrati di AP e di AN al quadrato DN: appartiene adunque il punto D all'ellisse descritta eo' semiassi AP, AZ, la quale effettivamente costruendosi, le di lei intersezioni col circolo DKR determineranno le posizioni della retta ED, siechè sodissaccia alle condizioni del problema. C. B. R.

Corol. Prolunghifi AB in L, farà dato il punto L, giacchè è dato l'angolo FAB, e quindi il suo conseguente FAL. Riducesi dunque a questo porisma il problema di adattare fra le circonferenze de' circoli FAH, BKT la data retta AB, sicchè prolungata passi pel punto L situato in una di esse circonferenze.

## PROBL. I.

Date di posizione due lince rette ed una circolare, situare T.X un triangolo dato di spezie, e di grandezza in guisa che Fig. 2 gli angoli del medesone giacciano respettivamente su di esse lince.

Le rette XY, UZ, e il cerchio DR abbiano un dato fito, e fia da adattarfi il dato triangolo FHD, ficchè l'angolo F fia nella retta XY, l'altro H nella UZ, e l'angolo D nella circonferenza del cerchio DR.

Soluz. I Siafi il triangolo FAH adattato nel modo proposto; e le rette XY, UZ prolungate si uniscano in A.

2 Su di FH s'intenda costituita la porzione di cerchio FAH, che in se comprenda angoli uguali ad YAZ.

- Congiungasi il punto A coll'altro B centro del cerchio DR, e si concepisca descriversi col centro D intervallo DB il circolo BKT. E perchè la data porzione di circolo FAH poggia su di FH lato del dato triangolo FHD, e del cerchio BKT n'è D il centro, saranno dati di sito i due circoli FAH, BKT; ma fra le circonferenze de' medesimi trovasi adattata la data retia AB, sicchè l'angolo FAB è dato: e l'arco FAH è il luogo de punti A vertici degli angoli YAZ, i di cui lati AY, AZ continuamente paisano per F ed H: e'l cerchio BKT' è fimilmente il luogo dei punti B, centri dei circoli DR, che continuamente passano per D; ridurrassi il nostro problema, convertendosi le sue condizioni, a situare fra i circoli FAH, BKT, dati di fito, la data retta AB, sicche unita FA, l'angolo FAB pareggi un dato; e quindi risolverassi pel terzo porisma. C. B. F.
- Cor. 1 La medesima soluzione del problema ha luogo allorchè fra due rette, e la circonferenza di un cerchio, che fra di loro serbano un dato sito, vuolsi adattare una retta, le di cui porzioni, intercette fra queste linee, sieno date.
- Cor. 2 E quindi potrassi risolvere il seguente problema, ch'è assine al mat. 21 dei Princ. della Filosos. Nat. del Cav. Newton, cioè: Descrivere una trajettoria data di specie e di grandezza, di cui le date parti restino intercette sra un circolo e due rette date di sito.

#### PROB. II.

Dati di sito i due circoli GY, UK, e'l punto H, situare T. XII il dato angolo rettilineo TUZ in guisa, che il vertice U Fig. I sia nella circonferenza UK, il lato UT tocchi il cerchio GY, e l'altro UZ passi per H.

Soluz. 1 Si congiungano le rette HF, FD, HD: sarà il triangolo HFD dato di spezie e di grandezza.

2 Per F s'intenda condotta YFX parallela a TU lato

del dato angolo TUZ.

3 Finalmente col centro U ed intervallo UD si

concepisca descritto il cerchio DKR.

Essendo U il centro del circolo DKR luogo de'centri de' cerchi UK, che continuamente passano per UY; ed XY, ch'è il luogo de' centri de' circoli GQ che sempre toccano TU, distando dalla medesima TU pel raggio del dato circolo GQ: saranno date di posizione le rette XY,VZ e'l cerchio DKR. Ma il dato triangolo FHD trovasi allogato in modo, che gli angoli F, H, D giacciono respettivamente sulle mentovate linee: dunque dovrassi situare il dato triangolo FHD, sicchè gli angoli del medesimo F, H, D respettivamente tocchino le rette XY, VZ, e'l cerchio DKR, che fra di loro serbano un dato sito; il che eseguirassi pel problema antecedente. C. B. F.

Corol. Con un simile discorso potrassi rapportare al precedente problema il seguente: dati di sito e di grandezza tre circoli, situare fra i medesimi un dato angolo rettilineo, sicchè il vertice sia in uno di essi circoli, ed i lati tocchino respettivamente gli altri due.

#### PROB. III.

T. XI Deti di posizione l'angolo rettilineo TAK, e'il circolo PQ, allogare in modo la data porzione di circolo CED, che i punti F ed H dati nella sua base CD respettivamente giacciano sulle rette AT, AK, e l'arco CED tocchi il circolo PQ.

Soluz. I Si concepisca essersi la porzione di circolo CED situata secondo l'esposte condizioni; e della medesima il centro sia N.

2 Col centro N ed intervallo uguale alla somma dei raggi de' circoli CED, PEQ s' intenda descritto l'altro cerchio KBT: sarà questi il luogo di tutti i punti B centri dei circoli PQ che continuamente toccano l'altro CED.

3 Su di HF si costruitea la porzione di cerchio FAH, che in se comprenda angoli uguali a TAK: sarà l'arco FAH il luogo de' punti A vertici degli angoli TAK, i di cui lati AT, AK continuamente passano per F ed H.

Uniscasi finalmente BA, e sarà dato l'angolo BAF. Quindi perchè è dato il sito dei circoli FAH, KBT, e del punto F, e fra le circonserenze de' suddetti circoli trovasi adattata la data retta BA, sicchè è dato l'angolo FAB: il presente problema risolverassi pel porisma III. C. B. F.

Cor. 1 Similmente si potranno rapportare al medesimo porisma i due seguenti problemi. I Situare la data porzione di cerchio CED, sicchè i punti F, ed H, dati nella sua base CD, siano nelle rette AT, AK, e l'arco CED passi per un punto dato di posizione. Il Fra le gambe del TXI dato angolo rettilineo XAZ applicare una data retta AB, sicchè uniti i punti C, D, dati nella medesima coll'altro Q dato di sito, le rette CQ, DQ comprendano un dato angolo CQD, o pure sieno in una data ragione.

747 W

Corol. 2 Se poi la data porzione di circolo CED si debba collocare in modo, che giacendo i punti F ed H sulle rette AT, AK, l'arco DEC tocchi una retta data di sito, il problema riducesi al porisma I.

#### PROB. IV.

Dati di fito i tre circoli KM, YZ, NQ, adattare tra i T.XII medesimi il dato quadrilineo rettilineo ABCE in modo, che Fig. 2 il vertice A dell'angolo BAE sia nella circonferenza del cerchio KM, ed i lati BC, CE tocchino respettivamente i circoli YZ, QN.

Soluz. 1 Siasi il trapezio ABCF applicato secondo le condizioni del problema; e de'mentovati circoli i centri siano D, F, H, che si uniscano per le rette DF, FH, HD.

2 Per F ed H s'intendano condotte le rette XY, VZ respettivamente parallele a BC, e CE: saranno queste parallele i rispettivi luoghi de' punti F ed H centri dei circoli XY, QN, che sempre respettivamente toccano le rette BC, CE.

3 Si concepisca finalmente descriversi col centro D ed intervallo AD il cerchio DK, che sarà il luogo de' centri

D de' circoli KAM, che sempre passano per A.

Or etsendo date di sito le rette XY, VZ, e'l circolo DKR; e ritrovandosi il dato triangolo DFH situato in modo che gli angoli del medesimo F, H, D toccano respettivamente le sudette linee: il presente problema ridurrassi ad adattare il dato triangolo FHD fra le rette XY, VZ, e'l circolo DK dati di sito, sicchè gli angoli del medesimo F, H, D giacciano respettivamente su di esse linee; il che si eseguisce pel problema I.

Cerol. I Se d'uopo sia adattare il dato quadrilineo ABCE in modo che l'angolo A sia nella circonferenza del circolo KM, ed i lati BC, CE passino, prolungati (se bisogna) per due dati punti, o pure uno passi per un dato punto, e l'altro tocchi un dato circolo, la soluzione del problema si rapporterà ancora al porisma III.

Corol. 2 Che se poi poste le medesime cose del presente prob. IV o del suo Coroll. 1, in luogo del circolo KM, nella di cui circonferenza deesi ritrovare il punto A, si proponga una linea retta, rapporterassi il problema al

porisma II.

#### PROB. V.

T. XII Fig. 3

Dati di sito un circolo, ed una parabola conica, tirar loro una tangente comune.

Soluz. 1 Sia PQ la richiesta tangente del cerchio ZP, e della parabola AQ, che dati sono di posizione.

2 Nel vertice principale A della mentovata parabola, tirifi alla medesima la tangente AR, che incontri la QP prolungata, se bisogna, in R.

3 Si costruisca il semicircolo NKF sulla retta NF; che unisce il centro N del cerchio PZ col suoco F della

parabola.

4 Per N finalmente conducasi NS parallela a QPR, che incontri RF prolungata in S. E perchè dalla natura della parabola conica l'angolo FRP è retto, lo sarà ancora il suo uguale FSN; e quindi il punto S ritrovasi nella semicirconferenza NSF. Ma la SR dee pareggiare il raggio del circolo ZP, e la retta AR è data di posizione al pari del punto F: dunque si dovrà adattare sra la circonferenza del circolo NSF, e la retta AR data di posizione, una retta SR uguale al raggio del circolo ZP, che prolungata passi per F; il che si esegue pel porisma H. C. B. F.

149

Avvert. Questo problema, ancorché non sia di sito, vi si trassorma per la nota proprietà del suoco della parabola. I due seguenti ancorche alquanto particolari sono qui soggiunti per dimostrare l'uso molto esteso del porisma II.

#### PROB. VI.

Date di posizione la retta DE, e la parabola conica T.XII AQ, la di cui tangente nel vertice principale sia AR: Fig. 4 situare in guisa il dato triangolo RBC, che gli angoli del medesimo R, B giacendo sulle rette AR, DE, il lato CR prolungato, se bisogni, tocchi la data parabola.

Soluz. 1 Si concepisca ormai fituato il triangolo BRC fecondo le condizioni del problema.

2 Su di BR costituiscasi la porzione di cerchio BDR, che in se comprenda angoli uguali ad EDA; e si uniscano

le rette FR, FD.

Essendo adunque dato l'angolo EDA al pari della retta BR, sarà data la porzione di circolo BDR; ma è retto l'angolo FRQ, ed è dato l'altro CRB, dunque sarà dato tutto l'angolo FRB, e la retta FR di sito relativamente alla porzione di circolo BDR; quindi perchè è data la DF, e l'angolo BDF, il problema sarà risoluto, se pel porisma II fra la circonserenza del cerchio BDR e la retta RF si applichi la data retta DF, sicchè unita BD, sia dato l'angolo BDF. C. B. F.

#### PROB. VII.

T. XII Dati di posizione il circolo ZP, e la parabola conica AQ, Fig. 5 la di cui tangente nel vertice principale sia AR, rinvenire in questa un punto R, dal quale condotte all'una e all'altra curva le tangenti RP, RQ contengano queste un dato angolo PRQ.

Soluz. Siasi fatto, e per N centro del dato cerchio ZP tirisi alla tangente RP la parallela NS, la quale incontri FR prolungata in S. E perchè l'angolo FRQ è retto, ed è dato l'altro QRP, sarà dato eziandio l'angolo FRP di loro somma, come pure il suo uguale NSF, e la retta SR intercetta fralle parallele NS, RP: costruiscasi adunque su di NF la porzione di circolo NSF che in se comprenda angoli uguali al dato NSF, e saranno dati di posizione il circolo NSF, la retta AR, e l'apunto N; ma SR è data, come altresì l'angolo NSR, dunque il problema si può risolvere pel terzo porisma. C. B. F.

#### PROB. VIII.

T.XII Dall'angolo D del dato quadrate AQ, condurre al lato AB Fig. 6 prodotto verso G, la retta DFG, sicchè l'intercetta FG adegui una data.

Soluz. 1 Siasi condotta la DG, sicchè sodisfaccia alle condizioni del problema.

2 Al triangolo rettangolo FBG s'intenda circoscritto il circolo BGR.

3 Si unisca la diagonale BD, che prodotta incontri di nuovo il circolo in E.

4 Si congiunga il punto E coll'altro C, centro del circolo FBG, per la retta ECR, e unisca BR.

E perchè l'angolo DBA è semiretto, il sarà eziandio il suo uguale EBG, e con ciò l'angolo ECG retto; onde convertendosi le condizioni del problema, il medesimo ridurrassi ad adattare fra il dato semicircolo FBG, e il suo diametro FG prolungato verso D, la data retta DB, sicchè prolungata passi per E apice del mentovato semicerchio: cioè, perchè pe' triangoli simili DEC, REB sta DE:ER:: EC:EB, a rinvenire le due rette DE, BE reciproche alle due date ER, ed EC, e che abbiano una data disserenza DB, al qual principio ordinariamente riduconsi i problemi piani. C. B. F.

Corol. Che se fra i lati AB, AD prolungati si voglia situare una data retta, sicchè passi per D, con un simile

discorso si può pervenire alla soluzione.

#### PROB. IX.

Dato il rombo AQ, il di cui lato AB sia prodotto verso T. XII G, tirare dall' angolo D la retta DFG, sicchè FG sia Fig. 7 data.

Soluz. 1 Siafi fatto, ed al triangolo BFG s'intenda circoscritto il cerchio BFRG.

2 Congiunta la diagonale DB prolunghifi la medesima finchè di nuovo incontri il circolo in E.

3 Bisegato finalmente l'arco FRG in R, si uniscano

le rette FR, RE, RG.

Or effendo gli angoli FBG, FRG nguali a due retti, come altresì gli altri due FBA, FBG, sarà l'angolo FRG uguale all'altro ABF; ma è questo doppio dell'angolo ABD, o sia EBG, o pure ERG; dunque sarà l'angolo FRG doppio dell'altro ERG, onde la RE taglierà ad angoli retti ed in parti uguali la FG, e quindi attraverserà il centro: sarà perciò l'angolo EBR retto, ed il triangolo EDC simile all'altro EBR, onde DE: ER:: EC: EB,

ed il nostro problema ridurrassi a rinvenire le due rette DE BE reciproche alle date ER, EC, e che abbiano la data differenza DB. C. B. F.

Corol. 1 Coll'istesso metodo potrassi adattare fra i lati AB, AD prolungati una data retta in modo che passi

per Q.

T.XII Corol. 2 Si potrebbe similmente risolvere il seguente problema: fra le tangenti DM, DN del dato circolo MN adatture una data retta AB, sicchè sia ancora tangente del medesimo circolo. Costruiscasi infatti su di AB la porzione di circolo ADB, che in se comprenda angoli uguali al dato MDN. Per C tirifi HT parallela ad AB. Uniscasi CD, che incontri il cerchio di nuovo in F, e per F si cali su di HT il perpendicolo FG, che si prolunghi in E, ed uniscasi ED. E perchè l'angolo CDM adegua l'altro CDN, la CD bisegherà l'arco AFB in F, e la retta EFG, ch'è perpendicolare ad HT parallela ad AB. attraverserà il centro del circolo DBE, onde sarà l'angolo FDE retto, ed il triangolo FDE essendo simile all'altro FCG, farà FD: FE:: FG: FC, e quindi il problema ridurfassi a rinvenire le due rette CF, FD reciproche alle date FG. FE, e che costituiscano una data somma CD.

Avv. Non abbiamo stimato cosa sconvenevole rapportare le foluzioni degli antecedenti problemi VIII e IX, che servono a viepiù confermare l'utilità del metodo di conversione ne' problemi di sito, che alla prima classe si appartengono, giacchè con qualunque altro metodo, o si perviene ad una equazione di quarto grado, o bisogna ricorrere alla soluzione degli antichi rapportata da Pappo, come hanno fatto Ugenio, l'Hopital, Newton, e molti altri moderni Geometri.

Ma è pèr altro da avvertirsi, che ancorchè a sissatte soluzioni io ne sia stato condotto dal principio di conversione, pure di questo non è necessario fare uso nella composizione: T. XII imperocchè immediatamente si ravvisa doversi bisegare la F.6e7 diagonale BD in S e prolungare SB in F, siche il quadrato

#### - 143 UM

quadrato di SE sia uguale al quadrato di SD assieme col dato rettangolo REC.

#### PROB. X.

Condurre dal punto C al dato angolo FAD la retta CD, T. XI ficchè fatto l'angolo DBE uguale ad un dato, Fig. a fia data ED.

Soluz. Unita la retta AG, e costituita su di ED la porzione di circolo EBD, che in se comprenda angoli uguali al dato EBD, il problema immantinente riducesi a quest' altro: dato il segmento circolare EBD, rinvenire nella sua base ED indesinitamente prodotta un punto A, sicchè satti al medesimo gli angoli dati CAP, FAD, e tagliata la retta AC di una data lunghezza, ed unita DC, l'intersezione di questa con AF sia nell'arco EBD.

Facciasi adunque l'angolo NBA uguale all'altro BAN, e per C si conduca CO parallela a BN, e pe'triangoli simili BND, COD sarà DN: NB::DO:OC::DN+NB+AO: CO; se dunque si ponga CO=a, AO=b, ND=x, BN=y (giacchè il punto D si concepisce sisso, e l'angolo DNB è dato), sarà x:y::x+y+b:a, ed  $ax=y^2+xy+by$ , equazione all'iperbole. Ma il punto B deesi ritrovare nell'arco EBD, dunque il medesimo sarà determinato dall'intersezione del descritto segmento circolare, e dell'iperbole la di cui equazione si è rinvenuta. C. B. F.

#### PROB. XI

T. XII Date di posizione tre rette, ed una sezione conica, situare regione un trapezio dato di spezie in guisa, che gli angoli del medesimò giacciano respettivamente su di esse linee.

Sien date le tre rette FA, FD, GC, e la sezione conica PQ, e sia da adattarsi il quadrilineo BADC dato di spezie, sicchè gli angoli del medesimo A, D, C, B, tocchino respettivamente le rette FA, FD, GC, e la sezione conica PQ.

Soluz. 1 Si concepisca essersi ottenuto l'intento.

2 Uniscasi AC, e su di AD, ed AC si cottituiscano le porzioni di circolo AFD, AGC che sieno capienti degli angoli AFD, AGC.

3 Dai punti L, ed M, ne'quali le suddette porzioni di cerchio incontrano la retta AB, si conducano agli altri

F, e G le rette LF, MG.

Or perchè sono dati di spezie i segmenti circolari AFD, AGC, ed è data la ragione delle loro basi AD, AC, per essere il trapezio BADC eziandio dato di spezie, farà data la ragione de' raggi de' circoli AFD, AGJ; ma sono dati gli angoli DAL, CAM; dunque saranno parimente date di spezie le porzioni di cerchio AFL, AGM, e di sito To rette FL, GM. In oltre essendosi dimostrato, che sia data la ragione de raggi de circoli AFD, AGC, faranno date le ragioni delle rette AC, AL, AM; ma è data similmente la ragione delle rette AC, AB; dunque le rette AB, AM, AL sono in date ragioni, e perciò essendo date di posizione le rette FL, GM, il problema ridurrassi ad applicare stra le rette FA, FL, GM e la sezione conica PQ la retta AB, sieche le porzioni intercette AB, AM, AL sieno in date ragioni. Ma quando fra le rette FA, FL, GM si applica la BA, sicchè sieno le sue porzioni AL, AM, AB in date

ragioni, il punto B appartiene ad una retta data di posizione dunque l'intersezione di questa colla sezione conica PQ

determinerà il punto B. C. B. R.

Cor. 1 La foluzione del problema è l'istessa, se in luogo della sezione conica PQ si proponga una retta, o qualunque curva; imperocchè il punto B sarà sempre determinato dall'intersezione della proposta curva, e di quella retta data di posizione alla quale si appartiene il punto B, sicchè le rette AL, AM, AB sieno in date ragioni.

Cor. 2 Quindi si potrà risolvere il seguente problema ch'è analogo al 21.000 dei Princ. Mat. della Fil. Nat. di Newton Descrivere una trajettoria data di spezie, sicchè le parti della medesima date similmente di spezie restino intercette fra tre linee rette ed una curva date di sito e

posizione.

Corol. 3 Coll'istesso metodo si possono tirare dal dato T.XII punto P ai lati dell'an olo ACB, le rette PAP PB, sicchè Fig. 10 sieno in una data ragione, e contengano un dato angolo APB. Imperciocchè costituita su di AB la porzione di circolo ACB che passi per C, ed intersechi PA ovunque in E, unita CE, sarà questa data di posizione, e data la ragione di AP ad AE; onde per P condotta PD parallela a CE sarà DP a CE, come PA ad AE: essendo dunque data la ragione di PD a CE, sarà dato il punto E.

Avvert. Non essendomi riuscito risolvere il presente elegant ssimo problema pel metodo di conversione, ho stimato convenevole rapportarne una soluzione derivata da altro

principio.

:

## 157 W

# MEN DE DE DE DE DE LA COMENTA DE LA COMENTA

# IX.

# NUOVE RICERCHE SULLE RISOLUZIONI DEI PROBLEMI DI SITO

#### DEL SIGNOR FERGOLA

Presentata alla R. Accad. nel 1787.

I

O Uando nostra ragione non vale ad isciorre un problema 🖊 di sito nè coi principii di sopra esposti, nè cogli altri finora praticati, dee per ultimo saggio delle sue ricerche intimamente esaminare i dati e quesiti che in esso propongonsi: assinche le riesca rinvenire un lemma, che qual chiaro lume un agevole sentiero le mostri alla soluzione conducente. Quanti problemi, il cui nodo pareane più del Gordiano malagevole, sieno stati sissattamente risoluti, non è d'uopo quì ridire: nè a quanti altri fiafi pur recata nitida ed elegante soluzione. Convien solamente avvertire, che la facile investigazione di cotesti lemmi debbasi solo all'acume del geometra inventore esercitato a ponderare or la natura del problema propostogli, or le conseguenze dal fatto derivate. Le quali cose nella tela di un calcolo analitico, tuttochè maestrevolmente eseguito, o non appajono in verun modo, o a stento, e con ingegnosi ripieghi dall'analista talora fi rinvengono.

II Ma non è lo stabilimento de' lemmi quel solo mezzo, che di tali problemi or ci arrechi la soluzione,

or ce la renda più delle altre semplice ed elegante. Avvi altro metodo del tutto nuovo, che, se il mio desiderio non erra, sembrami molto proprio a risolvergli interamente, o a disporli perchè ricevan poi nitide soluzioni. Il Signor Don Annibale Giordano (perchè il progresso di questa invenzione io qui descriva) persuaso, che inutilmente imprendeasi la soluzione de' mentovati problemi, se non si Gussero prima a quella sintetica trassormazione sottoposti, di che sopra si è favellato, è tlato ancor egli solito di usarvi alcune trasposizioni ne' loro dati, e quesiti, che il più delle volte felicemente e senza stenti l'hanno guidato a fine. Le produzioni di, questo ingegnoso giovanetto, della cui amicizia son da quattro anni onorato, volli leggere più volte e ponderare; e mi avvisai ben tosto del fondamento di un semplicissimo metodo, della sua rettificazione, e de' vantaggi, che da esso trar si potrebbero. Ecco tal fondamento.

TXIII III Sien date di posizione le due linee GB, CA, e l' Fig. 1 punto P: tirata comunque da esso punto la retta PA, se volgasi l'angolo PAC, sicchè abbiasi dalla medesima RA descritto un angolo uguale al dato X, sarà dato alla sine di tal movimento il sito della linea mobile GA rispetto all'immobile CB.

Le linee date di posizione sien rette, e s'intersechino in C: si unisca la retta PC e'l triangolo CPA trasseriscasi nel sito cPa, quando la retta PA abbia col divisato moto rotatorio descritto l'angolo APa uguale al dato X. Ciò posto l'angolo CPA pareggia, o più tosto è identico all'altro ePa; adunque tolto da essi il comune CPa ne resta APa uguale a cPC. Ma l'angolo APa è uguale al dato X: dunque è ben anche dato l'angolo cPC. Ed essendo dati di grandezza sì l'angolo Pca, che la retta Pc, sarà dato di posizione il punto P rispetto alla linea retta ca.

Lo stesso ragionamento si potrà adoperare, quando la linea mobile CA sia una curva, o quando tali sieno tutte e due le linee GA, CB date di posizione.

IV Questo semplicissimo principio ci guida a risolvere agevolmente e con venustà que' problemi, ove propongasi a formare in un dato punto un angolo rettilineo uguale ad un dato, sicchè sia data una funzione de' suoi lati prodotti, finchè incontrino due linee date di sito. Imperciocchè aggirandosi un lato di esso angolo con quella delle linee date ch'ei tocca, finchè descriva un angolo uguale al dato, si ridurrà il problema a tirare da un punto dato a due linee date di sito una retta, le cui parti tagliate da quelle linee abbian data la proposta funzione. La qual cosa vedrassi chiaramente da quegli esempli, che in appresso sarano recati a tal uopo.

V Che se susse data una linea, e non già un punto, e quivi ne abbisognasse formar con certa legge angoli dati nella lor somma, o nella lor disserenza, o si proponessero altre simiglianti condizioni, sarà ben anche conducente al geometra trasserir di sito certe principali grandezze del problema propostogli, perchè qualc'e sentiero gli si additi, che sicuramente conduca alla soluzione. Ma per simili lavori richiedesi acume esercitato a conoscere, quali conseguenze dal sarto derivate valgano a risolvere il problema, e qual di esse rechi alla soluzione semplicità

e leggiadria.

VI Intanto quel vantaggio, che di qui traesi pe' prima problemi, è che i dati di tito e posizione sovente si trasmutino in quei di ragione, o di magnitudine: e quindi riduconsi all'impero della moderna analisi sissisti problemi, cui tal arte e ristica, perchè ssornita del calcolo de siti, parea non potersi adattare in verun modo. E gli altri problemi, di cui si è discorso nel § 5, quantunque in simil guisa maneggiati non ricevano pronta soluzione, si trassormano non per tanto in mille modi; onde si generano non pochi problemi assini, che differendo nella sola enunciazione convengono tutti e nel grado cui ascendono, e nel no o che comprendono. Or l'utile che quindi ancor derivane dal civisato metodo, è,

che riuscendo al geometra di sciogliere cotesto nodo in tui di essi ( qual cosa non di rado suol ottenersi ); egli avrà pur anche degli altri assini ottenute con tal mezzo compite soluzioni.

Ma prima che con esempli s'illustri quanto VII sin qu'i si è detto astrattamente, ho voluto dileguare un dubbio, che destandosi per avventura nella mente di chi fassi a considerar tali cose, gli darebbe a vedere disettoso cotesto metodo. L'idea del moto angolare, potrebbe egli dire, viene con questo modo ad inviluppare le semplicissime nozioni dell'esteso: o almeno la mecanica, scienza che sulla geometria or regge, servirà di guida alle geometriche investigazioni. Tali cose essendo strane, esser dee essenzialmente disettoso il metodo di già esposto. cotesto dubbio svanisce immantinente col solo ristettersi, che quel moto, onde si procurano tali soluzioni, non consiste, che in una sola trasposizione intellettuale di certe grandezze contenutefi nel problema: nè fi adotta dal geometra inventore ad altro fine, che per guida di sua ragione, sia nel rinvenire l'assoluta risoluzione del problema propostogli, sia nel disporlo, sicchè con altri metodi di poi l'ottenga. Ed appena, che un tale intento avrà egli conseguito, potrà maestrevolmente occultar quel moto angolare: servendosi nell'analisi e nella composizione degli ovvii artificii di geometria, cioè di formar qualche angolo dato ad un dato punto di una retta; di tirar rette con qualche sito ec. Laonde non dipendono le proprietà dell'esteso dalle leggi del moto, nè adottandosi il divisato movimento, che a solo fine di ordire le composizioni e dimostrazioni geometriche, non potrà dirsi, che la scienza del moto serva a quella dell' esteso.

VIII Il primo esempio, onde può chiaramente conoscersi T.XIII quanto ai problemi di sito e posizione conferissero i lemmi Fig. 2 rilevati dai loro Dati e Quesiti, è la soluzione sintetica che il Sig. Castiglione negli Atti di Berlino anno 1777

recò al celebre problema di descrivere un triangolo rettilineo entro il circolo dato DGE, che i suoi lati distesi passassero per li tre punti dati A, B, C. Questo problema, tuttochè sia piano di sua natura, e dalla rapportata enunciazione sembri degno oggetto di giovane geometra, ha non pertanto esercitati gl'ingegni dei più sublimi analisti di Europa, i Sig. Cramer, Castiglion, de la Grange, Eulero, Lexel, Nicola Fuss. Vi si è pur anche occupato selicemente il nostro Signor Don Annibale Giordano, della di cui nitidissima soluzione eccone la breve istoria. Abbattendosi questo giovanetto a leggere negli Atti di Berlino sì nobil problema, e la sua malagevolezza quivi descrittane, sentì dentro di se una molla investigatrice del vero, che il premea a risolverlo. Egli secondò immantinente sì lodevoli impulii, onde pose a tal uopo ogni suo studio e penetrazione, adoperandovi non pure gli ovvii principii della nostra analisi ma quegli ancora degli antichi geometri, e quegli altri che furon commendati nella Dissert. VII. Ma sissatti tentativi gli riuscirono tutti vani, ed ogni verità che dallo sviluppo de' dati e quesiti gli si offeriva, la soluzione del problema maggiormente inviluppava. Quindi pieno di tristezza. che non di rado gli animi opprime curiosi del vero e delusi nel rinvenirlo, meco di ciò doleasi. E qual ripiego, ei mi dicea, potrà mai prendere un analista nel risolverlo? o qual verità può servirgli di filo che il guidi in laberinto sì intralciato? Mi sovvenne in tal rincontro dell'utilità dei lemmi ch'io più volte avea sperimentata per simili problemi: onde ciò indicandogli il diressi a leggere le collezioni di Pappo, dove avrebbe qualche lemma rinvenuto (ficcome al Castiglione era riuscito per risolver questo problema), che la cercata soluzione gli potrebbe agevolare. Tanto avvenne. Appena egli ebbe letto il seguente lemma che ne congegnò del proposto problema nitida soluzione. Evolendo poi ancor io saggiar l'efficacia dello stesso lemma in risolverlo, ne zinvenni la medesima soluzione del Sig. Giordano, che quì loggiungo.

TXIII IX LEMMA. Se dai termini A, e B della retta Fig. 2 data AB ad un punto E del circolo dato EDF si tirino le rette AE, BE, e condotta per D la retta DG parallela ad AB, si tiri GF che incontri AB in H: sarà dato di

posizione il punto H.

Imperocchè i due triangoli EAB, FHB hanno di comune l'angolo in B, ed hanno tra se uguali gli altri due DEA, FHB, perchè uguali al terzo DGF: dunque saranno equiangoli, e sarà BE: BA:: BH: BF. Laonde essendo il rettangolo ABH uguale al rettangolo EBF, o al quadrato della tangente da B condotta al circolo dato, sarà dato il

punto H.

Questo lemma di Pappo, su noto a Castiglione; ma non si vide da questo insigne geometra, che se congiungevasi il punto H col terzo punto C dei tre dati A, B, C, e si tirava DI parallela ad HC, la congiungente IG dovea passare per un punto dato della retta HC. Poichè compiendo due retti coll'angolo GID non meno l'angolo HLG, che l'altro DFG, sarà HLG=DFG=HFC: e quindi essendo equiangoli i triangoli GLH, FHC, sarà GH:HL::CH.HF, ed il rettangolo CHL uguaglierà il dato GHF: onde sarà dato il punto L.

Premessi questi due lemmi ecco il tipo di una semplicissima soluzione estesa dal Sig. Giordano ad altri dissicilissimi problemi recati nel Vol. IV della Società Italiana. L'angolo GDI adegua il dato CHB; dunque è ancor dato il suo duplo GMI, e ciascun degli uguali MGI, MIG alla base del triangolo MGI: onde sarà dato MGL conseguente di questo. Se dunque sopra ML sacciasi un segmento circolare capiente questo angolo, sarà determinato il punto G.

Avv. Questo secondo lemma è stato pur anche avvertito dal grande Eulero, come l'abbiamo rilevato dagli ultimi volumi dell'Accademia Petropolitana, che non ha guari son capitati fra noi. Ma il valentuomo si è servito di esso non ad altro scopo, che per agevolarne il calcolo analitico, col quale risolve il rapportato problema.

#### PROP. I. PROBL:

X Ritrovare un punto nell'arco circolare DNE, sicche per T.XIII esso condotta la tangente ANB in mezzo alle altre due Fig. 3 date DF, FE, sia dato il rettangolo ANB.

Per risolvere questo problema con eleganza, vuolsi premettere il seguente lemma, cioè che l'angolo ACB satto dalle due rette condotte dal centro C di esso arco agli estremi A, e B di ogni tangente AB, che arrestasi tra le altre due FD, FE, è sempre di una costante grandezza.

Si tirino a' contatti D ed E le rette DC, CE; faranno perfettamente ugu ili i due triangoli DCA, ACN: onde l'angolo DCA farà uguale all'altro ACN. Nella stessa guisa si mostra esser l'angolo NCB uguale all'altro BCE. Dunque sarà l'angolo ACB metà del dato DCE. Ciò premesso eccone una facile analitica soluzione.

Sia 
$$AB = 2x$$
  $NO = \sqrt{(n^2 - b^2)}$ ,  
 $CN = a$  farà  $AN = x - \sqrt{(n^2 - b^2)}$   
Il rett.  $ANB = b^2$   $NB = x + \sqrt{(x^2 - b^2)}$   
 $AC = \sqrt{(a^2 + 2x^2 - b^2 - 2x\sqrt{(x^2 - b^2)})}$   
 $CB = \sqrt{(a^2 + 2x^2 - b^2 + 2x\sqrt{(x^2 - b^2)})}$   
 $AC \times CB = \sqrt{((a^2 + 2x^2 - b^2)^2 - 4x^4 + 4b^2x^2)}$   
 $= \sqrt{((a^2 - b^2)^2 + 4a^2x^2)}$   
 $\triangle ACB = ax$ 

Or effendo dato l'angolo ACB, come si è mostrato, sarà data la ragione del rettangolo di AC in CB al triangolo ACB: onde ponendosi questa ragione uguale a quella di ma ad n, sarà

 $V((a^3-b^3)^2+4a^3x^3):ax::m:n$ , cioè  $(a^3-b^3)^2+4a^3x^3:a^3x^3::m^3:n^3$  e quindi

$$\frac{m^3a^3}{n^3}$$
  $x^3 = (a^2 - b^2) + 4a^3x^2$ , e finalmente  $x = \frac{a^3 - b^2}{a}$   $\sqrt{m^3 - 4n^3}$ 

Determinatasi in tal guisa l'ignota 2x, se su di questa si formi un segmento capiente l'angolo dato ACB, ed in esso poi si adatti la perpendicolare cn uguale al raggio del circolo, saranno i segmenti della sua corda respettivamente uguali alle tangenti AN, NB, ovvero alle altre AD, BE, e sarà quindi risoluto il problema.

#### PROP. II. PROBL.

T.XIII XI Dato il punto B fuori del triangolo TER, tirare la Fig. 4 retta BG, che dai lati TE, ER ne ascinda accanto la base le due parti TD, RG nella data ragione di m ad n.

Questo problema è risoluto distesamente nel libro de sectione rationis da Apollonio Pergeo, e per mezzo del seguente lemma può agevolmente snodarsi.

Lemma. Se nei lati TE, RE del triangolo TER prendansi le due parti TD, RG nella data ragione di m:n accanto la base RT, e nella stessa ragione prendasi pur anche DE ad EF, sarà l'intercetta GF o nulla, o di una

data grandezza.

Se la ragione di m ad n pareggi quella dei lati TE ad ER, l'intermedia FG sarà nulla, come dagli elementi piani può rilevarsi. Ma se la data ragione non adeguasse quella dei lati, facciasi TE ad RQ come m ad n. E poiché sta TE: RQ::m:n::TD:RG, sarà TE—TD: RQ—RG::m:n::DE:EF, cioè DE:GQ::DE:EF. E' quindi GQ=EF, e tolta da esse la comune FQ rimane GF uguale alla data EQ.

165 W

Ciò premesso discendiamo alla soluzione dei proposso problema. Suppongati tirata la BG come si addimanda nel medesimo problema, e prendasi DE ad EF come m ad n; sarà data di magnitudine l'intermedia FG, ed unita DF sarà dato l'angolo DFE. Si tirino finalmente per B le rette BA, BC rispettivamente parallele a DE, e DF.

E poiche sta AG: GE:: AB: ED:: AC: EF, sarà permutando AG: AC:: GE: EF, e dividendo CG: AC:: GF: EF. Hanno dunque le due rette ignote CG, EF per differenza CE+FG che è data, e son poi reciproche alle date AC, GF. Dunque è data ciascuna di esse CG, EF.

XII Avveri. Ma col principio di trasposizione si potrà risolvere il seguente problema assine a questo, che qui si è sinteticamente sciolto, cui niun altro metodo varrebbe ad isnodare.

#### PROP. III. PROBL.

XIII Dato il punto P fuori del triangolo CMN, condurre T.XIII per esso le due rette PB, PA, che quivi comprendano un Fig. x angolo rettilineo uguale ad X, e tolgano dai lati CM, CN le parti BM, AN accanto la base proporzionale alle date m ed n.

Si unisca la retta PC, e s'intenda il solo triangolo PAC volgersi con moto angolare intorno a P, finchè l'angolo descritto da PA ne pareggi il dato X, rimanendo immobili CM, e PB. Sarà dato di sito il punto P rispetto alla retta trasserita cn, (s III) e la retta mobile PA resterà adattata sull'immobile PB. Laonde riducesi il problema a tirare dal dato punto P una retta alle due date CM, cn, terminate nei punti M ed n, sicchè BM stia ad an nella ragione di m ad n. Lo che può ottenersi per il problema precedente. Giova intanto soggiungere la costruzione e dimostrazione di questo problema, perchè siane modello degli altri problemi assini che si potrebbero proporre.

XIV Coftr. 1 Facciasi al dato punto P della retta PC l'angolo CPc uguale al dato X, e Pc uguale alla data PC che dal punto dato all' intersezione delle rette date si conduce.

Si formi parimente all'estremo c della retta Pc l'angolo Pen uguale al dato PCN, e si tronchi en uguale a CN data.

3 Tirisi dal punto P la retta PB, che incontrando le due date CM, cn nei punti B, ed a, ne tolga le parti BM, an proporzionali ad m ed n (probl. prec.)

4 Finalmente si costruisca al punto P della retta PB

l'angolo APB uguale al dato X.

Saranno BM, AN nella data ragione di m ad n.

Dimostr. L'angolo CPc è uguale dalla costruzione ad APB: adunque aggiungendoti loro di comune l'altro CPB. n' emergerà l'angolo cPa uguale all'angolo CPA. Ma si è fatto eziandio l'angolo Pca uguale al dato PCA, e Pc uguale a PC. Sarà dunque (26 lib. 1 Elem.) ca uguale a CA: e quindi la rimanente an uguale alla rimanente AN, essendo pur anche uguali le intere en, CN. E poiché si è fatto per costruzione BM ad an nella ragione di m ad n, lo sarà ben anche in questa ragione BM ad AN. E' poi Pangolo BPA uguale ad X. Dunque dal punto P dato alle rette date CM, CN sono state condotte le altre due rette PB, PA come addimandavasi nel problema.

XV Avvert. Collo stesso artifizio si possono risolvere altri problemi affini, come per cagion di esempio formare al punto P dato un angolo APB dato, sicche estendendosi i suoi lati alle rette date di posizione CM, CN, sia data la somma di PB, e di PA, o la loro differenza, o il loro rettangolo, o altra di lor funzione. E sempre nella composizione potra occu tarsi, come si è qui sopra praticato,

il principio di trasposizione, o di rotazione.

## PROP. IV. PROBL.

XVI Dati di posizione i due punti A, e B, e la retta T.XIII DE, ritrovare in essa un punto C, sicchè condotte le rette Fig. 5 AC, CB, la differenza degli angoli ACD, BCE sia uguale ad X.

Si cali dal punto B la retta BE perpendicolare sulla data DE e'l triangolo rettangolo CBE si aggiri intorno al cateto CE, talchè l'ipotenuta, che prima giaceane al di sopra di esso cateto, ne resti poi al di sotto, come lo è il triangolo CE6. E si potragga AC, finchè incontri BE in F.

Ciò premesso eccone la breve analisi, che ad una

semplicissima risoluzione sintetica ne conduce.

I due angoli ACD, BCE son rispettivamente ugu ali agli altri due FCE, bCE: dunque la differenza di questi, cioè l'angolo FCb sarà uguale alla differenza di quelli, val quanto dire all'angolo dato X. Per la qual cosa sarà dato l'angolo FCb, e'l suo conseguente bCA. Se dunque il punto A dato colla retta Ab congiungasi coll'altro b, ch'è pur anche dato, e su di Ab si formi un segmento circolare capiente un angolo uguale al conseguente di X, l'arco di esso segnerà nella retta DE il punto cercato C.

• 

# 769 W

# SHE SHE AS A SHEET SHEET. SHEET, SHEE

DISSERTAZIONI DELLA II CLASSE.

# X

### OSSERVAZIONI FISICHE

CONCERNENTI L'ELETTRICITÀ, IL MAGNETISMO, E LA FOLGORE,

DEL PENSIONARIO D. GIUSEPPE SAVERIO POLI.

Letta nella R. A. l' anno 1784.

Er quanto agevole ed ovvia sembrar possa per avventura all'ignorante volgo l'investigazione delle cose naturali, non v'ha tuttavolta altr'oggetto, che sia più valevole di essa ad iscoraggiare i saggi, e prosondi indagatori delle opere della Natura. Ricca questa, e seconda di mezzi, onde eseguire le ammirabili, e variate sue operazioni, gelosa sempremai si addimostra per isvelarne gli arcani: l'uomo per lo contrario oltremodo curioso, ed avido di sapere, va rintracciando tutt' i modi possibili per indagarne le vie. Ciò non ostante però, è così misera la condizione di questo preteso dominator della Natura, che ad onta della perspicacia del suo ingegno, e de' più poderosi suoi ssorzi, rimane egli il più delle volte infelicemente deluso nelle sue premurose ricerche; rintracciando soventi fiate la spiegazione di nuovi effetti in qualche nuova immaginata, cagione; quandochè vengon quelli mirabilmente prodotti dal puro modificato lavoro di un' altra caula già nota. Non v'ha cosa, a parer mio, la quale faccia risplendere in modi meno equivoci i luminosi tratti di una sovrana Provvidenza, quanto la saggia, e prodigiosa economia, che scorgiamo campeggiar tutto, giorno nel general sistema dell' Universo. Quindi è, che i migliori, e più manifesti indizj, riguardanti lo sviluppo delle naturali operazioni, e conseguentemente le più interessanti scoperte in questo genere, lungi dal derivare da semplici intellettuali speculazioni, riguardar si debbono d'ordinario come risultati, e conseguenze di alcuni fatti, in cui la Natura, se così mi è permesso di dire, quasichè tradisse inavvedutamente se medesima, ci svela, a dispetto della sua gran ritrosìa, quei portentosi arcani, cui tanto si compiace di custodire. L'evidenza di una tal verità è si fortemente radicata negli animi di tutti coloro, i quali sparsi per ogni dove, costituiscono corpi di scientische Accademie, che non v'ha alcuna di codeste, la quale non vada in cerca di fatti di tal forta, riguardandoli come un prezioso deposito, onde potersi dedurre un giorno o l'altro, lumi, e verità, di grande importanza. E quantunque avvenga talvolta, che i fatti, di cui fi ragiona, sieno analoghi ad altri già pria conosciuti, nulladimeno però debbono eglino riguardarsi sempre come pregevoli, e nuovi, per ragione che attesa l'indole natia della induzione, mercè di cui da particolari cose ne ritragghiamo giudizi, e leggi generali, aggiungono sempre nuovi gradi di probabilità alle confeguenze, che fonoti per avventura dedotte da quelli. Ecco impertanto il motivo, che mi obbliga a proporre ai miei dotti Colleghi una serie di fatti interessantishmi, i quali avvalorati vie maggiormente da parecchi esperimenti decisivi, ci appalesano sensibilmente l'analogia, che si può per via di quelli francamente stabilire.

Alle due dopo il mezzogiorno, in uno de' più placidi, e più fereni di dell'estate, si misero unitamente alla vela due legni corrieri per valicare il picciol tratto dell'Oceano, che divide la Francia dall'Inghilterra. Il mare perfettamente transquillo, ed increspato soltanto dal sossio di un lieve

zeffiretto, prometteva ai naviganti un breve, e prospero: patlaggio. Erano essi già discosti dal lido intorno a due leghe, quando sorta una quantità prodigiosa di nubi da vari punti dell'orizzonte, incominciò a diffondersi irregolarmente nell'aria; nè tardò guari a soorgersi quella del tutto ingombrata. e coperta. Quindi quasichè un denso e fosco velo si fosse sparto in brevi istanti sulla faccia del cielo, imbrunissi egli immantinente; e cagionò un generale orribilissimo bujo. Incalzatosi poscia di mano in mano l'impeto del vento, o metsa in un terribile scompiglio la massa dell'atmosfera. incominciò: a venir giù una dirottissima pioggia, la quale accompagnata dalla furia, e dallo strepito dell'onde, non che da frequenti spaventosi baleni, dava motivo di timore agli animi più arditi, ed intrepidi. Volendo io respirar liberamente l'aria dell'atmosfera, affin di schivare il sensibilissimo instantaneo no umento, che mi si cagiona dallo stare in un picciol luogo ben chiuso, ove respirano molte persone, prefi il partito di abbandonar la camera destinata pei patfeggieri, e di preferire a quella un sito allo scoperto; ov' ebbi la bella opportunità di poter essere spettatore degl'importanti fenomeni, che costituiranno il soggetto di queito mio ragionamento.

Trattavasi allora in Inghilterra con sommo impegno la controversa suscitata dal Dottor Wilson relativamente all'elettriche spranghe; cioè a dire se dovessero quelle terminare in palla, siccome egli pretendeva, ovvero farsi aguzze, secondo il metodo inventato dal celebre Franklin. Or essendo i Capitani degli accennati due legni partigiani sorse della oppinione Frankliniana, gli aveano guerniti di conduttori aguzzi, i quali sissati sulla cima dell'albero di maestra, e conformati nel rimanente della loro lunghezza alla guisa di catene composte di vari anelli, andavano colle loro estremità inseriori ad immergersi entro al mare. Per la qual cosa il primo interessante senomeno, che mi riusci di osservare, su quello di vedere, sorse non altrimenti che su osservato

altra volta presso Batavia, che la materia sulminea tratta giù in gran copia dalla poderosa forza della punta aguzza del conduttore, collocato in cima all'albero del vascello, il quale, siccome ho detto dal bel principio, andava di conserva coll'altro, ov'era io imbarcato, propagavasi a soggia di un rapido torrente di vivissimo suoco, lungo la continuazione di quello; e quindi, giugnendo al mare, andavasi a disperder conseguentemente nella massa universale, nella guisa medesima che il suoco elettrico sviluppato col mezzo di una poderosa macchina, vedesi rapidamente scorrere tra gli anelli di una catena metallica, la quale pendendo dal primo conduttore, e distesa sopra del pavimento, vada a comunicare col dorso del cuscino, ond'è stropicciato il globo, il cilindro, o il disco che sia.

L'evidente poderosa efficacia delle riferite spranghe, la gran copia della materia fulminea, che diradandosi in ispaventosi baleni, minacciava di scoppiar con somma furia in ogn'istante, e l'essersi in una delle manovre spezzata in buona parte la catena, che formava il nostro conduttore, o per dir meglio il nostro filo di salute, destò in me un vivissimo timore, essendomi pur troppo noto, che l'elettrico torrente, scaricato da un'elettrica batteria, non riesce giammai così rovinoso, se non qualora incontra delle interruzioni in quelle materie, che gli servono di conduttori. La cosa in fatti non accadde altrimenti. Imperciocchè scorso appena l'intervallo di pochi minuti scagliossi una orrenda folgore, la quale tratta giù dalla spranga aguzza, collocata in cima allo spigone dell'albero di gabbia, diessi a seguire esattamente la direzione di quella. Ma poiche la catena, che gli era annessa, non giugneva fino al mare, per essere stata infranta in una delle manoure, siccome ho già fatto osservare; ne avvenne, che accumulatosi il torrente della materia fulminea nel termine dell'interrotto conduttore, e propriamente nel sito, ove il mentovato albero di gabbia andavasi a connettere col corrispondente albero di maestra; e trovando quivi l'ostacole

del catrame, ond'erano coperti gli alberi, e le sarte ( la qual materia per essere, siccome ognun sa, elettrica per natura, resiste poderosamente al suo passaggio); quasichè raddoppiaise il suo vigore, fece in quel luogo un guasto indicibile, svellendo con inudito impeto la testa di moro, ossa quel cerchio di ferro, mercè di cui si forma la stabil connessione de' mentovati due alberi; facendo crollar giù per conseguenza l'albero di gabbia; e riducendo la cima del sottoposto albero di maestra in mille picciolissimi minuzzoli. Dopo di che procedendo a discendere lungo l'albero stesso, ne distaccò di tratto in tratto alcune schegge considerabili, fece in vari siti delle grandi fenditure, e vi lasciò quasi da per tutto tali impressioni, che diramandosi irregolarmente da varj punti, e profondandosi dove più, dove meno, entro la sostanza dell'albero, andavano a cingerne interrottamente la superficie. La castagnola poi, ossia quel braccio di legname, che suole inchiodarsi verso il fondo dell'albero per dar volta a quel che dicesi dai marinaj manovra corrente, o vogliam dire a' capi di cordame movibili, fu del tutto svelta dal suo sito; e i chiodi, ond'era essa conficcata nel divisato albero, ugualmente che quelli del cerchio di ferro, che abbiam detto denominarsi testa di moro, essendo stati da me posti al cimento, non solo trovaronii tutti calamitati, ed atti ad attrarre colle loro punte alquanto abbronzite i minuti briccioli di ferro limato, ma contrassero generalmente la polarità boreale; dimodoche approssimati ad un ago magnetico sensibilistimo, traevano a se il polo australe di quello, e ne rispingevano l' opposto.

Or le cose sin qui dichiarate ci appalesano in primo luogo, e confermano ad evidenza l'oppinione già ricevuta; cioè a dire che le spranghe aguzze collocate in siti elevati sono essicacissime per trar giù dal cielo la materia sulminea; in secondo luogo, che questa materia incontrando la continuazione ne' conduttori, e questi andando ad immergersi

nell'acqua, o a profondarsi col loro capo inseriore entro materie non elettriche per natura, passa liberamente nella maisa universale, ossia nel seno della Terra, senza produrre alcuna l'utuosa catastrose nelle parti adjacenti a quelli; per esser cosa indubitata, che il bastimento di conserva, quantunque aveile attratta la materia fulminea in gran dovizia mercè la punta aguzza della spranga fissata sullo spigone del suo albero di gabbia, siccome appariva dall'infocato torrente, il quale vedeasi rapidamente scorrere lungo la catena, pure non soffri da quella il menomo danno. Si ricava in terzo luogo, che qualora i conduttori sieno interrotti, e specialmente qualora le interruzioni avvengano in siti, ove trovinsi materie elettriche per natura, la folgore suole scoppiare con furia inudita, ed apportare spaventevoli guasti, e luttuose rovine. E finalmente, che la folgore ha la proprietà di comunicare la virtù magnetica a que' pezzi di ferro, i quali son dotati della forma conveniente.

Che le punte aguzze sieno atte a trarre a se il suoco elettrico, siccome son valevoli ad attrarre dalle nubi la materia sulminea, è cosa ormai troppo triviale, e nota a chicchesia. Basta tener in mano una punta metallica in distanza di alcuni piedi da un conduttore elettrizzato, per trarre a se tutta la quantità di materia elettrica, ch'egli possiede: e se una tale operazione si pratica al bujo, si renderà sensibilissimo il suoco alla guisa di una stelletta luminosa, la quale vedrassi circondar vagamente la cima della verga metallica, che a se l'attrae.

Che l'elettrico torrente sia valevole a produrre, dal grande in picciolo, tutti quei guasti, che abbiam veduto essersi prodotti dalla folgore, qualora sieno interrotti i conduttori, su di cui vien egli scagliato; specialmente nel caso, che quel tal sito venga circondato da materie elettriche per natura, o vogliam dire da corpi non conduttori; e che nel caso contrario, cioè a dire quando il conduttore sia formato di una sostanza conveniente, e che scevro da qualunque

forta d'interrompimento costituisca una libera comunicazione colla massa universale della Terra, l'indicato elettrico suoco venga ad attraversarlo senza produrre alcun rovinoso essetto; senza rammentarne tanti altri si renderà manisestissimo dal

seguente sperimento.

Essendomi provveduto di due bastoni di legno, conformati a guisa di due piccioli alberi di nave, ne guernii uno con un pezzo di fil di ferro, il quale sporgendo alquanto in fuori dalla sua cima superiore, scendeva continuatamente fino al piede di quello. Presi quindi de'piccioli pezzetti di legno di pino, e gli andai disponendo in modo, col mezzo d'una spezie di massice, tutt'all'intorno del mentovato bassone, che lo rivestivano da capo a fondo. Al di sopra di tutto poi feci passare ripetute mani di densa vernice. Feci lo stesso parimente all'altro bassone; con questa disserenza però. che il fil di ferro, ossa il conduttore adattato fulla sua cima, in vece di essere perfettamente continuato, com'era nell'altro, sosse del tutto interrotto in distanza di mezzo piede da cotesta cima; di manierache dal termine di esso: fino al capo d'un altro pezzo di fil di ferro, che scorreva poi lungo la rimanente parte del baftone, si frapponeva l'intervallo di alcuni pollici. Disposte le cose in questa guisa, caricai a ribocco una grandissima batteria di 54 bottiglie, col mezzo della più poderofa macchina elettrica, che vi fosse in Londra ( oggi esistente nel Gabinetto del Cavalier Vivenzio); la quale fuol dar d'ordinario una scintilla della lunghezza di 12 pollici: Adattato poscia il capo inferiore del conduttore interrotto alla piastra metallica della batteria suddetta, mercè di cui istituivasi la comunicazione tra i fondi di tutte le bottiglie, ossia colla massa, ch'era nello stato negativo, trassus la terribil carica dell' intiera batteria fulla cima fuperiore dello stesso. interrotto conduttore. Udissi nell'istante un sensibile scroscio; avvegnaché quantunque l'elettrico torrente scagliatosi sulla cima dell'indicato conduttore, nel discendere giusta la

direzione di quello, avesse lasciata illesa la porzione superiore del battone fino al punto, che corrispondeva al termine del primo fil di ferro; tuttavolta però giunto che fu al sito del divisato interrompimento, squarciò con somma violenza i riferiti pezzetti di legno di pino, ond'erz circondato il bastone; ed infranto collo stesso vigore il masso del mastice. ond' erano quelli insieme congegnati, e connessi, gli slanciò tutt'all'intorno fino a distanze considerabili: indi diramatosi fullo strato di vernice, ond'era coperta la sottoposta parte del bastone, vi formò delle impressioni molto simili a quelle, che abbiam veduto essersi prodotte dalla folgore sulla superficie del mentovato albero di maestra. In quanto all'estremità del fil di ferro, ove l'interrompimento prendeva il suo principio, non si dovè durar satica a ravvisare di esser essa alquanto abbronzita tutt'all' intorno, e quasi fusa in qualche parte. D'altronde praticando io vari altri sperimenti di tal natura parecchi anni sono, mi riuscì più volte di struggere in modo il ferro, il rame, il piombo, ed altri simiglianti metalli, mercè d'una poderosa scarica elettrica, che aveano essi tutta l'apparenza d'essere stati convertiti in iscoria. talvolta in calce; ed altra fiata finalmente aveano tutti i contrassegni manifesti di essere stati vetrificati.

Avendo finalmente caricata di nuovo fino al grado indicato dianzi, l'elettrica batteria; ed avendo adattato nella maniera conveniente, e simile alla prima, il secondo bassone, il cui silo conduttore era del tutto scevro da qualunque interrompimento; comechè l'intiera scarica scagliata sulla cima di esso sosse passata giù lungo la direzione di quello, pure non vi produsse il menomo guasto; ma lasciandolo assatto illeso in tutta la sua lunghezza, andò a dissondersi liperamente entro la massa negativa. Questo stesso risultato ottiensi benanche, come è già noto, dall'elettrico apparecchio, a cui si dà la denominazione di Casa del sulmine, qualora il silo conduttore venga disposto in maniera, che presenti all'elettrica corrente un sentiero continuato.

Che la materia elettrica sia capace di comunicare ai serri aguzzi la virtù magnetica al par della solgore, niuno ignora rendersi ben manisesto dall'esperimento, che siegue. Prendasi un ago alquanto aguzzo in ambidue gli estremi, simigliante in qualche modo a quelli, che sogliono adattarsi sulle bussole; e messolo sullo scaricatore universale nella direzione della linea meridiana, si faccia attraversare più volte da una scarica della sopraccitata elettrica batteria. Se dopo di aver ciò satto, andrassi egli ad esaminare, si troverà di aver contratta la virtù magnetica, quasichè si sosse sopraccitato più volte con una calamita.

Or cade qui molto in acconcio di rammentar brevemente alcune particolari proprietà del fluido elettrico, riguardanti la virtù da esso posseduta di comunicare a' ferri il potere magnetico: le quali oltre all'essere interessanti per se medesime, aggiugneranno nel tempo stesso una gran forza all'intrapreso mio argomento, e serviranno di luminosa conserma dell'aggiustatezza, e rettitudine di questo mio

ragionare.

Trattandosi di calamitar degli aghi mercè di una poderosa scarica di fluido elettrico, egli è cosa quanto sicura, ed evidente, altrettanto degna di singolare osservazione, che posti essi al di sopra dello scaricatore nella direzione, come già si è detto, della linea meridiana, qualunque sia la via, che altri voglia far prendere alla scarica, che val quanto dire sia essa scagliata in modo, che venga obbligata ad attraversare l'ago dal nord andando al sud, oppure in parte contraria, costantissimamente succede, che la punta di esso, la quale nell'atto della scarica trovasi rivolta al settentrione, contrae la polarità boreale in preserenza della punta opposia. E se in vece di collocare cotesso ago. orizzontalmente, si faccia rimanere in posizion verticale, o che la scarica sia diretta da sù in giù, ovvero al contrario, immancabilmente accade, che la punta di tale ago, la quale mira la parte inferiore, ossa l'orizzonte, nell'atto della

fcarica, acquista in preferenza della punta superiore la polarità boreale. Le quali proprietà sono certamente. ficcome ognun vede, perfettamente analoghe a quelle, che veggiamo serbarsi dal natural magnetismo in questo nostro general sistema mondano; essendo cosa indubitata in primo luogo, che se una lamina metallica ben levigata si collochi al di sopra del meridiano; e nell'atto ch'essa giace in sissatta posizione, a stropicci più volte di seguito con una simile lamina di metallo armata, acquisterà la forza magnetica in brevi istanti; e quella parte di essa, che sarà rivolta al nord, troverassi di aver contratta la polarità boreale. Il quale effetto si otterrà similmente col sar rassreddare in una posizione corrispondente al meridiano magnetico una barra di ferro, che vi fia stata messa su nell'atto, ch' essa era del tutto arroventata. In secondo luogo egli è cosa costante, che una barra di ferro tenuta per qualche tempo in posizion verticale, viene a contrarre parimente la magnetica sorza, colla condizione inalterabile di veder sempre partecipata la polarità boreale a quella parte di essa, che trovasi rivolta verso il nadir. Essendo alcuni amici presso al cammino un giorno della scorsa settimana, seci loro osservare questo vago fenomeno; conciossiache prese in mano le mollette ( di cui sogliam far uso d'ordinario per rimuovere le legna, o i carboni), le quali tengonsi sospese, siccome ognun sa, in situazion verticale; ed approssimando i loro capi inferiori all'ago di una buisola, si vide sensibilmente, che il polo boreale dell'ago veniva notabilmente ributtato da quelli: ciocchè non ci dà luogo da poter dubitare di aver essi contratta la polarità boreale, e di averla contratta in una maniera del tutto analoga a quella, che abbiam veduto comunicarsi agli aghi col mezzo dell'elettricismo.

Vuolsi osservare in ultimo relativamente a questo soggette, che qualora il ferro sia stato con un mezzo qualunque privato del slogisto, di cui naturalmente abbonda, rendesi assatto incapace di contrarre la magnetica sorza per virtù

279 W

dell'elettricismo; nella guisa stessa, che l'ocra da serro scorgesi del tutto scevra della proprietà di poter essero attratta dalla calamita.

Giuata la folgore, dopo di aver prodotto i fin qui descritti rovinosi fenomeni, a piè dell'albero di maestra. slanciossi direttamente sulla chiesola della bussola, cui scardinò dalle sue fondamenta, e sciolse affatto nelle sue commessure. Lo scatolino della bussola stessa sostrì eziandio un grandissimo danno; conciossiache oltre all'essersi rotto il vetro, che lo copriva, e rovesciato lo scatolino stesso, la rosetta dei rombi rimale squarciata in più pezzi, come se si fosse fatto per via di colpi di un coltello; e l'ago magnetico sottoposto, svelto anch'esso dal suo cardine, e rovesciato suori delbussolino, scorgevasi di parte in parte leggermente abbronzito. V'ha qui però una cosa, la quale merita tutta l'attenzione, ed è, che avendo io preso meco cotesto ago tocco dalla folgore, ed a cui era ancora aderente una buona porzione della squarciata rosetta dei rombi, quantunque non avessi avuto l'agio di esaminarlo minutamente, se non dopo di essere scorso l'intervallo quasi di un mese, pure potei manisestamente scorgere, che per virtù della solgore, da cui era stato egli colpito, si era intieramento rovesciata la sua polarità; dimodochè messo in bilico su di un perno conveniente, la sua punta sottoposta al giglio rivolgeasi al lud, e l'estremità opposta conseguentemente riguardava il nord. Cosa, per altro, che la folgore ha avuto per costume di fare in altri avvenimenti di tal natura.

Neppur questo fenomeno è incapace di esser prodotto mercè dell'elettrico torrente. Come in fatti se si prenda un ago di bussola, a cui siesi comunicata la virtù magnetica col mezzo indicato di sopra (intendo dire coll'averlo fatto attraversare da una poderosa scarica elettrica nell'atto che giaceva nella posizione della linea meridiana); e dopo di averlo disposto sullo scaricatore in modo tale, che quella sua estremità, che in cotessa operazione trovavasi rivolta al

nord, sia in questa seconda diretta verso il sud; se dopo di ciò, io diceva, facciasi egli trapassare dall'elettrica corrente in qualunque delle già indicate direzioni, si vedrà fenz' alcun dubbio, che dopo di averlo fatto loggiacere alcune volte di seguito a questa sorta di cimento, la polarità si troverà rovesciata; cosicchè se cotesto ago sarà messo in bilico su di un perno, quell'estremità, che prima rivolgevasi al nord, ora dirigerassi al sud, e l'altra al polo Lo stesso effetto si otterrà ugualmente col rovesciar la posizione di un ago, la cui estremità inferiore aveile contratta la polarità boreale in virtù di una scarica elettrica nel modo indicato di sopra; e col farlo quindi trapaisar di bel nuovo da una simile poderosa corrente. E poiche sissatto cambiamento di polarità può prodursi in simil guisa col mezzo di una calamita, naturale, o artificiale che sia, stropicciandola cioè coll'ago in direzione contraria a quella, onde le si era prima partecipata la virtù magnetica; si scorge colla massima evidenza, che la virtù elettrica, l'efficacia della materia fulminea, e quella della calamita, sono tra esse del tutto analoghe su di questo particolare.

Prima di passar più oltre merita di esser rammentato in tal proposito, che le punte metalliche, onde soglionsi guernir d' ordinario le più elevate cime di parecchi edifizi, e che siccome ognun sa, ritrovansi il più delle volte fornite del potere magnetico, han potuto contrarre sissatta sorza, o per essetto della loro posizione, a tenor di ciò che si è fatto osservare poc'anzi, oppure per l'essicacia di qualche sulmine, che le abbia percosse. Il qual sulmine poi ed ha potuto esser tratto giù dalla punta issessa, e quindi obbligato a slanciarsi dalle nubi verso la Terra; ed è stato ben anche possibile, che sosse stato scagliato in su da cotesta punta, e quindi sorzato a slanciarsi dalla Terra verso le nubi, concordemente alla prodigiosa inalterabile proprietà, che hanno sissatte punte di trarre a se l'elettrico suoco, qualora vengano presentate ai corpi elettrizzati, e di

farlo scappar fuori, e disperderlo alla guisa di pennoncelli di variegata luce, ognorachè sieno elleno annesse a corpi elettrizzati. Verità atlai nota a parecchi degli antichi Filosofi, i quali davano la denominazione di fulmina inferna a quelli dell'ultima specie; e che viene in primo luogo fortemente fostenuta dalla ragione, la quale ci persuade, che ficcome dalle nubi, che sono nello stato positivo, sogliono fcagliarfi le folgori su i luoghi della Terra, che sono nello stato di difetto, così per necessità seguir dee, che qualora alcuni siti della Terra medesima sieno in istato positivo. forz'è che la materia fulminea sovrabbondante si slanci da quelli, e circoli fino a quelle nubi, le quali si trovano per avventura in istato contrario. Nel qual caso la solgore scagliar fi dee necessariamente dalla Terra verso il Cielo. Che poi il riferito stato di eccesso, oppur di disetto, venga ad alternare tra le nubi, e la Terra, a norma delle circostanze, è cosa che chiaramente risulta da un infinito numero di offervazioni, le quali apertamente dimoffrano, che le spranghe isolate, ma guernite nel tempo stesso di fili conduttori, talvolta ricevono il fuoco dalle nubi, e talvolta ad esse ne somministrano; fino ad indicare senza verun sallo quali sieno quelle nubi, che passando al di sopra delle spranghe, si ritrovano in istato positivo, e quali quelle altre, che sono nello stato di disetto.

Nella lunga serie di sperimenti intorno al naturale elettricismo da me praticati in Padova, egli è già parecchi anni, col mezzo di cervi volanti, che nel vernacolo nostro idioma dir sogliamo comete, ebbi soventi siate il piacere di vedere alternato cotesto cangiamento per più di dieci volte nello spazio di un quarto d'ora; conciossiachè approssimando una verga metallica ad una punta della stessa natura, che teneasi da me pendente a bella posta dal capo inferiore del cordellino dell'indicata cometa, ora vedeasi spiccar da quella uno splendentissimo vivace siocco di luce, ed ora cambiarsi cotesto in una picciola stelletta: chiarissimi indizi, siccome

ognun sa, del positivo, e negativo stato dell'elettriche atmosfere.

In secondo luogo la verità medesima appalesata ci viene tuttogiorno dall'ispezione oculare, la quale ci sa scorgere delle solgori, che uscendo dalla Terra, ovvero dal mare, scagliansi poi rapidamente verso il cielo. Questa osservazione appunto, che mi era riuscito di sare in altri casi, mi si presentò parimente in mezzo al surore della riserita tempesta, durante il cui scompiglio vidi due o tre volte sollevarsi in qualche distanza delle rapide solgori dal burrascoso seno dell'onde, e quindi prendere il corso a traverso dell'atmossera.

Dopo che la folgore produsse gl'indicati rovinosi essetti al di sopra della bussola, e della chiesola di quella, penetrò, immediatamente al di sotto della coperta, del bassimento; ed i senomeni quivi prodotti non surono nè in minor numero, nè di minore importanza. Il primo di questi si su, che essendosi la solgore imbattuta per cammino in un grosso involto di polvere da cannone della quantità di circa dieci libbre, il quale stava riposto sullo scassale di un picciolo stipo; dopo di averne spalancata impetuosamente la porta, svolse la carta, ov'era riposta la polvere, e sparsela non solamente al di sopra di tutto lo scassale, ma eziandio tutt'all'intorno al di suori dello stipo, senza che ne avesse acceso un sol granello.

Questo senomeno, il quale non può a meno di non sembrare stranissimo per ogni riguardo, è comune eziandio all'elettrico torrente. Imperciocchè se messa al di sopra di una carra, o altra cosa simigliante, una quantità di polvere da cannone, si faccia poscia attraversare dalla scarica di un'elettrica batteria; per quanto sia questa essicace, e poderosa, non farà altro, se non se sparpagliare i granelli di quella tutt'all'in:orno, come se sossero stati sossiati da

un lieve colpo di vento.

Io m' immagino, che siffatta stravaganza unicamente

derivi dalla rapidità immensa, onde vien la polvere attraversata sì dalla folgore, che dall'elettrico torrente; la qual rapidità fa sì, che nè l'uno, nè l'altra abbiano tempo sufficiente per poter eccitare la fiamma; essendo cosa indubitata, che la polvere non fi accende in un istante. Che sia così ne abbiamo delle pruove alla giornata, tutte le volte che si carica un'arma da fuoco con una quantità di polvere maggiore di quella, che si richiede; avvegnachè in tal caso scorgesi una certa quantità di essa sparsa per terra, alquanto al di là della bocca dell'arma divisata, ed affatto illesa dall'azione del fuoco. Non per questo però mancano melti esempi d'aver la folgore eccitata la fiamma nella polvere da sparo, siccome vi sono parimente de casi, in cui la polvere stessa vien prontamente accesa da un torrente di materia elettrica. Per ciò che riguarda l'accension della polvere cagionata dal fulmine, qualora mancaffero altri esempi, de' quali per altro ve n'ha un gran numero, basterebbe per tutti il caso lagrimevole avvenuto in Brescia pochi anni sono, ove essendosi accese dalla solgore alcune centinaja di barili di polvere, produsse quella uno scoppio così violento, che non solo sece crollar giù la maggior parte degli edifizj ivi esistenti, ma cagionò un moto sì impetuoso nell'aria, che su capace di rompere tutte le invetriate della corrispondente parte di un villaggio, che giaceva in distanza di alcune miglia dall' indicata città.

Così parimente per appiccar fuoco alla polvere col mezzo del fluido elettrico, basterà disporla sullo scaricatore, e sar sì che venga attraversata da un fil di serro, il cui diametro adegui presso a poco la quindicesima parte di una linea. Disposte così le cose, facendo passare la scarica della mentovata numerosa batteria lungo il divisato fil di serro, ne avversà, che questo sarà arroventato, e sciolto in tante picciole insocate palline, dal cui calore verrà la polvere accesa nell'istante. Si può ella accendere similmente qualora messa al di dentro di un cartoccio, dopo di essersi

alquanto pesta in finissimo polverino, le si facciano passare a traverso due fili metallici aguzzi, i quali vadansi ad incontrare nel mezzo di siffatto cartoccio per via delle loro punte. rimanendo quelle però in qualche picciola distatza l'una dall'altra; conciossiache una poderosa scarica elettrica, che facciasi scagliare tra coteste due punte, sarà ugualmente valevole ad eccitarvi la fiamma: e ciò forse non solamente per cagione che il fuoco elettrico si accumula, e si concentra nell'incontro di quelle, ma eziandio perchè strugge probabilmente, ed arroventa qualche minimo bricciolo di metallo. E' tale l'indole natia di codesto poderosissimo agente, che tanto regna, ed influisce nella produzione degli effetti naturali, che non eccita la fiamma se non se nelle sostanze, le quali abbondano di flogisto, ovvero in quelle, il cui principio infiammabile non si ritrova molto avviluppato in particelle acquose, saline, oppur di terrestre natura. Quindi ne addiviene, ch'egli abbrucia l'etere con una indicibile prontezza, laddove lo spirito di vino rettificato non vien da esso acceso, se non quando il principio infiammabile ne sia stato sprigionato in qualche modo con averlo fatto alquanto intiepidire presso al fuoco; od anche qualora lo spirito indicato sia notavilmente concentrato, e poderoso. Quindi accade parimente, che la polvere da schioppo rinchiusa nel modo già detto nel divisato apparecchio, si accende più sicuramente, e con iscariche meno poderose ( date però le altre cose uguali ), ognorachè sia stata essa preventivamente schiacciata, e conseguentemente sieno stati ridotti i suoi granelli in un finissimo polverino. Finalmente le materie resinose, dalle quali non si può ottenere, falvochè qualche lieve alterazione nella loro superficie collo slanciare contro di esse scariche impetuose, concepiscono immediatamente una vivacissima siamma tutte le volte, che ridotte in finissima polvere, e quindi applicate, e sparse nel modo conveniente su di bioccoli di cottone vengono prefentate all'azione dell'elettrico torrente.

Attele

Attese le quali considerazioni sono io molto inclinato. a credere, che la polvere da sparo non viene accesa dalla folgore, se non quando quest'ultima s' imbatte per cammino in qualche sottil punta metallica, la quale nell'attimo istesso, che vien da quella investita, si abbrucia, e si fonde; ovvero in qualche minuta scheggia di altre sostanze, le quali o per la copiosa quantità del flogisto, di cui trovansi naturalmente impregnate, o per essere quello (attesa l'indole particolare delle fostanze medesime) alquanto libero, e sprigionato, sieno atte a concepir la siamma in un istante impercettibile. Tanto vie più perchè costa da replicate, e diligenti offervazioni, che la folgore non altrimenti che il fluido elettrico, tende naturalmente, per effetto della sua prodigiosa violenza, a forzare il flogisto contenuto ne' corpia renderlo fommamente attivo, ed a bruciare con quello i corpi circonvicini, i quali sieno atti ad avvamparsi.

Sullo stesso scaffale, ove abbiam detto esser riposta. la polvere, eravi un gran vaso di majolica con entro una lieve quantità di foglie di nicoziana. Investito tal vaso dalla materia fulminea nel medesimo istante, in cui fu sparpagliata la polvere, soggiacque ad uno de' più strani, e più meravigliosi effetti, che per virtu della folgore siensi giammai prodotti. Immaginatevi di vederlo trasversalmente segato in direzione persettamente orizzontale in due uguali porzioni da una mano maestra, la quale avesse fatto uso di una finissima sega. E quel ch'è più mirabile, si è, che la metà superiore di cotesto vaso, intieramente distaccata. siccome ho detto, dall'altra metà di sotto, non si rimosse dal suo sito neppur di un capello, ma restò collocata su di quella in modo tale, che l'uomo il più veggente non avrebbe potuto accorgersi giammai di esserne ella del tutto disgiunta, così bene combaciavano tra di loro: nè alcuno de' marinaj l'avrebbe certamente avvertito, se uno di essi volendo raccorre la polvere da sparo, la quale a tenor di ciò, che si è satto notare poc'anzi, era stata slanciata, e

dispersa, parte entro allo stipo, e parte per terra, non si fosse avvisato di torre dal suo luogo il detto vaso, assin di

poter più comodamente eseguire le sue intenzioni.

Or per quanto straordinario, ed irregolare sembrar possa a taluno cotesto senomeno, puossi egli a mio credere comodamente ridurre alle leggi generali, onde scorgiamo esser mirabilmente governato tutto il sistema dell'Universo. E' cosa ben conosciuta ai saggi interpreti della Natura, che la quantità di moto generata ne' corpi, quantunque in ugual grado in parecchie circostanze, non è però atta sempre a produrre i medesimi effetti, variando la sua essicacia a norma de' casi. Il momento, che risulta, per esempio, da una massa enorme di materia fornita di una picciola velocità, non sarà certamente valevole a produrre quegli effetti, che sarà capace di cagionare una picciola quantità di materia dotata di una velocità sorprendente, comecchè fingasi per ipotesi che le quantità di moto sieno uguali in ambedue. I cotanto formidabili arieti degli antichi, i quali mossi a forza di mano, non poteano effer sospinti se non se con qualche forta di lentezza, possedeano l'essicacia limitata di scuoter soltanto, e quindi di abbatter le nemiche mura: laddove per lo contrario le picciole palle lanciate con indicibile velocità da' nostri pezzi di artiglieria, talchè scorrono talvolta lo spazio di mille, e più piedi nell'intervallo di un secondo, hanno la poderosa esticacia d'infrangere, é di trascorrer talora per lo traverso di un muro; la qual cosa non potrebbesi giammai eseguire in virtù di un colpo di ariete, quantunque il suo momento uguagliasse persettamente quello di una palla di cannone. Siccliè dunque a voler fanamente ragionare vuolfi conchiudere in generale, che date uguali quantità di moto, le gran maile di materia sono molto atte a scuotere col mezzo del loro urto, a differenza delle masse picciole, e leggiere, le quali essendo dotate di una grandissima velocità, sono piuttosto proprie a frangere, ed a forare. La ragione intrinseca di cossifiatto divario

rintracciar si dee unicamente in ciò, che urtando le masse grandi con una picciola celerità, trasfondono il loro moto alle particelle de' corpi, ch' essi urtano, in piccioli tratti successivi; dal che ne dee necessariamente avvenire, che cotesto moto andrassi a spandere tutt'all'intorno, e si andrà a comunicare eziandio in successivi tempi alle adjacenti particelle, cagionando in esse per conseguenza una spezie di tremore, più o meno confiderabile. Per lo contrario i piccioli corpi dotati di una estrema velocità, urtando in un ostacolo, che lor si presenta, comunicano alle parti di quello, con cui sono in contatto, tutta la quantità del moto, onde sono animati, in un solo istante impercettibile: e vincendo quindi in tal guisa la naturale aderenza di coteste particelle, le disgiungono, e portan via nell'atto medesimo da quel tal corpo, a cui appartengono, senza poter cagionare la menoma impressione, e'l menomo moto alle parti a quelle adjacenti, alle quali la rapidità immensa dell'urto vieta assolutamente, che si possa quello comunicare in menoma porzione. Or questa appunto a me sembra esser la vera cagione del rammenta meraviglioso fenomeno, prodotto dalla folgore nell'indicato vaso di majolica. Giunta essa in contatto col vaso, trattavi per avventura, e determinata ad investirlo, e segarlo trasversalmente, da una serie di particelle metalliche disposte in quella tal direzione (entrando esse, siccome è già noto, nella composizione di quella sorta di vernice, di cui soglionsi coprire sissatti vasi), si diè ad operar su di esso con una tale rapidità, e violenza, che esercitandovi la sua azione in un istante impercettibile, ne disgiunse, e portò via vigorosamente le parti, prima che il moto da essa indotto in quelle, si fosse potuto comunicare alle altre circonvicine: ond'è, che non avendo le medefime sofferta la menoma scossa, nè alcuna sorta d'impressione di tal natura, rimasero nel sito stesso, ov'erano naturalmente collocate, e per conseguenza la parte superiore del vaso sovrapposta all'inferiore, come se non fosse stata da quella

in conto alcuno disgiunta. E poiche non vienmi giammai talento di appigliarmi a mere conghietture nella spiegazione de' naturali fenomeni; per confermar pienamente il vero. e per render nel tempo stesso più che manisesta la sermezza della rapportata mia oppinione, ne trarrò una luminosissima pruova dagli esperimenti, che sieguono. Sospendasi un quinterno di carta liberamente ad un filo, talchè il suo piano riesca verticale: si adattino quindi contro i suoi lati due punte metalliche in posizione orizzontale, ed in modo, che quantunque giacciano ambedue nel medesimo piano, e ciascuna di esse riguardi la corrispondente faccia del detto quinterno, pure non le tocchino, ma rimangano in picciola distanza sì dall'una, che dall'altra. S'istituisca poscia la comunicazione tra sissatte punte, e le sacce contrarie d'una batteria assai poderosa. Or tutte le volte, che la medesima viensi a scaricare, sicchè il fluido elettrico ivi contenuto, per lanciarsi dall'una sull'altra punta venga obbligato a sassi strada pel quinterno di carta, ne avviene costantemente, che trapaffandolo egli con inudito impeto, e producendovi nel sito corrispondente alle due punte uno squarciamento notabile, non gli comunica il menomo grado di moto, ad onta della gran resistenza, che gli presenta la detta carta affaldellata in quel modo, e non ostante, che un sossio assai leggiero fosse capace di cagionarvi una sensibile agitazione. Scelgasi inoltre una banderuola liberamente girevole intorno al suo perno, simigliante a quelle, che soglionsi collocar di ordinario sulla cima di alcuni edifizi per indicar la direzione de' venti; ed abbiafi l'avvertenza di sceglierla tale, che la sua sostanza non sia oltremodo consistente; fia, per esempio, formata di latta di una mediocre spessezza. Se nell'atto ch'essa rimane del tutto ferma nella sua vertical posizione, le si scagli contro orizzontalmente una palla, la quale venga slanciata da una violenta carica di moschetto, fi scorgerà senza fallo, che cotesta palla formerà nel corpo della banderuola un notabil foro, e la trapasserà da parte

a parte senza spostarla neppur di un capello dalla situazione, in cui era, comecchè sia essa, siccome abbiam supposto, liberamente girevole intorno al suo perno. Or chi mai oserà di negare, che questi esempi sieno del tutto consormi al rapportato sorprendente avvenimento del vaso di majolica cagionato dal sulmine!

Per ritornar di bel nuovo agl'importanti fenomeni cagionati dalla folgore, uopo è ch'io rammenti, che in un angolo di quel picciolo recinto, ove trovossi riposta la polvere da sparo, eravi ancora un vaso con entro un picciolo arbuscello di tre in quattro piedi, denominato da Linneo Gleditsia triacanthos, per cagione di esser guernito di un triplice ordine di spine assillari. Era cotesta una pianta, cui uno de' passaggieri avea seco per indi traspiantarla nel suo giardino. Fu cosa mirabile l'osservare, che su essa penetrata in guisa tale dalla sorza del sulmine da cima a sondo, che non solamente caddero giù tutte le sue soglie, ma l'intera sostanza dell'albero su inaridita a segno, che la corteccia, e'l tronco, non altrimenti che il midollo, parevano come se sossero per sono come se sossero que del sulmine di un forno.

Un fenomeno simigliante erami riuscito di osservare, sono già alcuni anni, in Resina, e propriamente nel giardino del Signor Marchese di Corleto, ove un bell'albero di leccio, veduto il dì precedente dal giardiniere nello stato il più slorido, e verdeggiante, su rinvenuto nel dì seguente del tutto appassito, ed arido, per cagione d'un tempestoso nembo gravido di solgori, il quale avea dominato nell'aere suriosamente durante l'intero tratto della notte antecedente. La gente di campagna, sacendo uso della lingua vernacola, ha per costume di dire, che sissatti alberi sono stati allampati; imperciocchè realmente crede, che il divisato essetto venga unicamente originato dalla sorza dei baleni. Ognun concepisce però esser questa una oppinione del tutto irragionevole, ed erronea, altro non essendo il baleno se non se una manifestazione dello splendore, cagionato

dall' accenders, che sa la materia sulminea; cosichè sembra cosa da non doversi porre in dubbio, che questi, ed altri essetti di simigliante natura, debbonsi unicamente attribuire all' indicibile essicacia della solgore, la quale investendo da cima a sondo tutti gli otricelli, le sibre, e le altre minime parti, di cui l'albero è composto, ne succia, per così dire, ed assorbisce tutto il sugo nutritivo in quelle esistenti, e quindi le abbandona in uno stato di somma siccità, ed aridezza. Di fatti osservatosi da me nella sua parte interna il mentovato albero di leccio, si ritrovò inaridito a segno, che non poteva esserio di vantaggio, se sosse stato reciso, e quindi esposto al sole pel tratto di più anni, giacchè a tenore dell'informazione datami dal detto giardiniere, cotesta sorta di alberi è così tenace del proprio sugo, che si richiede un intervallo di tempo considerabile per sarlo disseccar persettamente.

L'osservazione di cotesti fatti mi fecero entrare in mente di sperimentare io stesso quali fossero sulle piante gli effetti di un poderoso elettrico torrente, cui la mia macchina ordinaria non aveami potuto giammai somministrare; e la prima, ch' io posi al cimento, su la Mirabilis Jalappa del Cavalier Linneo, ossia quella, che dicesi dai giardinieri Sposa di notte. Era essa ben vegeta, e fresca dentro di un vaso, e prossimi erano a sbucciare i siori. Caricai dunque ben bene la mentovata batteria di 54 bottiglie; indi adattai alla pianta già detta due capi di catena in modo tale, che la carica dell'intera batteria facendosi strada per uno de' suoi rami principali, sosse obbligata a trapassare prima per quello, e poi a scorrere lungo il tronco della medesima. Scaricata in fatti ripetutamente la batteria dopo di avere disposte le cose in questa guisa, su tale, e così sensibile la sua essicacia, che alcune soglie si distaccarono dalla pianta nel medesimo istante, altre si videro sbiosciare, e'l ramo percosso insiem col tronco principale piegaronsi immantinente, e poscia crollarono su'l terreno, avendo l'apparenza stessa, che soglion le piante presentare talvolta, qualora dopo di averle svelte dal proprio terreno, vengono adoperate a percuotere qualche corpo alla guisa di uno staffile.

Ripetei poscia lo stesso esperimento di mano in mano su'l Ricinus comunis, sull'Euphorbia Lathyris, e sull'Asclepias Syriaca, e ne ottenni da ciascheduna presso a poco i medesimi risultati.

Non contento di aver praticato i riferiti tentativi, volli un giorno porre al cimento una pianta fruticosa; e mi parve opportuno a tal uopo un tenero arbuscello di Siringa volgare. La preparazione fu fatta nella maniera medesima, onde ho detto essersi eseguita nel praticare gli esperimenti sulle piante rammentate dianzi. La carica fu così poderosa, che un istante prima di farle attraversar l'arboscello, incominciava già a far sentire i soliti piccioli continuati crepiti, o scoppietti. i quali indicar fogliono, che la carica è sì strabocchevole, ch'è molto prossima a volessi lanciar suori, ed a scaricarsi da se. Per la qual cosa non tardai un attimo a farla trascorrere da cima a fondo dell'accennata Siringa: e sebbene i rovinosi effetti non si appalesarono nell'istesso istante, com'era avvenuto nelle altre piante, nè furono così sensibili; tuttavolta però e la pianta, e le sue soglie, che soggiacquero più fiate al divisato cimento, dopo qualche ora incominciarono a comparire alquanto maltrattate, e dopo pochi giorni l'intiero albero andossi a sbiosciare, e quasi perì.

L'ultimo stadio trascorso dalla folgore su per gran ventura il meno tragico, e rovinoso, quantunque avuto riguardo alle sue circostanze, avrebbono dovuto aspettarsene essetti micidiali, e luttuosi; conciossiachè diè essa fine al suo rapido corso col passare a traverso del camerino, ov'erano radunati tutt'i passaggieri. Costoro però sì per cagion della burrasca, la quale non permetteva, che si passeggiasse dentro del bastimento, sì per motivo del sorte disturbo, che il continuo moto di quello cagionava nello stomaco, e nel capo, trovaronsi tutti a giacere al di sopra de' loro rispettivi letti, i quali

aila guisa di tante picciole alcove erano ordinatamente disposti a diritta, e a sinistra. Il passaggio del sulmine, che nell'entrare spalancò impetuosamente la porta, sece sì che ognuno di essi s'immaginò in quel punto, che si sosse dato alle siamme l'intiero corpo del bassimento: tutti però ne rimasero essenzialmente illesi. Intendo dire con ciò, che coloro i quali giacevano su i letti della diritta, non ne risentirono la menoma sensazione, e la maggior parte di quegli altri, che erano collocati su i letti opposti, risentirono soltanto delle sorti scosse nelle varie parti del corpo; avendole alcuni sentite nelle braccia, ed altri nelle membra inferiori; ed ognun sa esser questo uno de'più triviali essetti, che si suol produrre anche per gioco col mezzo della macchina elettrica.

Vuolsi però qui avvertire, che simiglianti scosse erano state antecedentemente eccitate non solamente in me, ma in due, o tre marinaj, che ritrovavansi su I bordo, allorchè la folgore discesa lungo l'albero di maestra, lanciossi rapidamente sulla chiesola della bussola. Che anzi reputo del tutto necessario il dichiarare, che la violenta scossa da me sentita non solo mi produsse l'istessissima sensazione d'una scossa elettrica; ma originò in me parimente quei medesimi identici effetti, che l'azione del thuido elettrico suole nella mia macchina immancabilmente produrre; cioè a dire un grave offuscamento di capo, un general disturbo in tutto il corpo, ed una notabile debolezza, la quale attacca principalmente le ginocchia, e lo stomaco. Questi senomeni produconsi in me ugualmente tutte le volte che mi ritrovo, anche come spettatore, in una stanza, che sia picciola, ed in cui si faccia attualmente travagliare una macchina poderosa. Ed è cosa veramente osservabile, che i divisati esfetti sono di gran lunga più sensibili qualora facendomi a girar la macchina io stesso, mi ritrovo per conseguenza in uno stato negativo. Il non aver badato a tutto ciò per un lungo tratto di anni, ne' quali ho fatto tanti e tanti esperimenti sull'elettricismo, mi ha fatto soffrire continue

continue nojose indisposizioni, la cui origine mi è sembrata ignora per lungo tempo. Dopo varie ricerche, e dopo di aver esposto altre persone del mio temperamento alle medesime circostanze senza prevenirle, ho rilevato, che i rammentati effetti, che in me si producono in virtù del sluido elettrico. iono ancora comuni a parecchi altri individui. E' questa una ci. costanza, la quale uopo è che si abbia presente alla memoria da autti coloro, i quali debbono amministrare l'elettricità per tentar la guarigione di parecchie malattie: cosa per altro, che per cifetto di proprio, e conveniente metodo, era andata affatto in cifuso, perchè realmente priva di buoni effetti, ma che ora, per essersi rintracciata partic larmente in Inghilterra, la giusta, e vera maniera di doverla amministrare, ha una riuscita così sicura, e felice in parecchi casi, che ha costituita la fortuna di coloro, i qu'li hanno saputo, e tuttavia sanno debitamente prevaleriene.

Per terminare il racconto degli effetti cagionati dalla folgore, e conseguentemente per dar fine alle presenti rissessioni. rimane a dire soltanto, che il grave odor di solto, lasciato entro al detto camerino, su così sorte, e spiacevole, che durò in tutta la notte: e per quanto mi fu riferito dappoi, continuossi a far sentire per alcuni giorni di feguito. Non altrimenti accade, se vogliam paragonare colle grandi le picciole cose, tutte le volte che in giornate umide, e poco favorevoli all'elettricismo, facciasi travagliare a lungo la macchina elettrica in un sito alquanto ristretto. oppur che si trasori col mezzo d'una batteria il cartone di un libro, che sia coperto di marrocchino, o di altre sostanze di fimigliante natura. E se la folgore scorrendo per lo traverso del Camerino, dove l'aria era molto rarefatta per cagion del gran numero di persone, che vi stavan dentro a porte chiuse, non produsse alcuna rovina, sogliam ben anche vedere, che in un torrente di fluido elettrico si scema di molto la sua essicacia, e si va egli, diciam così, a

diradare, qualora si obbliga a dissondersi dentro di un recipiente, ove si trovi l'aria notabilmente rarefatta.

Or da fatti fin quì esposti, dagli esperimenti, e dai raziocini, onde sono stati da me avvalorati, a me sembra, che si scorga colla massima evidenza possibile la notabilissima analogia, che v'ha tra la virtù elettrica, quella della solgore, ed il potere magnetico; e quindi si ha gran motivo da credere, che il gran numero de' variati, e meravigliosi senomeni, che da esse si producono, comechè sembri derivare in apparenza da tre diverse cagioni, nulladimeno debbesi

attribuire ad una sola, ed unica causa.

Dopo di avere ripetutamente considerato questo punto fecondo tutti gli aspetti possibili, veggomi sorte inclinato a conchiudere, che la materia elettrica, e la folgore sieno per ogni sorta di riguardo la medesima cosa; e che ambedue non differiscano altrimenti dalla forza magnetica, se non se come il fuoco vedesi differir dalla luce: intendo dire con ciò, che siccome il fuoco, e la luce, comechè secondo tutte le più plausibili apparenze sieno dotati della stessa natura, pure appajono tra se diversi, per ragione che la luce ha per naturale proprietà di muoversi costantemente in linee diritte, e'l fuoco per lo contrario, fornito di movimento perturbato, si suol propagare in ogni sorta di direzioni; così la forza magnetica quantunque abbia un'essenza comune con quella dell'elettrico fluido, e della folgore, pure nondimeno sembra esser diversa dall'una e dall'altra, in quanto ch'essa si diffonde costantemente giusta la determinata direzione, che si sporge dall'uno all'altro polo, o ad altra, che a cotesta si approssima; laddove il fluido elettrico, e la folgore trascorrer sogliono indisferentemente in qualsivoglia sorta di direzioni. Tutte le altre diversità apparenti, che tra esse fi scorgono, qualora vogliansi attentamente paragonare insieme, venir potiono originate dalla diversa modificazione di una medesima sostanza. E poichè il ramo di scienza appartenente all'elettrico fluido, è per sua natura più suscettibile di essere

invessigato dall'umano ingegno, per esser egli più a portata di soggiacere a nuovi, e sempre variati cimenti; perciò lo stabilimento della già dichiarata analogia tende moltissimo a facilitare i progressi delle nostre ricerche in una materia così intralciata ed oscura, qual è quella del magnetismo.

Or io tengo ferma oppinione, che a voler sanamente rigionare, l'infinito numero di naturali effetti, e fenomeni. ond'è mai sempre adorno il gran teatro dell'Universo, riguardar. si dee alla guisa di altrettanti rivoli, i quali partendosi da un centro comune', vanno di mano in mano discostandosi l'un dall'altro; dal che ne avvien poi, che misti e confusi i simili co' dissimili in gran distanza da quello, viene a smarrirsi totalmente l'immediata loro dipendenza da quel fonte immenso, e principale, da cui per altro traggono essi indistintamente l'origine; cost hè alla nostra mente, a cui non è conceduto d'indagarne agevolmente i rapporti, e le vie, sembrano prodotti da altrettante diverse cagioni, quante sono le particolari qualità, ed apparenze, di cui sono eglino forniti. Per la qual cosa ben fortunato è colui, i cui sforzi fono sì felici, che hanno la bramata efficacia di approssimarli in modo, che disposti regolarmente nella dovuta lor serie, lo conducano a colpo ficuro all'inefausto fonte universale. E siccome un sì fortunato progresso, oltre al condurci con ficurezza al bramato fine, agevola fommamente nel tempo stelso la necessiria fatica per poterci pervenire; così sarà per noi tutti lodevolissima cosa, se rivolgeremo i nostri sforzi ad un fine così ottimo, e salutare; essendo questo il più ficuro mezzo da poterci rendere profittevoli a noi stessi, ed utili al pubblico, ch'è senza dubbio lo scopo il più pregevole, e nobile, a cui si potranno dirigere le nostre investigazioni.

## SHOW THE WHEN SHIP

## XI

## DEL MOTO RECIPROCO DEL SANGUE

PER L'INTERNE VENE DEL CAPO

PARTE I.

M E C C A N I S M O

DEL PENSIONARIO D. DOMENICO COTUGNO.

Letta nella R. A. l' anno 1782.

I

The l'Inglese Harvey, raccolte avendo in Italia chiare notizie della già conosciuta circolazione del sangue negli animali che han cuore, ritornato in sua patria, con molte sperienze dimostrò persettamente e rese suo questo immortal ritrovato; fu invariabilmente creduto vero che il cuore stesse nel petto a ricever mano mano dalle vene il sangue di ritorno da tutto il corpo, ed a rispignerlo così nelle arterie, assinche da esse pe'l capo tutto rimenato a portar vita e sostentamento, rientrasse nelle vene per seguitar suo cammino. Si conobbe da allora che questo continuato girar del sangue sostenesse la vita, e che il cuore sosse l'attivo instrumento di questa grand'opra. Le arterie furon considerate come canali che guidassero il sangue dal cuor ricevuto fino agli estremi confini d'ogni parte del corpo. sostenendo in esso tanto di quell'impeto, e di quella attività ch' ebbe dal cuore, che bastasse a sargli compiutamente soddissare i bisogni della natura nel dispergerlo; e

le vene si trovaron necessarie solo a ricondurre il sangue al cuore. Così il cuore e le arterie si considerarono come organi attivi, ed esecutori nella circolazione; e le vene furon lasciate come in abjetto stato per vie di ritorno al fangue dopo aver foddisfatto ai grandi uffici di quella nobilissima funzione: ed instrumenti da trasporto meramente passivi. Riscaldati gl'ingegni da questa illustre scoperta, passarono subito ad un più esatto esame della struttura del cuore e dei canali arteriosi: si misurò la loro sorza, si calcolarono le velocità relative che dovesse portare il sangue nel muoversi entro canali di distanza dal cuore, di resistenza, di lume, d'attività diversi: e finalmente il sangue stesso fi analizzò, ora scomponendolo con la forza del fuoco, ed ora offervandone col microscopio sino i minimi componenti. Ma in tante ricerche che in cencinquant'anni, ed anche più, con molto studio si son fatte per mettere nel più chiaro e nel più utile aspetto le forze attive della circolazione, poco è mancato che le vie venose non fossero lasciate in una perfetta dimenticanza, quelle stesse vie che sino al MDCXXVIII eran pure state nel costante possesso d'esser considerate le sole nelle quali il sangue stesse raccolto, e donde il ricevessero tutte le parti della macchina animale. Al vedere che il cuore a bene ed utilità de' foli uffici delle arterie si movesse; soli canali che immediatamente, e fenza interpolizione d'altra parte il cuor produce, e che con le sole arterie comunicasse tutta la sua forza; su subito creduto che il cuore e le arterie fossero una sola cosa, e che le vene al mantenimento, ed al comodo, e non agli usi della circolazione appartenessero. Il calore animale considerato come puro effetto del moto, la nutrizione, le separazioni di tanti e sì diversi umori dalla stessa matsa del sangue, s'ebbero interamente per effetti dell'opera del cuore e delle arterie: e tranne il fegato, ove per accordare alla gran vena delle porte la facoltà di dar opra alla separazion della bile, bisognò, lasciandogli appena il proprio nome di vena, fregiarla di tutti gli attributi delle arterie; ogn'altr'organo. in cui di particolar umore separazion si facesse, su creduto farla per opera de le arterie. Così le arterie meritaron d'essere appellate cuore allungato, quasi fossero una stessa cosa col cuore, o come se il cuore fosse fatto per esse sole e pei soli loro bisogni; restando le vene come canali che col cuore commerciassero sol quanto bastasse a somministrargli il sangue da dare alle operose arterie. Su queste idee è stata sin oggi diretta tutta la costruttura della fisiologia degli animali; nè per quanto alcuni genj amici del vero, e capaci di ravvisarlo, e di dirlo a cuor saldo e sermo, qualche barlume scorto talora avessero ed indicato che della maggior dignità delle vene almen forte sospetto muover potesse, si è mai giunto a voler ben intendere questa importante parte dell'animale economia. La condizion delle vene in fatto di circolazione attiva è tanto nobile e degna di esser conosciuta e ben intesa, ch'io credo molta parte di quella oscurità che nella intelligenza di diverse importanti funzioni della macchina animale, e massime del capo, ancora abbiamo, nascere dalla mancanza di piena cognizione del vario cammino che per le vene il fangue abbia. cammino quando sia per avventura compiutamente conosciuto e per tutte le sue parti esattamente capito, può sar vedere I che l'azione impellente del cuore non tutta sia diretta alle arterie, ma in parte anche alle vene: essendoci nella sua struttura parti addette ad agire sul movimento del sangue arterioso, e parti altresì operanti pel movimento del sangue venoso. Il Che la direzione del moto progressivo del fangue venoso abbia una costante e generale alternativa con i movimenti della respirazione. III Che molte separazioni di umori che nella macchina animale si eseguono, se non anche la più parte di esse, o certo molte, sieno separazioni piuttosto venose che arteriose. Questo cammino io mi son proposto d'illustrare, lungi però dal credere che quanto io possa dirne sia per bastare a rischiarar pienamente

questa nuova importantissima parte di sissologia degli animali. Ma mi lusingo che per poco ch'io sia per dirne, e comunque impersettamente, pure dicendo cose di fatto, e dimostrative e sopra tali sondamenti, come uom dee, argomentando, sia per dare un pressante motivo a più nobili ingegni che'l mio non è, ai quali vadano ancora a verso questi studi, ch'io non so per quale infortunio abbiano oltramonti oggidì come per disprezzo meritato il titolo di studi vecchi, a più prosondamente investigarla, ed a metterla in piena luce.

II Ed essendo mio intendimento le direzioni del moto che abbia il sangue nelle vene generalmente dimostrare; mi son proposto ragionar principalmente del cammino, che il sangue faccia per le interne vene del capo; e ciò per due ragioni: prima delle quali è che per niun altro genere di vene questo cammino è nè più chiaro, nè più dimostrativo, nè più espresso, nè con mirabili ordigni più sostenuto, e ad importantissimi fini diretto, di ciò che si trovi essere per le vene del capo: e poi, quandochè sia il gran disegno della natura nel dirigere il movimento del sangue venoso per le superiori vene scoperto e conosciuto, facile cosa diviene il conoscere l'economia de' movimenti del sangue per tutte le altre vene del corpo. Or la natura per sostenere il cammino del sangue venoso nell'interno del capo (cammino non d'una, ma di due alternative direzioni tra se opposte e contrarie) impiega grandi ordigni, e più fingolari che altrove non faccia; e dà con ciò chiaro segno che di quei diversi movimenti il capo assai più che altra parte del corpo abbisogni; giacchè ivi industria s'accresce ove necessità fovrabbondi. E prescindendo per ora da' fini altissimi, che dee la natura avere avuto in attribuire una tanto grande singolarità di cammino al sangue che và per le interne vene del capo; i quali fini io non so se mai uom tutti possa raggiugnere col suo intendimento; è molto evidente che la fola mecanica costituzion del capo esige qualche cosa di fingolare, più certo che qualunque altra parte del corpo,

del cammino del fangue, per le proprie vene. Il soló offervare che in tutti gli animali, che han cuore, il capo tiene il di sopra del resto del corpo, e ciò superiormente nell'uomo, fa subito comprendere che l'eminente posizion del capo portar debba non tanto una discesa placida e tranquilla, quanto una rapida caduta e precipitosa di tutto il suo sangue venoso, sì declive è il sito delle vene che dal capo scendono al cuore, sì spazioso è il loro lume, sì spedito per esse e lubrico e senza ostacoli o freni d'alcuna sorta è il cammino. Anzi se le vene, che ripigliano il sangue dal capo menatovi per le arterie, con la sola legge della discesa de' gravi lo lasciassero scendere al cuore, a quanti oltraggi non rimarrebbe esposta la libertà, l'equilibrio, il placido corso della circolazione? Il capo stesso, che è nobilissima parte, e come tra breve sarà dimostrato, è la più ricca di sangue di quante ne siano nella macchina animale, in quanta povertà di questo fluido spesso spesso non si troverebbe! Il destro seno del cuore soffrirebbe tutt' ora tal urto del sangue in esso piombante dal capo con impeto e velocità, che certo verrebbe a ritardare costantemente la falita dell'altro fangue che viene per la cava inferiore, affrontandolo impetuosamente, e sin paisando pe'i fondo di esso destro seno nella stessa inferior cava. I quali disordini, ed altri molti ch' io posso tacer per ora, nel natural corso della circolazione non accadendo, come ragionevolmente appare, giusto è credere che il sangue scenda per le vene del capo, o fia per la vena cava superiore, non diretto dalla sola tendenza della propria gravità, ma regolato e sostenuto da tali forze combinate che vagliano a raffrenare la sua celere, e precipitosa discesa. E questo impegno di reggere la discesa dal capo del sangue venoso, lo ha in vero la natura tale e tanto, che mostra a questo essetto avere impiegato ordigni fingolari, e mirabilmente congegnati, Risultato de' quali ordigni è una illustre verità ch'io svelar deggio, che parrà a prima vista un paradosso, comechè sia

verità grande ed incontrastabile. E questa è, che per le vene che nell'interno del capo sono, e quindi al cuor scendono non con una, ma con due tra se contrarie, ed alternative direzioni, regolarmente il sangue si mova, l'una dal capo al cuore, l'altra dal cuore al capo. Col quale alternativo slusso e rislusso che danno al sangue, una volta queste vene sanno l'ussizio che in generale alle vene tutte è comune, ed un'altra volta emulano le arterie e nella direzione che danno al sangue dal cuore al cervello ed in certa pulsazione ancora, o sia ondeggiamento che evidentemente dimostrano.

III La qual cosa come da prima io abbia conosciuto. giova narrare. Inteso ad alcuni esperimenti sulla voce. tolsi, è già gran tempo, ad un cane di due mesi con diligenti colpi di scarpello molta ossatura superiore della calvaria, e scoprii la duramadre ove sovrasta alla superior parte del cervello. Con questa scopertura quasi l'intero sito del seno longitudinale rimase nudo ed esposto al mio sguardo. Ed attentamente guardandovi mi parve che quel seno palpitasse: nè altrimenti giudicai applicandovi sopra il mio indice, col quale io distinsi una oscura scontinuata pulsazione, ch' io fulle prime non ben seppi discernere, se arrogar la si dovesse il movimento del sottoposto cervello, o pure un proprio moto e particolare del feno. Mi venne in pensiero d'incidere a' lati del seno per il più lungo tratto possibile la duramadre e rovesciarla si verso le tempia, che lasciando intatto il seno nel proprio suo sito, rimanesse nei lati scoperto e libero il cervello, acciocché con l'occhio attendendo a' movimenti di questo, mentre con l'indice applicato sentissi il seno, mercè tal paragone conoscessi, se l'un moto dall'altro dipendesse, o veramente fossero moti distinti e separati fra loro. Ma con questa diligenza tutto che chiaro a me pareise, che i palpiti del seno nascessero nel seno stesso, e per niuna parte dipendessero da' movimenti del cervello, pure d'illusion dubitando, e vago di maggior luce, presi il partito di recidere verso il sincipite il Longitudinal seno a traverso per vedere scopertamente il sangue della gran vena, che in quel seno và rinchiusa, quali movimenti mostrasse. La qual prova come su fatta, messi in sì chiaro aspetto la diversa origine de' moti del cervello e del seno, che da allora in poi, per quante volte replicata l'avesti, mi si mostrò sempre unisorme. Dal seno longitudinale così reciso vidi con mia sorpresa. che qualora il cane ispirava, scorreva il sangue lentamente quale scorrer suole da ogni vena aperta; e qualora espirava. usciva il sangue a salti come da arteria. E numerando i falti del fangue, che dall'aperto seno usciva dal principio della espirazione fino al cominciare della nuova inspirazione, costantemente vidi che i salti eran tre: ma allorchè il cane fu a morte vicino i falti spesseggiarono tanto, e sì frequenti divennero ch' io più non potei feguirli con l'occhio per numerarli. E'il vero è che morì l'animale cacciando fino all'ultimo tempo che diè segni di vita (anzi per qualche tempo dopo che ogni movimento della respirazione era mancato) sangue dal seno aperto a piccioli salti e consecutivi. E questi salti, trovandosi il seno tagliato e diviso in due porzioni, una verso la fronte, un'altra verso l'occipite, dal solo sangue si faceano che esciva dalla parte occipitale, non dall'altro che scolava dalla porzion frontale molto parco e pigro. Il che dava chiaro argomento che il sangue che a salti veniva suora dalla occipital parte del seno longitudinale, era dalle interne vene giogolari e dalla inperior cava fino a quel seno rispinto.

IV E portando innanzi le incominciate ricerche, volli in quello spazio di tempo che passava dal cominciare l'espirazione, sino al ricominciare l'inspirazione, osservar quante volte il cuor si movesse, e trovai vero che il numero de' suoi movimenti non eccedeva di tre, quanti appunto ed in persenta corrispondenza erano i risalti del sangue che si vedeano in quel frattempo dalla parte occipitale del seno aperto. Anzi essendo gli animali a morte vicini,

ed in quel tempo molto rare diventando le inspirazioni, e perciò il tempo totale delle espirazioni restando lunghissimo; e movendosi allora il cuore con insolita frequenza e celerità, si vedeano, in argomento di persetta corrispondenza, i risalti del sangue dal seno aperto nel detto tempo parimente più numerosi. Dopo le quali osservazioni a me parve esser vero, che nel tempo totale d'ogni espirazione con quante fistoli il cuor spinga il sangue nelle arterie tutte del corpo, con altrettante spinte nell'atto stesso per le interne vene giogolari, o sia pel tronco della superior cava, retrogradar lo faccia, e risalire al cervello. E parve di più che come nell'ordine della naturale e regolata respirazione tre tempi sia da considerare e distinguere d'una quasi eguale estensione tra loro, il primo che s'impiega nella durata della inspirazione, il secondo nella espirazione, e'l terzo nel riposo che prende il petto dalla fine della compiuta espirazione sino al ricominciare della nuova inspirazione, d'onde ogni atto di respirare incomincia: in due di questi tre tempi il risalimento del fangue per le vene fino al cervello fi esegua, ed in un tempo solo succeda la sua discesa, qual è quello della totale inspirazione. Corrispondendo intanto la durata di questi tre tempi d'un natural atto di respirazione con cinque battute d'arteria, cioè con cinque sistoli del cuore, e l'inspirazione occupando la durata di appena due battute, è manisesto che le ? parti del tempo totale d'ogni respirazione sono costantemente nello stato di sanità il tempo in cui il sangue per le vene al capo risale. E con ciò si sa chiaro che il cervello si carica e più abbonda di sangue in tutto il tempo da che l'animale a cacciar l'aria dal petto comincia, e sino a che non torni a ripigliarla; e che di tanto sangue s'allevia da che l'animale ripiglia l'aria nel petto fino a che non torni a rimandarla.

V Or queste cose ofservate avendo, e sentendomi da esse l'animo agitato dalla sorpresa, che tanta e tanto inaspettata novità sece al mio spirito, prima d'imprendere

a fare argomenti sulle molte conseguenze, che da tali offervate cose venir dovetsero, mi venne in pensiero di ricercare con qual mecanismo questo moto retrogrado del sangue per le interne giogolari vene la natura eseguisse tanto regolarmente, e con tanta costanza nel tempo totale d'ogni espirazione. Perchè mi parve maniera di ragionare assai naturale, dalla ofservazion del fenomeno passar prima all'inchiesta delle mecaniche sue ed evidenti cagioni, e dopo quella conoscenza invettigare quali utilità ne derivassero. Ma prima d'entrare in sì fatte ricerche, le quali efigeranno molto esame, e molta analisi degli organi, e delle forze artive della circolazione, è bisogno ch' io dica essere perfettamente vero che non abbiano i soli bruti di tanta e sì speciosa facoltà dotate le interne vene giogolari che per esse abbia il sangue reciproco cammino; ma che con questa stessissima proprietà, se non anche maggiore, stante la regolarità della struttura in cui gli organi umani han maggioranza rilevantissima su gli organi de' bruti, sien queste vene nell'uomo: tale è la simiglianza e l'uniformità della fabbrica de' luoghi, e tali ancora fono gli umani fenomeni che questa analogia sicuramente contestano. Nè ciò dico sopra verisimiglianze argomentando, ma da prove guidato e chiare e decisive. Un uomo inchinato a vecchiaja cui per vizio venereo erasi molt'osso nel sincipite infradiciato, cercò ajuto dall'arte, e l'offo, per quanto era guasto, le fu sterpato. Quel luogo destramente condotto passò a gran path a cicatrice, la quale non riprodusse già l'osso, ma suppli quel disetto prima, come è solito accadere, con una sufficiente riproduzione della pelle sopraposta; pelle sottile, e, per il callo offoso non ancor natovi sotto, applicata alla duramadre: perchè come sempre è vero, massime nel capo onde l'offo fu tolto, mai la natura no'l produce o rimpiazza, se non abbia prima riprodotto la carne sotto di cui la sostanza ossosa sia ricevuta, difesa, ed in certo modo assodata. Questa cicatrice stavasi ultimando nel bregma. Era per

ciò ivi ancora scoperta la duramadre, com' è sempre ne' vivi rubicondissima; e'l seno longitudinale battea con pulsazioni moventifi secondo la direzion del seno molto chiare e distinte: ma quanto con l'occhio si ravvisavano apertamento, tanto riuscivan prive, d'urto al dito che vi si applicava. Io obbligai l'uomo ad inspirare, e sotto l'inspirazione il battimento del seno si tacque: obbligatolo ad espirare, il battimento del seno ritornò nobilmente. Gli feci espressamente, dopo una piena inspirazione, sospendere il respiro senza caeciar l'aria dal petto, ed in tutto il tempo che passò in questo violento stato, su una persetta quiete nel seno. L'obbligai all'opposto, e cacciata con l'espirazione l'aria dal petto, volli che per qualche tempo si astenesse di ripigliarla; ed in questo prolungato stato d'espirazione il seno battè sempre in corrispondenza dei colpi che dava alle mie dita l'arteria del suo carpo. Ecco una pruova di perfetta analogia tra' bruti e l'uomo, ed una irrefragabile dimostrazione, che le vene giogolari nel far risalire al cervello il sangue che n'era disceso, eiò faccian sincrone con le arterie. Ripetei sullo stesso soggetto in presenza di molte curiose ed intelligenti persone le medesime offervazioni; e sempre con la medesima riuscita. E come di fimili casi non son molto rari gli esempi nel grande spedale cui ho l'onore d'assistere, non ho mai tali prove replicate senza trovarle corrispondenti con la prima. Di una però tra molte uopo è ch' io dica, perchè è raro caso, che il seno longitudinale resti così scoperto, nel suo principio, che è nella fronte dietro la glabella, che quivi manifesti ciò che gli accada nella salita che'l sangue ha, e nella discesa: ed io ho avuto caso da poter vedere scoperto questo principio del seno, ed osservaro sopra esso i fenomeni del reciproco movimento. Era stato un giovane d'anni ventiquattro, mentre era bambino, preso di piagi wenerea nella gola per aver succiato le poppe di sua madre, dalle quali un altro bambino, che poi fi vide aver la

bocca da quel vizio ulcerosa, avea poc'anzi tratto latte. S'adoperarono molti argomenti per la sua guariggione, e rimase apparentemente sano. Se non che in età d'anni dodici avendo incautamente con la fronte della destra tibia urtato contro di un fasso, la si ruppe nella pelle, e si contuse. La ferita marci, e non potendo mai a cicatrice condursi per certo perenne gemitio, e certa bavesa carne che vi forgea, fu fospettato che l'angolo sottoposto anteriore dell'offo della tibia dovesse esser guasto. È tale in fatti dopo che fu scoperto si rinvenne. Bisognò raderne tutto il fradicio, e ciò volle sì gran tempo che a formarvisi la cicatrice passarono sei mesi. E questa cicatrice yi si sece folida come cuojo, nè vi nacque sopra mai pelo e su sempre gibbosa, perchè l'osso ove su raschiato si riprodusse più del dovere, ed abbondando di concorfavi foverchia materia ossea, rimase più massiccio e noderoso. Dopo questa guariggione fu sempre sano di gamba, ma cagionevole di salute sino a' ventitre anni or da una or da un'altra sebbre preso, che bisognava ed a bistento, vincere con adattate medicine. Si venne così avanti sino alla sine di quest'ultimo maggio, quando il naso, le palpebre, la fronte gonsiaronsi ed arrossirono, con un senso molesto di bruciore. Il medico la prese per una leggiera risipola, e consigliò che tenessela tutta notte bagnata col succo del grispignolo: con che la mattina si trovò tutto disciolto e dissipato. Negligentando così ogni altro soccorso, che pur le sarebbe convenuto, visse in buona fede sino alla fine di giugno in istato di salute comportabile. Ma da questo tempo sentì dietro la glabella un dolore acutissimo che mai no il lasciò, anzi sopra del dolore vi crebbe un tumoretto che mano mano avanzando, nè ammettendo ripari, si trovò giunto alla sine di ottobre alla groffezza d'un ovo mediocre. Un di dopo pranzo messosi alla fatica fu preso detto fatto da una orribile accessione di epilessia, che gli durò per quattr'ore; dopo le quali parve rinvenuto, e di bottega, ov'era a pulir lane, tornossene

co' suoi piedi a casa. Fu messo subito a letto e dormi profondamente, e su ben da stupire, che svegliatosi la mattina, si facesse le meraviglie per trovarsi a giacere. senza avere la minima ricordanza di quanto avea sofferto il giorno precedente. Ma il tumore fi sentì dolere più che mai, ed avere un calore eccessivo, cui non valse a frenare nè virtù di bagni nè altro. E trovandosi in povertà di stato, e molto trafitto dal patir della fronte, sul finir di novembre se ne venne a Napoli e si messe a cura nel nostro spedale. Ivi il tumore si vide giunto ad una considerabile grandezza, perchè la base prendea quanto ci è di spazio dalla metà della fronte sin sotto i capelli alla metà delle offa del naso. Era tutto acceso di colore, e sorgea in punta ampla e tondeggiante, ove l'epidermide s' era screpolata, e la pelle parea più sbiadita, come si suol vedere ove è chiuia ne' tumori infiammati la marcia. I polsi eran molli, grandi, ondosi, appena un po troppo frequenti: la fluttuazione entro al tumore evidentissima: l'uomo con occhi molto vivaci, ma come ottenebrato di fua ragione. Subito di fotto in fopra per lo lungo il tumore su tagliato, e ne venne suori gran copia di marce sottili, e cenerognole, e'l fondo scoperto rimase tutto velato di certa aderente cotenna, la quale per altro non impedi che si sentisse l'osso soctoposto scabro e carioso per buon tratto d'intorno al centro del tumore. Il terzo di da quello in cui fu fatto il taglio, nel traersi suora quel maiso di sfilacci che dopo del taglio ci si erano messi asciutti, se ne venne con essi quella come sevola e cenerognola cotenna del fondo; con che l'offo guasto si scoprì tutto, che si estendea per l'oiso frontale dalla glabella intorno per un buon tratto. Ed apparve sì scabrolo che diè chiaro a vedere che sarebbe lo staccarlo a pezzi potuto riuscire. Come di fatti riuscì adoperandovi adattato instrumento; staccato l'osso, rimase tutta a giorno quella sottoposta parte della duramadre, che rinchiude la porzione

riù anteriore del seno longitudinale; a tal che chiaramente il movimento del seno potea vedersi. Era manisesto che in tutto il tempo che paisava tra'il principio d'una espirazione e'l principio della seguente inspirazione, il seno non solo pulsava sincrono alle arterie del carpo, ma si presentava in ogni pulsazione turgido, e rilevato: e per l'opposto nel cammino d'una intera inspirazione si quietava, e mostravasi piano. Ed infinuando io all'infermo che si fermasse dal ripigliar l'aria nel petto per maggior tempo, che non si solea, continuavano per tutto quel tempo le pulsazioni, ed in esse l'elevatezza del seno. E su spettacolo degno veramente e curiolo ciò che seguiva ogni volta ch'io fuggeriva all'infermo che traesse l'aria nel petto non così placidamente come naturalmente suol farsi, ma con la maggiore prestezza possibile; perchè sotto una inspirazione celere non si spianava solo il seno, ma s'abbassava sino a mostrare in tutta quella parte del suo cammino una notabile fovea, non senza un'idea di colpo che il pariete anteriore del seno communicasse al posteriore, a giudicio più dell'occhio. che dell'orecchio. Questo sperimento però volle a mie preghiere l'infermo ripeter più di raro, perchè dicea di sentirsi ogni volta vacillare il capo, e come venir meno. Dal che conclusi io, e tutti coloro che curiosi di vedere questo fenomeno eran sovente meco a questo fine, che solo una violenta inspirazione metta a vuoto il seno, che nelle inspirazioni ordinarie mai non divien tale.

VI Pure senza aspettare, che gli essetti d'una abominevole malattia mettan l'uomo in istato di mostrare scoperto il seno longitudinale, possono gl'infanti per la naturale condizione del loro bregma ossirire un triviale esempio del seno pulsante. Ma la loro osservazione manca sempre di quella nitidezza, che negli espressati casi d'uomini adulti si suol ritrovare; parte perchè la respirazione ne'primi tempi della vita è piena d'irregolarità, ed ha i suoi tre tempi molto sproporzionati, eccedendo sempre lo stato di

éspirazione e di quiete del petto; e parte ancora, per non dir d'altro, perché il bregma, acciocche non soffra oltraggio dalle cose che gli si appressano, per lo più resta dalla hatura prestamente munito, e coperto di una ampia crosta, fomiglievole ad arido cuojo, che un certo tenace e melmoso umore ivi dalla cute scaturito, ed addensato le fa per scudo. La qual crosta nè ivi suol trovarsi prima del terzo mese della nascita, nè di là si separa, e cade prima che gli ossi frontali non si sieno perfettamente estesi ad occupare tutto il cedevole e pulsante luogo del bregma: t sin che questa non cada restano molto oscure le pulsazioni del seno. Nè se quella crosta ivi talor manca, lasciando scoperta la cute del bregma, giovar molto suole a chi quel luogo offerva; perchè mai non manca che nel folo caso di natura molto debole, che non valse a produrla, e Tempre è segno d'infermiccia costituzion di quel corpo. E perciò non folo allora quella crosta tutrice manca al bregma, ma esso bregma s'incava, e sa sosso, e così sa conoscere che il sottoposto cervello è magro e depresso, ed incorso in atrosia, e non dando a' nervi di che nudrirsi e valere, mena tutta la macchina a smagrimento nervoso. Nel quale stato sì son caduti i vasi venosi e poco pieni, e si snervate e misere le forze del cuore, che le pulsazioni del feno quasi si obliterano. Ne' fanciulli nati di pochi giorni toccando il bregma, che è ancor senza crosta, lo trovo sempre quali in livello col resto della gibbosità della calvaria e pulsante con una frequenza di battute confecutive ed uniforme, fenza discerner divario tra I tempo della 'espirazione, e'l tempo della inspirazione. Ma trovo vero che i neonati hanno le ispirazioni rare e corte; e lo stato d'espirazione lunghissimo: e sembrano sovente o non respirare affatto, o molto di raro.

VII Essendo dunque vero, che non meno ne' bruti, che nell'uomo costantemente il sangue risalga per le vene al tervello nel rempo della espirazione; merita questo importante

senomeno le più minute ed esatte ricerche, perchè si conosca come per le interne vene giogolari si faccia dal cuore fare al sangue un tal movimento. Perchè non potendosi dubitare che questa regolare retrogradazione dal cuor non cominci, principio ed origine d'ogni ordinato movimento che nella circolazion sua il sangue sa cia, sarà primamente da esaminare da qual parte del cuore questo nuovo movimento del sangue venoso abbia principio; e poi con qual mecanismo la natura faccia che per il tronco della superior cava e per le sole interne giogolari vene il sangue possa regolarmente risalire al cervello. La prima delle quali ricerche è men che non l'altra dissicile a determinare. Perchè nascendo il gran tronco della vena cava superiore (Tav. XVI, ee) dalla sommità dell'anterior seno (Tav. XVI, ff) del cuore, seno carnoso e dorato di chiara forza motrice, è evidente che la forza che possa dar urto, e comunicare azione al sangue, di cui quel tronco è sempre pieno, debba da questo seno venire. Nel qual seno, che ha seco aggiunto l'anterior orecchio del cuore, è tale e tanta la struttura muscolosa, che indica ad evidenza quanta virtù motrice debba avere. E ne' viventi animali aperti è sempre stata in fatti una successiva azion contrattile da tutti gli offeryatori nel destro seno, ed orecchio del cuore unisormemente riconosciata. Da tutti però è stata sempre creduta diretta ad ajutare il sangue là dalle vene portato perchè s'pedito e con qualche impeto entrasse nell'anterior ventricolo del cuore; e non già fatta per rispingerlo, e rimenarlo in dietro, per le stelle vene onde era venuto, verso il capo. Cosa per altro, che mai in pensier d'uomo venir non potea, se le sperienze, già sopra narrate, non avesse prima conosciute, e non fosse stato suori della volgare credenza, che essendo generalmente le vene vasi addetti a riportar sangue da tutte le parti del corpo al cuore, non potessero esser capaci che di dargli una sola direzion di cammino. Tanto è difficile e periglioso nelle cose della natura fissar leggi certe e generali, e di quelle prove, che D d 2

fi abbiano per poter concludere del più, valersi a man franca per concluder del tutto. Certamente io trovo vero, che alcune particolari vene nella macchina dell' uomo allontanano sovente il sangue, e'l distolgono dall'impreso cammino verso il cuore, o per evitare che troppo non ci si affolli, o per procurare una maggior pletora, ed un urto maggiore sopra certi luoghi, che ne abbisognano. Della qual cosa si troveranno, io spero, non nelle sole interne giogolari, ma in altre vene ancora della macchina animale

chiari argomenti, e d'incontrastabile evidenza.

VIII Ma prima d'imprendere un preciso esame del vero luogo del destro seno del cuore, da cui il sangue della fuperior cava venga rispinto sino al cervello, uopo è mostrare che tal risalita non possa essere essetto nè di ripercussione nè di ribalzo che il sangue abbia dal cuor che gli resista; nè di percossa, che lo sterno, dietro a cui il destro seno, ed orecchio prossimamente si trovano, nel tempo della espirazione abbassandosi gli porti sopra; ma sia tutta una azion rositiva, e disegnata, che dallo anterior seno, ed orecchio del cuore si produca appostatamente, con preparato e stabile sottil mecanismo in ogni espirazione. Perchè esaminando attentamente la pofizion dello sterno, che come scudo protegge, e dietro se tiene come in custodia il seno e l'orecchio anteriore del cuore, fi trova quest'osso, non dico dal seno, ch'è più posteriore, ma dall'orecchio che è più avanti, sì distante nel tempo che il petto nella espirazione s'abbassa, che a nessun patto non può nello stato naturale urtarci sopra. E resta sì bene lo sterno dalle costole che tiene lateralmente inserte, o articolate, in tal distanza mantenuto, che per potere all'anteriore orecchio almen per poco avvicinarsi, converrebbe prima distaccarlo dalle costole, e lasciarlo isolato. Il che quando si faccia si vede sì che lo sterno s'abbassa lasciando le disgiunte costole più in alto, ma non fi abbassa mai tanto che anche in minima parte toccar possa, non che urtar nell'orecchio. Perchè

dunque nella natural posizione delle parti possa lo sterno in tempo d'espirazione piegar tanto in dietro, che urti full'orecchio, e dia con ciò tal colpo al fangue in esso accolto, che l'obblighi ad ondeggiar verso il capo, dovrebbenon solo troyarsi disgiunto e dittaccato dalle costole, ma ben anche ajutato da qualche altra violenta esterior forza a penetrar molto in dentro. Infino a che dunque resti con le costole congiunto e sostenuto, non pui affatto lo sterno nella espirazione nè all'orecchio nè al congiunto feno anteriore avvicinarsi, ed in conseguenza non può urtargli. Oltre a che se gli urtasse, non potrebbe comunicare che un sol urto in ogni espirazione, nè produrre che una sola azion di rispinta sul sangue di quel cavo: e pure finita l'espirazione nello stato di riposo, e di quiete del petto seguita il sangue regolarmente, e con l'ordine stesso per la superior cava a risalire. Ed in quanti uomini ho io di proposito voluto esaminare la distanza che resti tra la faccia interna dello sterno, e'l sito opposto dell'anteriore orecchio e seno del cuore, avendo fatto aprire il petto destro ed avendo offervato da questo lato il mediastino, ho sempre veduto, che quella parte del pericardio, che cuopre l'orecchio e'l seno destro, e le due cave, e l'anterior ventricolo del cuore, e'l princip o dell' arteria polmonale, e'l gran tronco dell' arteria aorta, tutta protubera dentro al cavo del petto destro, e tutta è dietro lo sterno, e sotto la sua protezione, e dal destro polmone è ricevuta, che ivi espressamente sa seno, che quella grande protuberanza del pericardio, e sì ben piena, riceve, ed accoglie. E questa protuberanza ta che il mediastino sia sempre a destra in quel sito per tal cagione notabilmente gibboso. Ma dal termine più anteriore di questa gibbosità sino allo sterno che gli è rimpetto, tal distanza si trova, che il mediastino anteriormente disteso pur occupa, che talvolta giunge sino a diciotto linee parigine. La qual distanza per lo contrario è sempre incavata, e sa seno verso il sinistro lato del petto, tale e

tanto, che l'anterior lembo del destro polmone ci penetra, ed o di se, o d'una sua singolare appendice, il riempie. La quale appendice quando d'aria il polmone è pieno. come nella inspirazione suole accadere, tra lo sterno e l'anteriore orecchio infinuandosi si dilata arrecando notabile pressione alla inferior parte del destro orecchio. E ciò più accade perchè il pericardio, ove l'anterior seno ed orecchio copre, non è mai da esso distante, ma sempre vicino, ed in perfetto contatto. Da ciò nasce che la faccia destra del mediastino mai nell'uomo non sia così spiegata, che resti piana; e che a ragione l'umano mediastino dietro al finistro margine dello sterno debba finire, giacchè la natura ha voluto, che il destro polmone coprisse tutte quelle parti del cuore, che dal sinistro margine dello sterno a destra corrispondono. Dietro al qual margine sinistro si bene il mediastino spesso finisce, che avendo talvolta uno stiletto rasente questo margine introdotto nel petto, esattamente l'ho trovato disceso tra le due lamine dell'anterior mediassino e dall'uno e dall'altro lato da esse lamine coperto. generalmente gli animali muojono restando col sego, e coll'orecchio anteriore del cuore pieni anzi turgidi di sangue più dell'ordinario, e di sangue grumoso o poliposo, che sempre maggior dilatazione e più stabile dee apportargli; la ragion di credere che nello stato di vita e di sanità lo iterno mai non raggiunga l'orecchio e'l seno destro, sì che urtando in essi nel tempo della espirazione obblighi il sangue per la superior cava a risaltar sino al ceryello, cresce dall'offervare che neppur li raggiunge quando sono più turgidi e più gonfi, come soglion trovarsi dopo la morte.

IX Non dee però tacensi una cosa, ch' io credo in questo genere degna d'attenzione: e questa è l'insigne disserenza, che passa nello stato, e nella direzione di molte parti del cuore, tra giovani, e vecchi. La quale disserenza molta luce può spargere per agevolare l'intelligenza della

diversità, che nel suo movimento dee il sangue subire nelle diverse età dell'uomo: ed in parte servirà ora per consermare, che la discesa qualunque dello sterno, e delle costole in dentro al petto nella espirazione, in niuna età possa sul seno e sull'orecchio anteriore operar tanto che cagioni la risalita di quel sangue venoso sino al capo. E cominciando dal corpo del cuore egli è in vecchiaja più pallido, più floscio, più di callosità per tutte le sue parti esteriori variamente cosperso, men appoggiato, e men sedente sul diaframma che in giovinezza non si mostri. Ed o sia che l'aorta incallita nel tronco gli ceda meno, e resa più corta se'l ritiri in sopra; o che il peso del cuore sia divenuto in vecchiaja minore; o che finalmente, per ciò ch'io creda, afflosciati in vecchiezza i muscoli dell'addomine, e resis gl'intestini meno elastici, men turgidi, meno elevati, e'l fegato men sugoso, e più cascante, non più sostengano molto in alto il diaframma, e questo in giù cadendo per propria "imbecillità, e per disetto di sostegni, non più mantenga sopra di se traverso il cuore, ma in certo modo l'abbandoni, e l'obblighi a restarsene appeso; egli è certo che il cuor si trova e più tirato in sopra, e per la più parte satto perpendicolare di quafi traverso che prima si trovava. Nel quale stato accade talvolta di trovarlo in giovinezza quando anticiparono i mali quegli effetti svantaggiosi dell'ultima età. La grandezza del corpo del cuore anche in vecchiaja si rende minore; ma quella del destro seno, e dell'orecchio destro più che in altra età molto maggiore. L'orecchio finistro quasi è chiuso, e'l finistro seno di capacità assai manca. Il che porta a far conoscere che nelle vene cave fovrabbondi, e si ritiri più di sangue in vecchiaja, e che in proporzione ne passi, e ne appartenga assai meno del solito alle arterie. E giugne ne' vecchi a tal segno la turgesoenza del seno e dell'orecchio destro, per l'abbondanza del sangue che in esso è ritirato, ed accosto, che tirato giù dal paso del sangue che rinchiude, la superior parte, e la più libera

del destro orecchio resta molto distratta, e distaccata dal tronco dell'arteria aorta sul quale s'appoggia, ed ha come nicchia propria, e limitata. Della qual nicchia da pochi conosciuta è d'aver molta ragione, sì perchè la natura con eleganza d'artifizio l'ha distinta, e sì ancora perchè alcune sue parti son degne di molta rissessione. Prima adunque è da dire, che uscendo l'aorta dal sinistro ventricolo del cuore- vergente a destra obliquamente, intorno ad otto linee di distanza dal cuore, è anteriormente a traverso compresa per tutta la sua larghezza da una spezie di barriera ligamentosa rilevata più o meno, secondo che di pinguedine che aver suole più o meno abbonda. E questo ligamento alla esterior membrana di quell'arteria affisso, è attraverso, secondo la convessità dell'aorta (Tav. XVI, rr): e con la sinistra estremità non di rado, lasciata l'aorta, si gitta per qualche tratto su l'annesso tronco della polmonale arteria, e sopra questo tronco si disperde, e svanisce. Questa traversa limita come farebbe un argine i confini ove l'estrema superior parte del destro orecchio possa estendersi, non già quando vuota di fangue s'affloscia, e cade, e si riposa sul cuore, ma ben quando il sangue entra più in essa a riempirla. E pare verisimile che possa concorrere ad incitare l'orecchio a sollecitamente contrarsi all'arrivo del fangue che l'abbia ripiena, con certa reazione con cui dee corrispondergli. In alcuni soggetti questo tal ligamento io non l'ho rinvenuto: ed è stata cosa degna d'attenzione che quando questa traversa è mancata, il tronco dell'aorta non l'ho mai veduto rilevato, e gibboso, come esser suole simile ad arteria piena, ma in verità vuota di sangue, e sostenuta da un suo proprio intrinseco, ed ignoto vapore; ma sempre per lo lungo incavato e depresso. Il che mi fa credere che questo ligamento non solo sissi il confine alla distesa del superior cono (Tav. XVI, iii) del destro orecchio, ma a guisa d'un arco freni l'anterior pariete dell'aorta, e'l contenga a modo, che mantener si debba inarcato,

inarcato, e gibboso, nè cader possa facilmente sopra al

pariete posteriore.

X Ma che che sia degli oscuri sini, che la natura possa aver avuti nel mettere codesta barra traversa incontro al superior margine del destro orecchio, giova avvertire, che in vecchiaja tanto questo orecchio con l'annesso seno di sangue abbonda, e sì dal suo peso è giù distratto, che molto da quella barra s'allontana, e molto ancora dalla convessa faccia del cuore, a destra, e verso il dorso inchinando. Dal che opino che tragga origine una infigne mutazion di sito che il seno destro, e la superior cava mostrano in vecchiezza. Pérchè quando s'apre dalla parte d'avanti il pericardio, del destro seno nulla non si vede: e pure in uomini di giovane età accanto all'orecchio rilevata e turgida una qualche sua parte (Tav. XVI, ff) sempre si manisesta. Nè il tronco della superior cava ne' vecchi molto scoperto appare a destra della gibbosità, o sia del maggior seno dell'aorta. Che anzi il destro seno dietro il suo orecchio occultato è tutto posteriore, e dorsale; e 1 troneo della superior cava dalla molta gibbosità del maggior seno del tronco dell'aorta soprassatto dietro questa grande arteria quasi tutto s'asconde. Nella quale mutazion di nto dal primo nascer dell'uomo sino all'ultima sua età trovo una progressione continuata. L'infante ha il tronco della superior cava dal tronco dell'aorta sempre distante d'una linea o due; ed in quella prima età il tronco dell'aorta è quasi eguale, e manca di quella soverchievole gibbofità che forma il suo seno maggiore, e che gli sopravviene mano mano cogli anni; e come questa gli và venendo guadagna sempre luogo verso la cava superiore: e prima gli si avvicina, poi gli si soprappone tanto di più quanto di più và con gli anni quella sua gibbosità crescendo. Ed in tal modo occupa negli adulti molta parte di quel tronco venoso, ed in vecchiaja finalmente l'occupa, ed occulta tutto. Dal che se la cava superiore comodità ritragga,

envero resti incomodata in alcuna parte de'saoi usizi, altri per ora se'l vegga. Io ho voluto dir di ciò a solo fine di sar più conoscere, che con gli anni l'orecchio, e'l seno destro del cuore semprepiù s'allontanano dal davanti del petro, o sia dallo sterno, e che onninamente non può quost'osso, nè possono le vicine costole nella espirazione abbassandosi esser la mecanica cagione, onde dal seno, e dall'orecchio destro del cuore il sangue venga spinto a risalire sino al cervello.

XI Che le questa non è certamente la vera cagione onde il sangue della superior cava regolarmente risalga al cervello, uopo è cercarla nel suo vero principio, e riconoscerla da una azion stabile, e positiva, che il seno, e più l'orecchio anteriore del cuore, a questo preciso fine regolarmente costrutto faccia nel tempo d'ogni espirazione. Perchè un effetto costante, e regolare dee riconoscere una origine stabile ed ordinata: e trovandosi le risalite del sangue renoso contemporanee a' battimenti del polso, convien dire che la loro forza motrice agiica nello stesso tempo in cui agiscono le arterie. Or questa azione se sia di tutto il sacco anteriore del cuore che comprende l'orecchio, e'l sono destro, o di una sola di quesse parti, merita esame. In dupo molte ricorche fatte su questi luoghi, e dopo molte e reiterate offervazioni, ed esperienze, ho trovato vero, che questa azion di rispinta venga in ogni espirazione eseguita dalla fola anterior parte del destro sacco del cuore; o sia dal solo precchio, e non già dalla parte posteriore, o sa dai seno. Il qual seno nel tempo della espirazione si trova in tutt'ultro flato the non è quello d'agire per la risalita del sangue venoso sino al cervello. E perchè si vegga come l'orecchio, e'l seno destro, congiunti essendo, e formando infieme una fola, e comune cavità, fieno non una sola, ed indivisa potenza, ma due potenze diverse e dishime tra loro, concorrenti ad uno stesso effetto, e ad was stello fine, ma ciascuna separatamente diretta in modo parzicolare, giova dichiarar prima la lero naturale posizione, dalla di cui conoscensa queste ventà chiaramente derivano. E primamente è da osservare, che la cava superiore scende nella cavità del pericardio quasi persettamente perpendicalare (T. XVI, ee, T. XVII, ff), e la cava inferiose entrando in opposizione nella stessa cavità, v'entra molto obliguamente (T. XVII, k) venendo da dietro in avanti; a tal modo. che l'asse della superior cava con l'asse della cava inferiore dove s' incontrano fanno infieme un angolo ottufo di circa 124 gradi. Il qual angolo ha la sua divergenza verso la foina e la convergenza rignardante lo sterno. Da ciò deriva. che net destro seno del cuere due lave di sangue enerano in opposta direzione tra loro, una che piomba a perpendicolo dalla cava superiore, ed un'altra che entrando per di sotto l'attraversa, dalla cava inferiore. Le non credo andae errato, se queste due lave consideri come due correnti, che con direzione tra loro in moltz parte contraria entrino imperuose nel destro seno del cuoro: e se dica che mostrando queste due lave d'esser discette a passarsene nel destro ventricolo del cuore per quiadi far tragittare il loro sangue nell'arteria. polmonale, la corrente inferiore sia meglio della superiore a portata di ciò conseguire. Perchè l'affe della vena cava inferiare, e'l sua invero orifizio con cui s'apre nell' imai parte del seso, sono si ben messi simpetto, e si ben corrispondenti con la perta venosa del destro ventricolo deb cuore, e sì vicini l'uno all'altro, che evidentemente s conasce l'impeto della sua corrente dover menare il sangue dirittamente a quella porta, e per essa al destro ventricolo: del cuore. Ma la corrente che scende a perpendicolo dalla superior cava des alla cornente inferiore, quandochè sa incontrigo, attraverlandola, tagliare in gran parte il cammino, o infrangerlo almeno e debilitarlo. E da ciò appare che le dua opposte correnti, ch'entreno nel destro seno, st combattan tra long, a folenne svantaggio della regolata, a: placida entrata del di loro sangue nel destro ventricolo. Anzi chi ben riflette, ed esamina lo samo nacurale di questi.

luoghi, dee confessare, che la corrente superiore se scende libera nel destro seno del cuore, dee nuocere al progresso della corrente inferiore non solo perchè gli attraversi il corso, ma anche perchè se gli ossira di fronte, ed a modo da dover molto impedire la sua libera salita, e da invaderla, almeno in parte, sin dentro la cavità della stessa vena cava inferiore.

XII Le quali cose se nello stato naturale de'luoghi, e nell'ordinario corso della circolazione, accadessero, dovrebbono senza dubbio molta traversia, e sconcerto molto arrecare al libero cammino del fangue delle due vene cave verso il cuore. Ma per ammirabile provvidenza della natura ficuramente non accadono. E le due grandi correnti del sangue venoso, con quel mecanismo che sarà ora dimostrato, nel destro seno del cuore non si collidono; e senza urtarsi vicendevolmente passano per la più parte, in tempi diversi al destro ventricolo del cuore, e separatamente vi portano ciascuna il suo sangue. Parrà questa atserzione, io son sicuro, prima che con chiare, ed evidenti prove non resti dimostrata, un'altro paradosso: ma si troverà certamente solida e vera, dopo che si sarà conosciuto il sorprendente artifizio che la natura ha messo in quel luogo del destro seno, ove l'incontro, e la collisione delle due correnti del sangue potrebbe accadere. Artifizio, che in mezzo all'esame, che da tanti, e tanti valorosi uomini del cuor si è fatto, non dovea restare occulto; o se su sorsi una volta subodorato, non dovea subito rimaner negletto, e per mancanza di nuove, esatte e continuate osservazioni dimenticato. Il che ha dato gran remora alla intelligenza di questo nobilissimo articolo della dottrina della circolazione. Prima però ch' io dica di questo grande artifizio ciò ch' è degno d'esser saputo, uopo è avvertire, che nomo non creda mai poterlo ravvisare, e riconoscere, se non esamini queste cose nel cuore lasciato intatto, e nel suo natural sito dentro del petto. Chi voletse in un cuore svelto di mezzo a' polmoni codesto artifizio compiutamente osservare, e conoscere i

precisi rapporti de' suoi ordigni, ed i suoi maravigliosi effetti finalmente comprendere, incorrerebbe nel caso in cui per simile ragione deggiono esser incorsi molti grandi nomini, di non conoscerlo giammai, e di restarne esattamente all' oscuro. Per fare adunque che nel destro seno del cuore, in cui le due grandi correnti del sangue venoso s'immergono, essendoci una sola, e continuata cavità, essettivamente s' impedisca l'incontro delle opposte correnti, e sien queste obbligate senza urtarsi a passar divisamente nel destro ventricolo, ed in tempi diversi, tien la natura, durante la vita, in quella parte del feno, che è tra la porta venosa del destro ventricolo, e la base della superior cava, posteriormente elevata un'isola, che dalla posteriore, e finistra parte del seno innalzandosi s'erge, e viene avanti tanto che occupa il passaggio, che tra l'una, e l'altra cava potrebbe ivi rimanère. E l'occupa a tal modo, che s'avvicina, o tocca l'interior faccia del destro orecchio quasi nel suo di mezzo. Così applicandosi a quest'isola l'interior faccia dell'orecchio destro per la sua parte di mezzo, resta distinta in due parti, una superiore al contatto dell'isola, ed un'altra inferiore. La superiore comprende coll'isola uno spazio, che è tra la superiore metà dell'orecchio, la superior parte dell'isola, e l'oritizio della superior cava. L'inferiore un'altro spazio copre, che tra l'orifizio della inferior cava, e la porta venosa del destro ventricolo del cuore si ritrova al di sotto dell'isola, e nella inferiore metà del seno. In tal modo la corrente superiore del sangue nello spazio superiore del seno entrando, e nell'isola imbattendosi, che da ampia base s'erge convessa verso il di mezzo del destro orecchio, terminando ivi la vetta gibbosa, ed ottusa, in vece di scendersene verso il fondo del seno, e portarsi con impeto contro la corrente inferiore, dechina sidrucciolando come per un piano inclinato contro la superior parte dell' orecchio disposta dalla natura in singolar maniera a riceverla.

Ma prima di dire ciò che avvenga alla devista correnze superiore capitando nella superiore parte del destre orecchio, che la natura a questo fine ha fatta notabilmente concava, ed attiva; e come ciascuna delle due correnti puff al destro ventricolo in diversi tempi, ed alternativi tra loro: e se talora il sangue delle due correnti incontrar si polla. e subire mescolanza; prima, dico, di tutto ciò, bisogna dichiarare donde codest'isola abbia principio, ed in qual modo fia prodotta, e se sia stabile, e serma cosa, ovvero soggetta ora ad efferci, ed ora a scomparire. Senza la notisia delle quali cose, malagevole ed oscura rimarrebbe la spiegazione sì del patfaggio, che in distinti tempi, ed alternativi, hanne he due correnti al destro ventricolo del cuore, come della maniera onde nel tempo della espirazione la corrente del fangue superiore vien rispinta per la superior cava al corvello. Nasce aduque nella superiore e simistra parte del destro feno l'isola già detta, prodotta da una estuberanza the lo stello pariete posteriore, e finistro di quel seno forma, cedendo all'urro, ed alla spinta che gli viene dal sangue onde si sa turgida il seno, finistro del cuore dieteo questo posserior pariete del destro seno situato. A tal che quando il finistro seno di sangue è turgido, come è sempre nel tempo della espirazione, per lo scarigo che in esso seno allora più fanno le polmonali vane; nel sito traverso che ha il cuore, il pefo, a l'impeto di tutto quel fangue, che in tal feno è raccolto, grazita, e fai tal unto fopra quel parieto posteriore del seno destro, che l'obliga ad esturbara contro l'interior faccia del destro orecchio, e sormar l'isbla già descritta. Dal che risulta molto chiacamente, che trouandosi il finistro seno o scardo di sangue, como nella ispirazione avviene, o vuoto, come in un cuor recife, e faparato dalle wicine parti lempre si troya, l'isole scomparisco, nè di essa nel destre seno peppue segno rimano. E tacso meno Lisela rileva quanto è minore la quantità del fangue in quel feno adunata, come è ne' vecchi; o quanto più în basso ed in

dietro il seno è distratto, come in ogni inspirazione accade, in cui i polmoni con distendersi verso basso, e scendere verso il diaframma, sì le polmonali vene distraggono, che refia con esse il finittro seno ancora distratto, tirando a se ed abbattando il potterior pariete del destro col quale è unito. Quell'ifola non è dunque nella struttura delle parti del cuore una parte stabile anch'essa, ed organizzata, ma è un accidente del destro seno dalla natura però, mentre abbiam vita, nel tempo della espirazione stabilmente procurato con alvissimo disegno, e sostemuto secondo il bisogno con adattati mezzi a quest'uso. E per ciò è un impossibile sisse poter la minima traccia di quest'isola trovare ove la ricerca si faccia o in un cuore svelto dal petto. o in un petto da cui sieno stati svelti i peimoni, o finalmente in soggetti ne' quali le invincibili resistenze, che i polmoni' hanno opposio al langue del deltro venericolo, faccian trovar dopo la morte vanto il finistro seno. E portando io ferma opinione, che l'isola ch'io descrive sia quella stessa stessa fie si fina cosa che l'Inglese anatomista Lower sino dal 1669 chiamar volle subercolo (1) del destro seno del cuore, ciservo con rincrescimento, che questo valentuomo non abbia a tempo ed opportunamente avvertito si l'instabile condizione di questa parte, che le cagioni, che esistes la facciano, e vicendevolmente la facciano scomparine. La qual cota se fatto avesse, non avrebbe per avventura l'esittenza di questo subercolo sofferto tanto contrasto da posteriori effervatori. Certamente non v'è oggi anatomista che quel Loweriano subcrevio riconosca esistente, e non poco dee aver contribuito a questo commo ingarmo l'avere il Lower falsamente afferito che questo tubercolo nasca da grasso ammassato a questiuopo distro al destro seno i quandochè grasso ivi la natura mal aon ha messo, o se tra la base della superior cava, e l'aorta

<sup>(1)</sup> De Corde cap. L.

alcun poco v'è di grasso, è troppo lontano dall'isola: e se Lower avesse voluto impiegarci un poco di diligenza, e d'attenzione, l'avrebbe evidentemente conosciuto. Il modo adunque da poter vedere l'isola espressamente è recidere col taglio intorno intorno tutto il deltro orecchio, ed estrarre di dentro al seno, che così si scopre, con diligenza, e senza molto premere le vicine parti, tutti i grumi, ed ogni altro sangue ivi rinchiuso. Nettato il seno, l'isola si vede chiaramente, e se con una lancetta quest'isola si penetri, si vedrà subito il sangue del sinistro seno in cui la ferita fi trova penetrata, escir fuori, ed in ragione della sua uscita l'isola abbassarsi. Lo spazio intanto, che l'isola comprende è tanto esteso, che quasi occupa tutta la superiore posterior parte del seno destro; perchè tutta la fossa ovale, il suo di sopra, tutta la sossa coronaria, sono in essa compresi; i quali siti dalla turgidezza del sottoposto sinistro seno restano elevati. Ed io ho sempre, e costantemente osservato, che ferita l'isola, massime nel suo centro, e per la ferita introdotto traversalmente uno stiletto nel seno sinistro, questo stiletto è dirittamente penetrato sin nel sinistro orecchio, e rer lo più è passato sino alla sua punta. Il che sa conoscere che l'orecchio finistro è in persetta opposizione col centro dell' isola. Anzi il sinistro orecchio sì diametralmente opposto all'isola corrisponde, che se l'orecchio finistro o in tutto o in parte si recida per l'apertura che se gli sa introducendo uno stiletto, questo dirittamente passa sino alla vetta dell'isola.

XIV E' dunque manisesto che la corrente superiore del sangue venoso entrando nel tempo della espirazione, in cui l'isola è elevata, nel destro seno del cuore, non possa-scender libera sino alla parte inseriore del seno ad incontrarsi con la corrente inseriore, ma dall'isola, che in mezzo al seno se gli oppone, resti impedita, ed obbligata a declinare come sdrucciosando in avanti nella conca (Tav. XVII, eecc) del destro orecchio. Ma il destro orecchio è sì lacertoso,

ed irritabile, e tanto d'ogni nuovo, ed impetuoso contatto insofferente, che non può quell'urto ricevere, ne quel peso di fangue, senza commoversi all'istante, e senza procurare con una violenta contrazione, e stringimento di discacciarnelo. Si contrae dunque, e la rispinge dandogli quella direzione di rispinta, che esattamente corrisponde alla direzione dell'urto comunicatogli da forti, e potenti lacerti carnosi che in quella tal sua conca superiore interiormente si trovano. E per ciò questi suoi lacerti dalla natura sì sono stati congegnati nella conca, e disposti, che movendosi, e contraendosi, spinger deggiono da sotto in sopra la superior corrente, e cacciandola da se, rimenarla, con quanta forza s'abbiano, per la superior cava verso il capo. E questa rispinta sa montar in alto, e retrogradar la corrente sin che la forza di gravità del sangue non la vinca, obbligandola a ripiombar di nuovo full'orecchio. Così alternativamente sale e discende dalle stesse forze combattuta, sin che ritorni l'inspirazione, che abbassando e spianando l'isola, il bipartito seno riunisca, e comunichi. La qual cosa s'intenderà manifestamente dopo aver esposta l'elegante, e ben disegnata struttura interna del destro orecchio: struttura che comunque da valorosi osservatori con diverse descrizioni sia stata in parte illustrata, in parte oscurata, potrebbe stare che posta sotto questo nuovo punto di vista, qual è di conoscere come vaglia in tempo d'espirazione a rispingere nella superior cava il sangue, che in essa si trova, da sotto in sopra, dia e lasci di se più facile idea, e più chiara. E per ciò fare bisogna cominciar dal dire, che il tronco della cava superiore entra a destra per la sommità del pericardio entro il di lui cavo, e vi scende per circa quattro pollici quafi cilindrica. È sì poco nella fine della fua discesa cresce il suo lume, che il diametro della cava nella sua prima entrata nel pericardio, si trova essere al diametro, che ha ove finisce coll'aprirsi nel destro seno del cuore, come 18 a 19. Ove inferiormente la cava

superiore ha fine comincia il destro seno, che è come un ventre ovale meilo di fotto in sopra perpendicolarmente a destra del cuore, e termina sopra la base del pericardio. In questa fine inferiore ( Tav. XVI, g ) si trova meno stretto, e vi riceve la inferior cava (Tav. XVII, k), che con l'estremità del suo gran tronco, trapassato avendo il diaframma appena, con l'inferiore estremita del seno adequatamente s' innesta. E paragonando il diametro delle due cave, che nelle due opposte estremità del seno si aprono, trovo il diametro della superiore (Tav. XVII, hh) effere al diametro della inferiore (Tav. XVII, k), come 9 a 12, o sia come 3 a 4. A mirarla da suori la superficie di questo seno si trova molto unita, e liscia; ma tutta la sua faccia anteriore, che si presenta la prima aprendosi il pericardio, escresce da sopra in sotto a guisa di borsa di diversa capacità, secondo che son vari i soggetti, e secondo che il cuore in queste sedi alla piena del sangue più di distrazione o meno si trovi d'aver sofferto. Questa anterior borsa del destro seno è quella parte, che si chiama orecchio destro: del quale orecchio niuna parte del cuore ha nel petto fito più anteriore. L'esterna apparenza è la prima cosa che fa discernerlo dal seno, che lo produce: una superficie che sembra interrotta, e disuguale, ed un colorito per la maggior trasparenza di molti suoi luoghi, e per la struttura lacertosa che ha, più carico, e quasi violaceo, lo disegnano apertamente. È la sua figura somiglierebbe perfettamente un mezz'ovo diviso per la sua lunghezza, se nelle due estremità non avesse delle considerabili escrescenze. Perchè dalla estremità superiore produce a guisa d'un capuccio sciolto, e libero d'intorno per la lunghezza d'un buon pollice, che per gli arricciati suoi margini pare molto ornato, e termina inchinando a finistra con una o due punte più acute. Io lo chiamo il cono superiore ( Tav. XVI, iii ) dell'orecchio destro. La base del qual cono sorge ampia dal di mezzo dell'orecchio, ed insensibilmente

227

estenuandosi s'erge sino all'apice. E con la inferiore estremità molto più larga forma l'orecchio destro un fondo. di facco staccato, e pendolone, che poggiando sopra la base del pericardio asconde dietro a se totalmente l'entrata della cava inferiore. Chiamo questo fondo del destro orecchio il lobo inferiore ( Tav. XVI, k g ) per certa analogia d'attribuiti con l'orecchietto dell'organo dell'udito. Questo lobo è comodamente adaggiato in un incavo, che fopra al fegato, ivi immediatamente al diaframma fottoposto, si trova a quest'uso, restando quivi il segato tanto da questa parte del cuore distante, quant'è appena la doppiezza del frammesso tendine del diaframma, e del congiunto pericardio. Il cono superiore tutto cade, e riposa libero nella nicchia; che è tra il ligamento celluloso, ed adiposo che attraversa anteriormente il tronco dell'aorta, e la base a destra del cuore. Nella qual nicchia ho spesse volte trovato una o due pendenti e libere borsette di grasso atte a dare molto foffice appoggio al cono superiore, che ivi entro bene spesso giuoca.

Ma la faccia interna di tutto il destro orecchio XV io credo che debba esser distinta in due parti dalla natura stella di forma, di sito, di struttura divise. Perchè la metà superiore che comprende tutta l'ampia base che va nel cono a finire è tanto fingolarmente, e costantemente incavata, e circoscritta, che dall'altra metà che resta inferiore, e discende sino al lobo, è chiaramente diversa. La prima delle quali protegge la metà superiore del seno che è tra l'isola, e l'orifizio della superior cava, e la seconda resta incontro l'altra inferiore metà, che è tra l'isola, la porta venosa del destro ventricolo del cuore, e l'orifizio della vena cava inferiore. E quando l'orecchio si distacca dal cuore tagliando la lor congiunzione a finistra, e portando il taglio ( Tav. XVII, ) dalla base del cono insino al lobo, rovesciandolo a destra s'apre tutto il seno, nella concava taccia dell'orecchio, chiaramente si distinguono i confini

Κ.

dalla natura stabiliti tra queste due parti. Perchè la metà superiore è tutta come una conca (Tav. XVII, eeee) formata di figura ovale, che dalla metà dell'orecchio s'erge per la fua lunghezza verso il cono: e la metà inferiore resta più elevata, e più piana. E di tutte queste due parti essendo l'interna struttura di lacerti muscolosi strettamente fornita. ha anche la natura per marca irrefragabile d'una stabile distinzione fra queste due metà, data molto diversa direzione a' lacerti dell'una da que' dell'altra. Perchè la conca ha i suoi lacerti nati e finiti dentro di se stessa, e disposti in maniera che formano un bel muscolo entro al suo seno. E'I centro di questo muscolo da cui come raggi tutti i lacerti partono, che per l'interna concava superficie della conca si distendono, esce dal mezzo in sopra del margine anteriore dell'ostio venoso del destro ventricolo ben carnuto sempre e pieno, e d'un sol pezzo unito, e non di rado più che non il suo resto biancheggiante, massime se sia stato tenuto alcun tempo a macerarsi nell'acqua. E nella infinita varietà ch' io trovo nella grandezza, nella direzione, e nelle forme di tutte le parti del cuore ne' diversi soggetti della spezie umana, a modo che una perfetta fimiglianza, e corrispondenza, nè ne' feti, nè negli adulti tra due soli soggetti, dopo tante offervazioni, non ho mai potuto fin oggi riconoscere, anche questo centro del muscolo della conca del destro orecchio ne' diversi soggetti diversamente si mostra. Tra le quali diversità spesso una ne occorre d'elegante prospetto, ed è che talvolta quel centro carnoso dall' indicato suo principio a guisa di piramide si stende in mezzo alla conca, da' lati della quale piramide a guisa d'una palma a dritta, ed a manca escono i lacerti, che verso il destro margine della conca ordinatamente si portano. Tutti questi lacerti corrono da finistra a destra obliquamente in sopra, verso il destro pariete del seno, non già a guisa de' denti d'un pettine, come altri ha creduto, paralleli, ma prima divergenti, poi verso la fine alquanto convergenti. Io chiamo muscolo della

conca ( Tav. XVII, eeee ) del destro orecchio del cuore quest'ordine di lacerti tanto fingolare. E chiamo bicipite del destro orecchio l'altro muscolo che rimane, de' di cui due ventri uno è superiore ( Tav. XVII, cc ) ed al cono appartiene, regolando i suoi moti; e l'altro è inferiore ( Tav. XVII, dddd ) ed alla inferior metà dell'orecchio è addetto. Questo ventre inferiore ha maggior grandezza, più nerbo, e lacerti in tutt' altra direzione formati. Questo muscolo ha il suo principio carnoso a destra, ed esce molto dall'alto di sotto al cono ( Tav. XVII, ccdddd ). Scende con un forte e ben carnuto lacerto tra'l destro margine della conca, e del seno, e dopo aver cinta tutta la linea, che a destra, ed inferiormente termina la conca, si dilata in molti, e grossi, e spessi lacerti, che dalla comune origine partendo passano divergenti a stendersi e ad occupare tutta la inferiore metà dell'orecchio infino al cuore. Ed anche esteriormente considerato l'orecchio, e con diligenza esaminato nel confine delle due parti che nella sua interior faccia sì chiaramente si distinguono, ha sovente da sinistra a destra una bianca fascia obliquamente segnata larga di due in tre linee, che mostra come i limiti tra le due metà. Fascia che talvolta inchina al giallo per certa sottile porzion di p nguedine che sotto l'esterior membrana dell'orecchio in quel sito si trova. Chiamo questa fascia obliqua, quando sia manifesta, linea bianca del destro orecchio. In tutti gli spazi che sono tra lacerti sì del muscolo della conca, che del bicipite, da' quali due muscoli tutta l'interior struttura del destro orecchio è compresa, fa la natura uscire da' lacerti maggiori de' piccioli lacerti, i quali fotto la membrana che quegli spazi esteriormente copre, distesi, rendono que' sondi esteriori più resistenti, ed aggiungono sussidj alla forza motrice de lacerti maggiori perchè resistano alla piena impetuosa del sangue con più consistenza ed energia.

XVI Da tante ricerche sin qu' fatte, e descritte per mettere nel più chiaro aspetto, e per istabilire sopra certo

fondamento la ragion positiva onde l'orecchio destro, e'l seno dalla natura formati si trovino per poter dare alle due opposte correnti del sangue venoso entrata separata nel destro ventricolo del cuore in tempi diversi, e successivi, senza collidersi fra loro, e dando l'una all'altra tempo, e comodità di passare, molto apertamente si rileva quanta economia la natura impieghi nel dirigere al cuore il sangue venoso, e come a questa tanto ben intesa direzione presegga, e dia regola la respirazione. Allorchè l'uomo inspira, e trae l'aria nel petto, il diaframma scendendo verso l'addomine da dietro in avanti schiaccia e comprime il sottoposto estremo tronco della cava inferiore, e'l suo estremo orifizio che s'apre nel fondo del seno destro opprimendo socchiude. La valvola Eustachiana che dentro quest'orifizio anteriormente si spande, ottura qualunque residuo di questo orifizio non sia rimaso dal diaframma persettamente chiuso. L'isola si appiana, e toglie ogni argine che la corrente superiore del sangue incontrar possa nel passare al destro ventricolo. Così la corrente superiore piomba libera, e quasi sola in tutto il cavo del seno, passando, quanta ne può il ventricolo ricevere, per la porta venosa. Alla inspirazione sollecitamente l'espirazion succedendo l'isola s'eleva, che il cavo del seno in due divide; l'inferior cava dal ritorno in sopra del diaframma si rimette in libertà dando rapidamente al suo sangue libero passo al cavo inferiore del destro seno. e direttamente per l'opposta porta venosa al destro ventricolo. e si mena seço, e si mescola qualunque residuo di sangue della corrente superiore nel tempo della inspirazione in fondo al feno si trovi rimasa. E ne' due tempi che l'espirazione compongono segue la maggior cava a scaricarsi del fuo fangue, mentre il fangue della cava fuperiore è detenuto col và e vieni dal cuore al capo, e dal capo al cuore. Ed è sorprendente come i due muscoli dell'orecchio destro in un tempo stesso stiano in azione; quello della conça spingendo la superior corrente da sotto in sopra, e'i

### 7 231 W

bicipite menando la corrente inferiore da dritta a manca nel ventricolo destro. Ciò sa comprendere che la corrente superiore senza aver bisogno d'ajuto del destro orecchio, e sossi in tempo del suo riposo, guidata dalla propria gravità, nel destro ventricolo si spinge e passa: e che la corrente inferiore, come più pigra, e contro la propria gravità salendo dell'azion dell'orecchio abbia bisogno per ben entrare nel destro ventricolo. Sono adunque gli orecchi del cuore due cuori impellenti per le vene, come i due ventricoli son dae cuori per le arterie. Ma il finistro orecchio picciolo, e meschino, a quali vene appartiene? Sicuramente al finistro seno, ed all'isola che da questo seno s'eleva nel seno destro, e che dall'azione del finistro orecchio sincrona col destro, e con le due grandi arterie, acrona col cuore, vien prodotta, e sostenuta.

### Spiegazione delle Tavole:

#### Tavola XVI.

Rappresenta scoperto nella natural sua situazione che ha nel petto il cuor d'un giovane, morto di ferita, che gli troncò l'iliaca sinistra, e'l rappresenta di grandezza natur le. Il pericardio è aperto avanti da cima a sondo con un lungo taglio perpendicolare vicino al mediastino, ed un altro taglio obliquo in suora che dalla base scende al mucrone a sin di mettere in prospetto il cuore umano, ed in esso mostrare la posizion perpendicolare del suo destro orecchio con le sue aderenze. Il corpo del cuore è un pò disceso a sinistra per lasciar più distinti i grandi tronchi sanguiseri sopra, ed a destra; ed un pò voltato in dietro.

a a a. Parti del pericardio, che cuoprivan il davanti del cuore, per lasciar in vitta il cuore nel proprio

fuo fito, rovesciate.

bb. Base del pericardio aderente al diaframma lasciata scoperta dalla faccia piana del cuore menata un pò indietro.

c. Apice del pericardio corrispondente all'apice del

cuore.

dddd. Corpo del cuore.

ee. Vena cava superiore.

ff. Parte del destro seno del cuore visibile dal lato del mediassino.

- g. Estremità inferiore del seno destro sotto al lobo dell'orecchio, che riceve il tronco della grande cava inferiore.
- hhhh. Il grande, o sia il destro orecchio del cuore.

iii. Il cono superiore libero del destro orecchio.

k. Il lobo, o sia la libera inferiore estremità del destro orecchio.

~~ 233 UM

lll. La faccia esteriore dell'orecchio convessa, e levigata; benchè a primo aspetto sembri ineguale per la trasparenza dei sottoposti lacerti carnosi.

nmmm. Parte anteriore della faccia convessa e superiore del cuore, che tien sotto di se il ventricolo destro,

o sia anteriore.

Arteria polmonale, che esce dalla sommità posteriore del ventricolo destro salendo da destra a finistra avviticchiato al tronco dell'aorta che gli passa sotto.

Luogo ove l'arteria polmonale, esce dal pericardio

per passarsene a' polmoni.

p. Ramo dell'arteria polmonale, che per dietro al tronco dell'aorta, e della cava superiore, passa al

polmone destro.

qqqq. Tronco dell' aorta che esce dalla sommità del ventricolo finistro del cuore, e sale per uscire dalla sommità del pericardio, col tronco dell'arteria polmonale un poco attorcigliato.

rr. Ligamento trasversale celluloso adiposo del tronco

dell' aorta.

Distanza fatta nascere tra l'aorta, e la cava superiore che naturalmente sono in contatto, col trarre un peco il corpo del cuore a sinistra, a sin di discernere i loro limiti, e di sar vedere i luoghi sottoposti.

### Tavola XVII.

Presenta il cuor d'un uomo di circa sessanti morto di ernia incarcerata, e cancrenata. L'orecchio destro è persettamente distaccato dalla parte anteriore, e superiore del cuore per vedere aperto il seno destro, e la struttura lacertosa della faccia interna del destro orecchio.

- ana. Estensione intera della interior faccia del destro orecchio.
- 1666. Luogo del taglio che l'ha distaccato dalla unione col cuore.
- ce. Ventre superiore del bicipite dell'orecchio.
- ddd. Ventre del bicipite, inferiore.
- eeee. Muscolo della conca.
- ff. Seno destro.
- Luogo ove più l'isola s'eleva, dietro al quale è il seno sinistro del cuore.
- hh. Sboccatura nel seno destro della cava superiore ii.
- & Sboccatura della cava inferiore.
- Valvola d'Eustachio intiera, e non forata come fovente s'incontra.
- m. Orifizio della gran vena coronaria.
- n. Principio della valvola tricuspidale posteriore.
- e o. Sue cordelline tendinose.
- pp. Principio del ventricolo destro del cuose aperto.
- q q. Tronco dell'aorta.
- ess. Parti di pericardio rovesciate.
- www. Corpo del cuore.

# MEN DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

### - XIK

### OSSERVAZIONI

SUL CYTINUS, SULLA STELLERA PASSERINA E SULLA CERATONIA

### DEL PENSIONARIO DON ANGIOLO FASANO

Comunicate alla R. A. l' anno 1781.

Gli è gran tempo che io cercava opportuna occasione da esporre al mondo letterario alcune poche mie osservazioni su quel ramo di storia naturale che Botanica è appellato. Or quale più opportuna e più bene avventurosa osserir mi si poteva di quella, che questa R. Accademia, mercè la sana provvidenza del nostro Sovrano istituita, oggi mi presenta? Certo che altra niuna. Esporrò dunque ora ben volentieri a questa rispettabile adunanza, e conseguentemente al pubblico tutto, le Osservazioni da me satte di alcuni nuovi caratteri scoverti sul Cytinus, sulla Stellera passerina e sulla Ceratonia, il sistema sessivale di Linneo seguendo.

Mentre io nell'anno 1774 dimorava in Pisciotta terra posta sulla cima di una collina lungo il mare, tra l'Alento e Capo-Palinuro, ebbi la sorte di scovrire nelle predette piante i nuovi caratteri, che a suo luogo si esporranno. Ne seci allora partecipe il nostro Collega il Sig. D. Niccolò Pacifico; e nell'anno seguente gli mandai di là le piante fresche del Cytinus, assinche sosse sono parimente

testimonio di vista di quanto di questa bella pianta io gli aveva per lettere significato. Si ritrovava in quel tempo in qualità di viaggiatore naturalista in questa capitale Adolfo Murray, il quale essendo andato a fare una visita al Pacifico, ne su egli opportunamente anche ocular testimonio, mercè la gentilezza del dotto nostro collega, siccome questi poi per lettere me n'avvisò.

Questa graziosissima pianticella, per gli caratteri di cui la natura l'ha particolarizzata, allogar si dee nella classe Monoccia Gynandria ove anzi ivi forma il nuovo ordine Dodccandria, ed in conseguenza un genere tutto nuovo. I caratteri di Monoecia Gynandria sono in essa di condizione tale che non fanno equivoco a cuno. E quando mai si stimasse, giusta il sentimento oggi di alcuni valentuomini, mandarla nella rispettiva classe Dodecandria, pure essa per gli caratteri che possiede meriterà sempre il luogo di nuovo genere. Resterà in tanto a ciascuno l'arbitrio di allogarla ove egli stima più a proposito: io l'allogherò nella Monoecia Gynandria, non ancora avendo bastanti ragioni, a misura del mio talento, da rimaner persuaso che le quattro classi Gynandria, Monoecia, Dioccia, Poligamia nel sistema sessuale sieno superslue, importune e inutili. Quante volte la natura ha voluto quelle quattro famiglie particolarizzare per caratteri proprii, e con ciò diversificarle e separarle dalle altre, io non intendo per quai motivi si abbiano da supprimere, rimescolando generi e specie, colle rispettive classi e generi. Picciole aecidentali aberrazioni, che ben si possono così dire, di cagioni estraordinarie, che nelle altre classi si osservano sulla fruttificazione, non ci devono far lasciare di veduta, ed abbandonare l'ordinario costante ordine della natura, e con ciò rimescolar le classi che son opera di ordine di natura. Non è qui luogo di discorrere a lungo di si dilicato punto; e forse altrove avremo occasione di esaminarlo. dunque la Stellera passerina sarà situata nella Poligamia, e la Ceratonia rimarrà nella sua classe; ma non perciò si 237

toglierà a chi altrimenti stimasse, l'arbitrio di sarne quell'uso che egli vuole. Veniamo ora a darne le descrizioni sì generiche che speciali; avvisando che non avendo oggi la Botanica i termini suoi per le fatiche de' dotti Botanici in altra lingua più proprii che nella latina ( quando in greco non si volesse scrivere ) e che volendo eseguirlo in italiano, bisognerebbe durar satica per sormare e desinire i vocaboli, il che nel nostro linguaggio richiederebbe lunghe satiche, ed il consenso di molti; perciò le descrizioni si saranno da me latine per renderle più sacili a comunicarii a chi ignorasse il linguaggio italiano. Adunque

Cytinus Linn., et Nobis; Hypocistis Turnef, Monoecia

Gynandria Dodecandria.

Flores Masculi et Feminei in eadem planta in fasciculum una collecti.

Masculi medii et numerosiores

Caracter essentialis

Mafculi

Col. Involucrum diphyllum Periamhium monophyllum, tubulato-campanulatum. Corol. Nulla nisi Perianthium

Anthere sendecim circum apicem. Styli sessiles

Foeminei.
Col. Involucrum diphyllum.

Perianthium monophyllum, infundibuli forme, superum.

Corol. Nulla nist Perianthium

Peric. Bacca infera, octolocularis polyfperma.

Utrifque tubus calycis sive Perianthii in cellulas sive Nettaria quatuor in longum divisus; stylo intermedio: Glandula quatuor, singula singulis cellulis ad basim styli adnata.

Caracter naturalis

Flores Masculi

Col. Involucrum diphyllum, perianthio brevius, foliis oppositis, adpressis, subcymbiformibus carinatis.

Perianthium monophyllum, coloratum, tubulato campanulatum, Jubcoriaceum. Tubus subinfilatus: limbus erecto-patulus, quadripartitus, laciniis subovatis.

Corol. Nnlla nisi Perianthium

Nectaria quatuor, sive Tubus Perianthii in cellulas quatuor in longum divisus in crucem dispositas quaque sub laciniis; disseptimentis stylo intermedio junctis. Glandulæ quatuor, magna, renisormes, coloruta, singulæ cellulis singules basi styli adnata

Stam. octo. Filamenta nulla: Anthera sexdecim oblongo teretes, bivalves: bina segmentis singulis octofidi

apicis styli sessiles, bivalves, infra stigma.

Pist. Perianthio brevius: Germen omnino nullum: Stylus cylindricus, rudis; apex majusculus, subovatus, octofidus, segmenta bistriata: Coronula octodentata, acuta, Stigma representans.

Fæminei grandiores.

Fasciculum masculorum ambientes

Cal. Involucrum diphyllum perianthio brevius, foliis oppositis, adpressis, subcymbiformibus, carinatis, ima

parte angustatis et Germini adnatis.

Perianthium coloratum, monophyllum infundibiliforme: tubus cylindrico-tetragonus, rudis, angulis inferne instatis. Limbus erecto-patulus, quadripartius, laciniis obtusis.

Corol. Nulla nisi Perianthium

Nectaria et Glandule ut in manibus:

Pistil. Perianthio brevius: Germen inferum. Stigma majusculum, capitatum, vertice deprasso, octofidum;

striis compressis, convexis.

Peric. Bacca magna calyce coronata, infera, glubofa, octocoftata, coftis quatuor alternis ofcuris; octofocularis. Semin. Numerofa, minuta, fubrotunda, vesiculis gummiresima plenis nidulantia: Plante huic omnia sero una cum ipsa junctim marcescentia; salvis seminibus.

## 239

Observatio

Numerus Antherarum, segmentorum apicis styli, partium stigmatis simul quarta parte major quandoque in masculis.

### Tabul. XVIII Fig. I Explicatio

a. Flos Fæmineus

b. Involucrum diphyllnm parte inferna adnatum Germini.

c. Perianthium

d. Germen inferum

e. Folium involucri separatum

f. Polium interdistinguens stores

g. Stylus cum stigmate

h. Flos masculinus

i. Involucrum

k. Stylus

1. Antheræ circa apicem styli sessiles

m. Coronula octodentata stigma representans.

s. Fundus tubi perianthii cum

glandulis bast styli adnatis

o. Folium separatum slores
interdistinguens

p. Stylus auctus

q. Flos Fæmineus maturus

r. idem

Lidem limbo perianthii spoliatus

t. Involucrum diphyllum bacca parte inferna adnatum.

u. Bacca medio transversim disseda ottolocularis

V. Seinen

x. Tubus perianthii in cellulas quatuor in longum divisus sive Nectaria.

Descriptio

Radix longa plus minus lineas duas, lata fere tantundem; lignosa, verruca similis, radicibus Cisti inserta.

Caulis clavatus, palmaris, sesquipalmaris, plerumque subterraneus, uno storum fasciculo extante ab imo foliosus, slavescens, fragilis, succulentus, ut planta tota.

Folia imbricata squamisimilia, fere linguiformia, adscendendo longiora tenuiora, eroso-denticulata, glabra subterranea sordide pallescentia; entantia medio deorsum lutea, sursum late chermesina, oris supremis plerumque astulatia.

Flores in fasciculum terminalem colletti, lutei, hispiduli.
Masculi medii vix eminentiores; duplo circiter numerosiores, minores, vix pedunculati. Fæminei sessioles fasciculum masculorum ambientes. Omnes interdistinati soliis ipsis Floribus brevioribus, supremis caulinis similibus, basi Fæmineorum, et pedunculorum masculorum sessioles.

Nestaria vix barbata: Glandula primo virescentes; porre

fulve, dure.

In Masculis apex styli octofidus, sed singula segmenta bistriata; singulis striis Anthera singula in longum sessiles, candida. Coronula octodentata, dentibus acutis, erectis, vel conniventibus, stigma represaentans, alia omnia ut in Generis descriptione.

Sapor amero-flipticus, odor nullus,

Floret Majo: anno longius radicibus Cifti insidet; porre arefasta, contractaque radice, ibi relista fovea, excidit;

fragilis, ficca, colore ufulato.

Questa pianta nel principio di sebbrajo comincia a comparire a livello della superficie della terra screpolata dalle sue spinte; e lentissimamente sino alla sine di aprile e maggio si vede avanzare; in questo mese poi tutta velocemente si compisce. Or sebbene per questo mese tutta tutta si sviluppi, intanto le semenze, come quelle che son principio di suturi nuovi soggetti, non hanno acquistato ancora il loro compimento. Esse si annidano per questo tempo in una polpa vescicolosa piena di una bianca mucilagine, la quale a mano a mano passa in un succo simigliante ad una terebentina colante e delicata, e propriamente in una gommaresina, ma senza avere odore alcuno. Quest'opera sa la natura dalla fine di maggio per tutto giugno, nel qual tempo le semenze si perfezzionano.

Le bacche restano perpetuamente sul gambo; e quando tempo è di buttar le semenze, comincia la corteccia ad intarlarsi, e così poi screpolandosi ad aprire l'uscita alle

femenze;

semenze; ma queste per altro non iscappano, se quel loro ricettacolo polposo non è tutto bene inaridito. Se poi queste si disseminino nella state dell'anno della fruttissicazione tressa, o nella state dell'anno seguente, io non ne ho decisive osservazioni: posso però dire che l'apparecchio anzidetto richiede molto tempo, e che dissicilmente può ottenersi nel resto della state dell'anno della fruttissicazione, e che le bacche possono durare ben lungo tempo senza corrompersi, custodite da quel succo resinoso di cui sono imbevute.

Per qual via poi penetrino fino alle radici de' cisti, non è facil cosa deciderlo. Io sono nell'opinione del Turnesort che, quanto dire, si insinuino le semenze per le screpolature del suolo intorno; venendo questa pianta su i cisti, che nascono ne' luoghi caldi e sabbionosi, e lapillosi, onde facili a crepolare; come appunto viene ne' cisti del nostro Regno. i quali nascono in luoghi caldi, il cui terreno è misto di sabbione e lapilli; ed in que' cisti che nascono in terreno di diversa natura, cioè denso e legato, non si vede che rarissimo, o non mai. Ed è bene aggiungere che intorno al pedale de' cisti ove confina col suolo, si vede quasi sempre distaccato il terrreno circolarmente, e quivi formarsi una fossa a guisa di un imbuto in tempo di state, nel prosciugarsi il terreno; o pure per lo dimenamento di essi cisti a cagion de' venti; il che si offerva intorno al pedale di altre piante ancora, dove col suolo quello confina; onde è che per questa via possono assai bene e più facilmente penetrare le semenze: ed in fatti il citino trovasi più che altrove numeroso nella ceppaja, o poco più all'ingiù.

In oltre confiderando che ciascuna pianta di citino porta da quattro in sei bacche, e che ciascuna di queste ha seicento in ottocento semenze; per un numero si grande di semenze rimescolate con terreno mobile, può benissimo avvenire di avere alcune di esse l'occasione opportuna, che col terreno medesimo pervengano alle radici de' cisti, e salve, anche a capo di lunghissimo tempo, per lo savore di quel succo

Hh

refinoso di cui sono spalmate, che le garantisce. E per altro di sì gran numero di semenze non ne vengono che dieci in trenta piante, siccome si osserva sotto le piante de' cisti, ordinariamente non solitarie, ma per gruppi a radici contigue.

Pervenute le semenze alle radici de' cisti, il glutine che le spalma, sebbene prima secco, dall'umido poi e calore insieme del suolo ravvivato, le attacca alla corteccia delle radici; or queste semenze sottentrano nella corteccia, e nella parte legnosa s'insinuano, ove sviluppano le radici: in qual maniera tal meccanismo si eserciti dalla natura, io non l'intendo; onde ne lascio a più sagaci la cura di dichiararlo. Sono le semenze del diametro di una quinta

o quarta di linea, e di figura quasi rotonda.

Or queste non prolificano nel medesimo anno che si attaccano alle radici de'loro cisti; e nè anche nel seguente anno, e forse neppure nel terzo. Se voi eradicate un cisto nel mese di aprile o maggio, tempo in cui il citino è nel pieno suo vigore e compimento, e nel mese di giugno, voi ravviserete la superficie delle radici del cisto guernita di molti tubercoli coverti totalmente della corteccia delle radici del cisto; e quelli di diverse grandezze: alcuni poco più, o poco meno di un seme di canapa, alcuni alquanto più grossetti, alcuni della grossezza di un cece, ed alcuni anche più: la corteccia che li cuopre tutta simile a quella del resto delle radici, egualmente colorita, fitta e liscia; nè quì vi si rassigura vestigio di forame. Scoprendo i primi della corteccia che li cuopre, vedrete di sotto un tubercoletto elevato nella parte legnosa delle radici liscio e duretto, e di color biancopallido; come anche i secondi: li terzi di color gialletto: i quarti di color gialletto intorno, in cima color rossigno; rappresentando questi ultimi una gemma ben derrata, e senza che essi tutti daisero segno alcuno di prossima molla. Osfervati poi a tempo suo quelli che promettono produrre le loro piante, che sono ordinariamente gli ultimi

notati, si vedono nella soprapposta corteccia screpolati; e spiando l'interno si osservano in forma di una gemma squamosa, e succulenta; e gli altri che tale mostra non danno, pianta niuna producono, e si ravvisano in quelle sorme, le quali nel mese di aprile e di maggio dicemmo vedersi. Da tutto questo si può benissimo rilevare qual debba essere il corso degli altri, ed in qual tempo e quanto lentamente si

sviluppino.

Or dunque non viene questa pianta che sulla radice di diverse specie di cisto, come i Botanici osservano. Io non l'ho incontrata che nel cistus salvisolius intorno di questa Capitale, e propriamente nelle salde delle colline che coronano il Lago di Agnano; e sulle radici del cistus monspeliensis nel territorio di Velia, oggi detta Castellamare della Bruca, e nelle colline di Pisciotta, dove nascono il cistus incanus, il cistus salvisolius, il cistus monspeliensis, e questi due alle volte per vicinanza consondono insieme le loro radici; e pure io osservava che di essi il cytinus con particolarità

amava il ciftus monspeliensis.

Il Turnefort parlando dell' Ipocisto o sia Cytinus che nasce in Creta, dice che sia pianta odorosa; il nostro al contrario, che è la stessa pianta, non ha odore alcuno. Il sapore è amarostittico, e con particolarità quello delle semenze. Le bacche son piene di gommaresina, ma senza odore anche questa: quelle degli individui nascenti sul cifius monspeliensis ne sono abbondantissime, e la succiano da quello che ha un fucco glutinoso molto grato per odore, come lo mostra a suo tempo sulle foglie che imbrattano le mani toccandole, intanto neppure ha odore alcuno. Sicchè le piante parasitiche, sebbene abbisognino di un succo preparato da altre piante per nutrirsi, non è però che questo non riceva più o meno in quelle passando ulteriore mutazione per rendersi opportuno loro alimento le piante parasitiche non sempre portano le medesime qualità delle loro nutrici. Possiamo però dire d'altra banda che H h a

alle volte il succo delle nutrici in passando nelle paratisiche, conserva, anzi spiega, le qualità di quelle in una maniera più netta, spogliandosi di ciò che quelle qualità oscurava, e attutava. In fatti, essendo, pochi mesi sono, capitato in una Drogheria, mi occorse vedere su aleune grossissime corteccie della chinachina un lichene foliaceo di figura circolare, del diametro di una mezza spanna, grossolanamente lacero per l'intorno: doppio una linea, anzi molto meno, di sostanza corjacea, morbido, sopra color lionato chiaro, liscio, sotto venoso e color nero, radicato col centro. Il Droghiere me lo favori volentieri: masticatane picciola porzione, e replicatamente, sentiva uno squisito e netto sapore di chinachina, sgombro di quel disgustoso che suole quella Droga avere: lo feci assaggiare al nostro degnissimo collega il Sig. D. Giuseppe Vairo come troppo competente giudice di tali cose.

Egli è quì da avvertirsi che questa pianta può recare molti vantaggi. Da essa si esprime gran copia di succo, che ispessito è di molto uso per la composizione dei medicamenti, e massime per la teriaca. Or questa droga possiamo lavorarcela noi: e con ciò oltre all' evitare l'inconveniente politico di estrarre suori del regno del danaro per provvedercene, si otterrà il vantaggio d'averla sincera ed esente da ogni adulterazione ch' è troppo facile ad accadere nella forestiera. Di più nascendone nel nostro regno, particolarmente per il littorale meridionale, in tale abbondanza che se ne può avere la quantità che se ne vuole, si ha l'opportunità di estrarne quella copia di succo che ispessito può communicarsi per molte parti di Europa, dove manca questa pianta, e debbono perciò, come noi oggi, provvedersi da fuori del di lei succo.

Veniamo alla Stellera passerina. E' questa pianta una delle due specie del genere Stellera del Linneo della classe ottava: ma i caratteri oggi da me ravvisati sanno che alla Poligamia si debba; nè per ciò rimarrà il genere soppresso

testandone l'altra specie Chamaejasme, la quale, per quanto indicano la descrizione e la figura recataci da Ammano, sono nel sospetto che diverso genere sia dalla Passerina Stellera: voglio dir con questo che l'abito dell'una è totalmente diverso dall'abito dell'altra, che sa sospettare che al medesimo genere non appartengano: sia pure questa congettura qualunque, il certo si è che la Stellera Passerina è di Poligamia, ed in questa classe la situeremo in qualità di nuovo genere, e la chiameremo Ligia.

Passerina. Ligia

( Poligamia Monoecia ( Planta habitu juncearum.

Caracter effentialis.

Flores hermaphroditi

Coroll. monopetala tubulata: Stamina quatuor sub fauce, quatuor tubi medio affixa. Pistillum sundo inclusum. Flores Fæminei

Coroll. campanulato-ventricosa. Pist. Germen evato acutum corolla vestitum.

Omnes in eodem involucro axillari sessiles.

Caracter naturalis.

Flores hermaphroditi et fæminei

In eodem involucro gemmaceo sessiles, basi contigui. Hermaphroditi

Cal. Involucrum tetraphyllum vel polyphyllum axillare; gemmaceum, sessile; foliolis imbricatis, latolanceolatis. Perianthium nullum.

Coroll. monopetala tenuis, tubulata, basi ventricosa involucro longior; limbus brevissimus, quadripartitus, acutus; saun angustata, lacinia laterales proximiores, minores.

Stam. octo; Filamenta brevissima, quatuor sub fauce, quatuor tubi medio affina alternis brevioribus.

Antheræ rotunde.

Pist. dimidium tubi longum: Germen ovato - acutum fundo Corollas inclusum: Stylus brevissimus: stigma capitatum.

Peric. nullum: eius loco Corolla ar facta semini adherens, nec dehiscens.

Sem. unicum, ficcum, rostratum, nitidum, dimidio tubi corolla vestitum, reliquo Corolla clauso superextante.

Flores Faminei laterales

Coroll. monopetala, campanulato-ventricosa, involucro longior; Hermaphroditis dimidio brevior, lateralis; limbus quadripartitus, acutus, brevis.

Pist. tubi longitudine. Germen ovato-acutum. Stylus brevissimus antrorsum incurvatus. Stigma capitato truncatum.

Peric. nullum: Corolla semini adherens, nec dehiscens. Sem. Siccum, rostratum, nitidum, tota corolla clausa vestitum.

Observatio

Flores a decima diei hora ad mane insequentis diei
patentes; diu vero clausi. In aridis locis multa pars
Hermaphroditurum abortat: pistillum in sundo corolla
perpusillum, tabidum.

## Tab. XVIII , Fig. II Explicatio .

- a. Perianthium.
- b. Corolla.
- c. Stamina cum Antheris.
- d. Anthera aucta.
- e. Pistillum pedicellatum Corolla centro implantatum cum Germine
- f. Stigma orbiculare sessile.
- g. Flos hermaphroditus cum corolla et pistillo: stamina desunt, quoniam in longo izinere deciderant, hinc Pistor non delineavit.
- h. Flos Masculus.

Descriptio

Radix palmaris sesquipalmaris, paucis fibrillie ornata,

duriuscula, albida, annua.

Caulis a pede ad sesquicabitum altus, singularis; ab imo foliosus; tenuis, teres, sirmus, pilis adpressis albis adspersus; rami perpauci, ab imo sere plerumque exsurgentes, axillares, erecti vel adscendentes, qui eque ac caulis spicas simplices prelongas, foliosas, floribus remotis, adscendendo proximioribus representant;

axillis callosis ex caule.

Folia sessilia, angusto-lanceolata, integra, glabra, subcarnosa, subtus nervo, supra sulco signata, essia, vel viridia. Caulina sparsa, numerosa, adpressa, adscendendo, ut ima ramea, remotiora; decidendo caulem, et inferne ramos denticulatos relinquentia; utrobique gemmeis axillaribus rudimentis conspicuis. Spicea alterna, ceteris minora, instema, stipulaceis rudimentis axillas esformantibus dilatatis sessilia, bast tereti, albida primum remota, adscendendo proximiora minora; suprema approximata, minima, decidendo spicar stipulaceis rudimentis horrentes relinquentia.

Cal. Involucra axillaria, sessila, triphylla et poliphylla e folia imbricata, lato-lanceolata, integra, subcarnosa, corollis multo breviora, centro dense lanato, una cum

caule marcescentia ac ramis.

Perianthium nullum.

Flores bini, terni, quaterni, quini, quandoque plures centro involucrorum sessiles, basi contigui: Hermaphroditi

medii; Fæminei exteriores et laterales.

Hermaphroditis Corolla duplo longiores famineis, tenues, tubulata, noctu dum patent subcernuae, clausa erecta, basi ventricosa; pilis adpressis albicantes; pulposa, slavorubentes; tubus rudis, limbus brevissimus, quadripartitus diu usque ad decimam clausus, noctu

patens; laciniis planis, acutis, lateralibus minoribus,

fauce lateraliler compressa, patula.

Abortientibus Corollæ clavatæ, pistillum perpusillum, tabidum. Fæmineis corollae pilosæ, erectæ, involucro longiores, slavo virescentes. Hermaphroditis dimidio breviores, limbo quadripartito, laciniis planis, acutis, subæqualibus, sauce patula: Alia omnia ut in generis descriptione.

Floret septembri, octobri: Colles apricos, et loca arida

plerumque amat, ceterum valles non refugit.

Observatio

Aridis, ubi plerumque, que proveniz locis, caulem strictum, pilis albicantem, habitum strigosum presesert; atque folia caulina, ut ima ramea adolescendo dejicit. Contra pinguibus et humentibus caulem elatiorem, laxum, habitumque lete virentem, et folia diutius retinet, ut inter segetes circa silarum, quas inter haud infrequens, observavi; ubi folia caulina prope imbricata, ac ramulos superius gerebat, sed flores multo pauciores.

Caule, vel ramis precisis involucra in ramulos exiliunt,

aliis omnino similes.

Passiamo ora alla Ceratonia. Carlo Linneo non ne conobbe prima che il soggetto maschio e seminino; siccome dal Genera Plantarum dell'anno 1754 si rileva: dopoi l'ermastrodito, come nota nel suo Species Plantarum del 1764 sotto il Genere Ceratonia: Marem, Fæminamque ex australi Europa habui; Hermaphroditum ex Austriæ hortis miste D. Jaquin. Vediamo adunque con quali caratteri Linneo descriva il maschio e l'ermastrodito.

#### Mas

Perianthium quinquepartitum maximum.

Corol. nulla.

Stam. Filamenta quinque, subulata, longissima patentia:

Anthera magna didymae,

Hermaphroditus

Cal. quinquepartitus.

Corol.

Corol. nulla.

Stam. quinque: Stylus filiformis.

Legum. coriaceum polyspermum.

Stimo anche a proposito rapportare i caratteri descritti

da Luduigio de' fiori ermafroditi.

Ceratonia. Ovarium longum pendens; stigmate plano leviter diviso terminatum: insistit thalamo ex sex tuberculis composito, sub quo sex hærent soliola calycina, an potius petala? intra que et thalamum oriuntur sex Filamenta: ceteraque.

Veggansi ora i caratteri della Ceratonia da me osservati,

e prima de' fiori ermafroditi.

Cal. Perianthium monophyllum profunde quinque fidum; coloratum, lacinia inaquales obtusa.

Corol. monopetala rotata, integra, ambitu undulato

coriacea, persistens.

Stam. Filamenta quinque, margini subtus Corolla circumadsixa, vix Corolla longiora: Anthera magna.

Pist. Centro Corollæ implantatum, pedicellatum: Germen .
lineare, compressum; subfalcatum . . . Stylus nullus;
Stigma sessile, orbiculare, planum, e medio sursum
sulco in germen excurrente signatum.

Legumen . . . .

#### Mas

Cal. Perianthium monophyllum, profunde sexfidum, lacinia inaguales, ovata, concava.

Corol. monopetala, rotata, undulata, vel obsolete crenata,

coriacea, persistens.

Stam. Filamenta jen, Corolla triplo fere longiora, patentia, angulis crenarum sub margine Corolla adfixa: Anthera

magnæ, quadriloculares.

Pist. nullum: eius loco parvus apiculus centro Corolle implantatus rùdimentum mentiens. Filamenta laciniis Calycis opposita.

Or questo carattere si deve ben considerare per esser sicuri che sia realmente calice il da me notato, siccome dal Linneo, e dal Dillenio, perchè si veda che Luduigio nel dire folia calycina, an potius petala? a torto dubitava.

I fiori ermafroditi furono da me offervati nel littorale di Palinuro, e di Velia. I fiori maschi mi furono savoriti dal Signor Don Filippo Caulino, il cui valore per la Storia Naturale è troppo ben noto, ed in particolare per l'Entomologia: erano questi secchi, ma i caratteri ben si potevano discernere; ed erano stati da lui colti nella costa d'Amalsi.

#### Tab. XIX Explicatio.

2. Ligia ( passerina ).

Folium cum flosculis in axilla.

C. Stipularum rudimenta, quibus folia infident.

d. Flores hermaphroditi abortientes.

c. Flos hermaphroditus.

f. Flos fæmineus.

8. Corolla hermaphrodita patefacta.

h. Stamina.
i. Pistillum.

k. Folium involucri centro lanato, in que flores infident.

# MURICIA DE SEUR SEUR

## XIII

S A G G I O
GEOGRAFICO-FISICO
SULLA CALABRIA ULTERIORE
DEL MEDESIMO SIG. FASANO

Letto nella R. A. I anno 1785.

Oiche io pensai dovere al pubblico dar parte degli L'effetti e fenomeni de' terremoti, che per gli anni 1783 e 1784 la Calabria ulteriore, come parte principale del loro teatro, e sue vicinanze maltrattarono, mi avvidi che senza prima mettere in prospettiva le disposizioni e qualità di quella regione, ed avvisarne la struttura ed ? materiali che la compongono, troppo difettofo anzi riprenfibile riuscito farebbe il mio discorso; ed avrei fatto eziandio torto a coloro, che per gli terremoti la propria opinione difendono. Per lo che anticiperò io come preparativo un breve faggio preliminare di geografia fifica, giacche le circostanze del nostro viaggio, e la mia inespertezza non permisero più diligenti ricerche. Del resto ancor con maggior comodo e pazienza, non fi farebbe molto avanzato, essendo quella provincia egualmente che la fua confinante un fondo inefausto di ammirazione per qualunque mineralista, e una scuola la più feconda ed istruttiva per qualunque chimico;

e spero mostrare di non ingannarmi nè di esagerare. Intanto mi studierò di mettere in vista con particolarità, perchè di somma importanza, l'interiore struttura di quella regione, struttura che in molti luoghi si mostra per se, e si manisesta. Così benanche perchè fanno armonia col nostro proposito. metterò sotto gli occhi que' cambiamenti che essa sossiri per catastrofi, o private o generali e di vaste estensioni. mostrandone i segni non ancora obliterati, e dileguati dal tempo. E se tali cose, per la condizion della nostra penna, non riusciranno di sodisfacimento al pubblico, gliene dimandiamo scusa. Or chiunque mai ha vaghezza di geografia fisica, e di mineralogia, e di conoscere i lavori: stupendi della natura, ed i mutamenti che quella patì, non trascuri, potendo, di visitare quelle due, provincie, che pur fa meraviglia di effere state molto più alla notizia degli antichi, che de' moderni.

Ora dunque la parte di quella provincia, che da' 27 di aprile sino a tutto giugno di quell'anno 1783 visitammo, e: su cui i terremoti spiegarono principalmente le loro forze, è quella che dal corso del fiume Angitola, che nel golso di S. Eufemia di Nicastro si scarica, e dal corso del fiume Stalattì, che nel golfo di Squillace a levante nel Jonio sbocca, dalla sua parte settentrionale vien divisa; ed è ivi, per ambedue gli opposti golfi, e per l'avvallamento, che la catena delle montagne a lungo là soffrì, a stringersi in forma di gola, e ad abbassarsi venuta; per lo che quella parte si presenta in forma di penisola che da oriente è bagnata dal mare Jonio, da mezzogiorno da quel di Sicilia, da ponente libeccio dalle acque del Faro, da occidente dal Tirreno. Dal golfo di Nicastro al golfo di Gioja sino a Nicotera il mare ha molta profondità. Da Nicotera a Scilla l'ordinaria profondità è di passi dugento, ed in molti luoghi è assai più. Da Palmi al Peloro in molte parti è di circa passi trecento: ed in fondo vi esistono delle grotte che calano in giù a picco per una profondità non facile a scandagliarsi. Il lido tra' due nominati luoghi ha sotto l'onde lunghe caverne. Dirimpetto Nicotera vi è una larga secca, nè ve ne mancano per quella estensione delle altre, e a notabile prosondità rispettivamente. Tra Scilla e'l Peloro il sondo del mare si eleva a guisa di un muraglione, che divide il Tirreno dal Faro, ed attacca ambedue que continenti come per un largo ponte sottomarino, lasciando tra' due capi una bocca larga per miglia due ed un quarto, e profonda dal livello orizzontale dell'onde non più che passi ventotto verso il mezzo. Immediatamente presso quel ponte si prosonda il Faro per ottanta passi sino a Messina, di là in appresso fino al capo dell' Armi viemaggiormente, ov'è una secca a cagione della sottomarina prolungazione della base di quel capo. Siegue il mar di Sicilia fino a capo Spartivento. Viene immediatamente il mare Jonio, la cui profondità lungo quel lido è anche notabilissima, come di passi ordinariamente in circa trecento: ed ha per intervalli delle fecche. Sotto Siderno nella marina di Gerace havvene una a picciola profondità, che serve di commodo ancoraggio a' mercatanti. Quel lido si prosonda di tutto a linea: dal che risulta il vantaggio che ogni sorte di legno può quasi per ogni dove afferrar terra ed appoggiare.

Questa penisola termine del Regno di Napoli, in lungo da tramontana a mezzogiorno può stimarsi di miglia sessantaquattro in circa, in largo da oriente in occidente di miglia trentadue compensatamente; onde la sua base è di duemila quattrocento miglia quadrate. La gola tra i due golsi è circa miglia quindici. La catena degli Appennini da grecotramontana verso libecciomezzogiorno estendendosi sino sul mare di Sicilia a lungo la divide : avvicinandosi sempre molto più sul Jonio che non sul Tirreno. L'estrema porzione, che n'è detta Aspromonte, ha molte bislunghe irregolari appendici che si rivolgono verso ponente. L'altezza maggiore di quelle montagne non oltrepassa mezzo miglio, anzi ordinariamente

è molto minore.

A ponente ha essa un'ampia valle detta comunemente la Piana, (forse meglio si direbbe la Chiana) che da Monteleone fino alle radici dell'Aspromente, che vale da fettentrione a mezzogiorno, ha miglia trenta in lungo, in largo poi dalle radici del Caulone fino alla marina di Gioja da oriente in occidente miglia dieci. Da oriente è cinta dalla catena di quegli Appennini, la quale ivi forma una parziene di curva ellittica, guardando col suo concava l'occidente; e per maggior chiarezza, da mezzogiorno verso tramontana contando, è cinta dall'Aspromente, dal monte Caulone, dal monte Jejo. Dall'ultima parte del Jejo a tramontana sporge verso ponente un braccio in filo di colline ( bagnato a tramontana dall' Angitola ) che verso Montescone ne viene a Bivona, indi vieppiù abbaisandoss piegando verso mezzogiorno per lo Poro sino a Nicotera, il mare radendo si spinge. Così parimente l'ultima parte dell'Aspromonte a libeccio, piegandosi alquanto verso ponente, gitta indi un braccio, che verso maestro si spinge, e sempre più incurvandosi si prolunga verso tramontana, terminando col nome Monte S. Elia in Palmi (il lato del di cui monte a ponente cala a linea în mare în una profondită notabilissima ); ond' è che tra Palmi e Nicotera termini dei due bracci, resta interrotto il contorno di quella valle per una porta di circa miglia otto di apertura; per dove l'ampio piano del suo sondo termina nel hassissimo lido del golso di Gioja. Ha dunque quella valle la forma di un bacino ellittico, e soprattutto guardata da luogo emanente potrebbe credersi di antichissimo vulcano. Ma per quanto si potè ritrarre dalle osservazioni ivi fatte giusta le circostanze del nostro viaggio, fiamo nell'opinione che prima fuile stata quella una valle sottomarina, e forse da ogni banda chiusa; che poi ritirandos le acque fusse patsata in un lago, indi palude, e che cirez questo tempo, parte del suo aminente recinto e de' monti contigui fusse scoppiata in vulcani: e così poi fosse in parte divenuta cratere vulcanico, siccome oggi ancora fi può ravvisare, e noi a suo luogo ne descriveremo i caratteri.

Il corpo di quella estrema porzione di Appennini in gran parte anche rappresenta il suo primitivo meditullio: ma di qual epoca del mondo? Confessiamo non saperio definire. Cominciando dal Pittaro estremo suo termine sul Faro, e verso greco scorrendo, non è quel meditullio formato che per istrati di tario sulla medesima direzione. e ben grandi, per ordinario perpendicolari all'orizzonte, o poco inclinati, ficcome per le profonde valli si può ravvisare, e di strati dico del Saxum Roroesiense del Linueo, che hancheggiano gli strati quarzosi, e gli vestono. Nel fossato di Valanidi attraver ato dal fiume Adda ramo di ello Valanidi si offervano uno o due strati verso la metà della loro altezza torcersi come violentati, e inclinarsi quasi dei sutto full'orizzonte, ma ivi si comosce per violenza di malche accidente ciò avvenuto. Il saiso detto è composto di minutissima mica nerognola e d'altri colori, e di grani grossi di quarzo, possiam dire in dote eguale; alle volte ha dell'argilloso, ma la mica sempre domina: s'incontra per alcuni luoghi formato come di sottilissimi strati, e la mica variar di colore. Sono alle volte fiancheggiati, ma non vestiti, ed accompagnati dal Saxum Trapezium, e dal Corneus Trapezius, siccome si otserva a sevante del Jejo: e non manca incontrarsi il Saxum Ferreum: i quali tre fossili spesso si confondono alla vista, e sorse anche per la mistura.

Il più frequente e copiose materiale è il granito; ma questo non si osserva formare l'interna offatura di quelle montagne, come gli strati suddetti: e molto di raro s'incontra per l'interne valli, e sempre appoggiarsi su quegli strati. Fa meravigl:a però vedere la parte occidentale di quella regione quasi per ogni parte, ed in profondità che oltrepatia di molto il piano del mare, formata tutta di granito sino alle cime delle montagne; ma bisogna però dire che appoggia su i fianchi di quel meditullio stratoso predetto; nè mai si osserva sormare strati, ma per ogni dove è per blocchi

cumulatizii.

Or merita avvisarsi che cotesto samoso sasso comincia alla scoverta dalla metà del littorale sul Tirreno della Calabria citeriore e si estende, senza interruzione, come superba trinciera, o muraglione sino a capo Cenide nel canale di Messina: e ripiglia il suo corso nel littorale della prossima Sicilia. Ed è qui luogo di dire che il più vistoso e pregevole granito noi l'offervammo nel littorale di Belmonte, e propriamente nel fiume Vere. E' qui tutto robusto, e'l sua feldspato spetto colorito o in rosso o in celeste, ed alle volte sono uniti in compagnia tali colori, che accompagnati dal nero delle miche o scirli, o dal bianco del tarso, rendono quel fatfo atfai vago e vistoso. I blocchi o pezzi sono spetso di notabilissima grandezza, e se ne incontrano dei traversati di diverse vene o di tarso, o di seldspato più di frequente. S'incontrano ivi eziandio de' porfidi, e de' piccioli pezzi di tarso di color celesté, o violetto assai vaghi. Ma la cosa più vantaggiosa e notabile di quel tratto si è che s'incontrano per le rive e coste de fiumi di belli e lunghi Arati del Fluore minerale tinto spesso a color di viola, o ametistino. In Nicotera parimente è cotesto granito molto lodevole, massime per la grandezza de' pezzi, ma non ha il pregio de' coloriti di quello di Belmonte; ha però un bel nero per la frequenza della mica basaltina. Di egual condizione sembra quello di Palmi. In questo luogo però si ravvisava un certo che in que' pezzi che dava sospetto di vulcanico.

Or siccome per le littorale si osservava di lega robusta e di sorte impasso e di completa cristallizzazione il tarso e I seldspato suoi cossitutivi; così al contrario per le alte salde delle montagne si vedeva per lo più fragile e debole e incompleta la cristallizzazione: ed aver molto poca mica, e tutto insieme essere di colore smorto, e'l feldspato quasi farinoso. Molti edisizii di quella Calabria erano sabbricati di questo sasso. I due celebri Monisteri S.: Stefano del Bosco, e S. Domenico Soriano, erano nella massima parte di pezzi di taglio

taglio di questo sasso. E' però da notare che suori della sua cava esso si rende più robusto.

Avendo parlato del granito, l'ordine porterebbe di far parola del calcareo, e delle argille, come ultimi termini della formazione di quelle montagne: ma di ciò in appretto, riuscendoci qui più opportuno parlare di que' materiali che sembrano suori del tempo della formazione di quella catena: onde diciamo che un quarto de' materiali di quella regione, riguardando ambedue le sue coste, sia tutto adjettizio, ovvero posticcio e di una età di lunga mano posteriore alla sormazione di quella catena; materiale che o il mare deposito posteriormente e vi lasciò poi ritirandosi, o vi buttò in occasione di gran rivoluzione. E ciò si ravvisa eziandio per tutta la costa occidentale della Calabria citeriore.

Or quell'ampio e profondo animatfo di granito, che dall'Angitola fino a capo Cenide il lato occidentale di quella regione da noi scorsa per ovunque ingombra, ha per quafi tutta la sua estensione delle lunghe e profonde coverture di diverse sorti di materiali, la cui massima parte, come io credo, o vi fu buttata dal mare, o depositata, e parte anche nacque nel luogo medesimo. Una gran porzione ne sanno le marghe, che sono figlie della risoluzione e decomposizione de' testacei, e delle argille marine: ed hanno ove più ove meno dell'arena: e con ciò sono ove più ove meno indurite. Ne' luoghi più profondi e prossimi al granito s'incontrano frequentemente in consistenza tufacea. Le arene assai frequenti sono o del tarso o del feldspato, rimescolate mai sempre di miche: son parte angolose, parte rotonde, ed alle volte anche colorite: s'incontrano o di quà o di là sparse, o far di grossi cumoli. Ma quella che è in soprabbondanza, è l'arena marina. Questa non solo si trova sparsa per diversi luoghi, ed in alcuni in cumoli notabilissimi, ma spetso s'incontrano colline, il cui corpo è per intero formato di coteste arene mescolate con testacei. Verso le sorgenti del Cumi ad occidente di Monte Cocozzo sono

colline di tal genere alla scoverta, e così parimente in altri luoghi: ma i frequenti tagli e squazci prodotti dalle scosse del terremoto, ed i grandi e lunghi sconvolgimenti del suolo, ci hanno apertamente dimostrato che il sondo di quella valle non è che un ammasso d'arena di mare e di testacei, che giungono sino alle più eccelse salde di quelle montagne, ricoverto oggi in parte di terre vegetabili e di ammassi di ciottoli, materiali parte dilamati dalle montagne, e parte nati ne' luoghi medesimi.

Che quella fusse stata un tempo una valle sottemarina, non pretendo io ritrarlo dalle colline di arena di mare, nè dall'immenfa copia di testacei oggi nella massima parte già risoluti e decomposti. Poteva per una catastrose avvenire che'l mare ve l'avesse buttati e lasciati. Ma nel luogo detto la Piscina a mezzogiorno di Monteleone, che si eleva sul piano del mare circa una quarta di miglio, si trova uno strato di madrepore radicate, ed in conseguenza nate su quelle pietre calcaree ivi esistenti. Sono questi litofiti animali fissi, che nascono e si radicano su altri corpi e ivi vegetano, e crescono. Erano tali madrepore ben grandi e già quasi mezzo resolute. Non furono queste là certamente dalla rivoluzione dell'onde trasportate, nè potevano ivi nascere e vegetare, se non avessero l'onde quel luoghi a lunga e quieta permanenza occupati. Tali litofiti spesso anche s'incontrano per le rupi calcaree del nostro littorale sul Tirreno, ben radicati, e fissi.

Dal promontorio di Palinuro sino a Fuscaldi nella Calabria citeriore tutte le rupi calcaree di quella costa, che scendono sul lido, sono dal livello il più basso del lido o dell'onde medesime, tutte sorate dal Mytilus Lithophagus e per comodo del nostro discorso diciamo Foladi, e guarnite da quelle ne' loro sorami ancora in molti luoghi esistenti, ma per lo più petrisicate. I sorami che quelle sanzo non sono prosondi più di due once: e cominciano a sorar la pietra sin dacchè nascono, ed in quella si pascolano e vegetano, e

secondo che van crescendo, amplificano le loro case, nè si situano e vivono che tral flutio e riflutio ordinario dell'ende: ed al più dentro di due once nella corteccia della rupe non mai s'incontrano. Ed è ben d'avvertire e considerare che le pareti di quelle rupi, ove esistono tali animali, son forate da su in giù succeisivamente, vogliam dire, senza frapposti intervalli, e che que' forami da giù in su riguardando, a proporzione che vanno falendo, si ravvisano per lo consumo della pietra all'aria scoverta, consumo troppo lento e tardo nella profondità semprepiù minorati, sintanto che si veggono come scomparire ed obliterarsi. Or da tutto ciò si ritrae che le acque dovettero a lunga permanenza stazionare su que'luoghi; e che non per repentini abbassamenti e ritirate, ma troppo lentamente, e per corso di secoli dovettero abbandonarli. Laonde quella valle dovè anche essa esser sottoposta alle acque, che poi a mano a mano parimente l'abbandonarono: e che nel corso di cotesta lenta ritirata fusse passata per diversi stati: onde che il suo sondo o tutto insieme, o per distinte e separate contrade, susse divenuto o uno o più laghi, indi palude: imperocchè s'incontra per molci e diversi luoghi della sua bassa estensione il Ferrum paludosum e per istrati.

Potè anche accadere, e non è fuori di ragione, che quella contrada dopo la prima nativa stazione delle acque, in appresso per catastrose sopravvenuta, susse stata nuovamente occupata dalle acque, e che vi avessero o buttato o depositato quel materiale in gran parte di testacei, che ambedue le

sue coste smisuratamente ingombra.

S'incontrano per le falde si della costa della Calabria citeriore, come della ulteriore sul Tirreno, lunghi tratti o occupati, o sparsi di grossi massi del calcareo testaceo; o quelli come appoggiati sulle falde delle montagne, e non mai con esse annessi o incorporati. Mostrano quelli per la faccia esteriore tutte le qualità e caratteri del calcareo commune, che quasi forma tutta la catena delle Alpi e

Kk 2

degli Appennini; ma poi son molto fragili, e come farinosi e di sostanza tufacea, rispettivamente tenera, o vogliam dirla immatura, e non di rado si ravvisano in essi gli elementi, o sieno le particelle costitutive delle loro masse non ancora totalmente risolute e calcinate, onde ben vi si conoscono i minuzzoli de' testacei. In alcune contrade esistono tali massi, de' quali porzione è tutta calcinata, porzione mostra i testacei soltanto mezzo risoluti. In altre si osservano eziandio de' lunghi e prosondi ammassi per intero di calce testacea, o arena concacea. La costa sul Jonio in gran parte ha intere colline, o per lo meno della metà in su sl'altra metà o parte essendo ordinariamente, per quanto l'esteriore dimostra, argillosa) di arena concacea o calce testacea, come anche lunghi altri tratti della stessa qualità, e spesso in compagnia di marghe di tal condizione partecipi. Reca in vero maraviglia scorrere con una occhiata fulla marina da Capo-Spartivento, e massime da Capo-Bruzzano fino alle vicinanze di Stilo per un tratto di più di trenta miglia, una lunga fuga di colline tutte bianche, che meritevolmente si potrebbero chiamare colles Leucopaei.

I colli Calabresi hanno pochissimo calcareo commune, e soprattutto sulla costa del Tirreno, onde quando incontrano fulla marina degli strati di calce testacea ben compatti, come nella Rocchetta si osservano, gli tagliano in pezzi, e gli cuocono per poche ore in calcina per servirsene nelle loro fabbriche; ma riesce di poco buona lega, anche per la condizione e qualità delle pietre. Quindi è che in molti luoghi, come per la bassa Piana, fabbricano le loro case di mattoni crudi, che sollecitamente sormano d'una terra ordinariamente composta di un'argilla di color fosco e di una dose quasi uguale di arena. La città di Rosarno era quasi tutta fabbricata di cotesta sorte di mattoni, come le case de' poveri di Tropea. Chiamano tali mattoni Brest, e la terra onde gli formano Taju.

In territorio di Terranova e di Melochio per le basse radici del Caulone s' incontra una calce testacea tutta farinosa e gentile di color bianco misto di piombino, o livido. A Spilinga si ha parimente una calce tutta gentile e farinosa di color bianco pallido, che io sospetto esser prodotta da' materiali spatosi piuttosto che da testacei.

Or fe le montagne calcaree son esse, se non in tutto, in gran parte certamente, figlie della calce animale, e propriamente de' testacei, ed i calcarei or ora descritti lo sono già infatti, perchè mai la sostanza di quelle montagne è tutta ben consolidata e dura, e quasi che cristallizzata, ed al contrario quella di questi calcarei molto fragile, e quasi tenera, e possiam dirla anzi immatura? Quelle si formarono certamente e consolida ono insieme stazionando sotto le acque del mare. Per lo che dobbiamo dire che dovè intervenirvi un principio, o sia mestruo consolidante, non bastando la sola pressione, per quanto lunga si voglia supporre per ridurre la di loro fottanza a quella indole, mestruo, di cui dovettero abbondare ne' primi tempi quelle acque, e che valse a ridurre le montagne calcaree a quello stato e natura in cui oggi le offerviamo: e conseguentemente che i calcarei descritti che si veggono semplicemente appoggiati fulle falde delle montagne, e tutta l'altra calce, non ebbe una sissatta secondazione, o per mancanza o povertà di questo principio, o perchè non istazionarono quanto doveano come quelle, sotto le acque; e forse per ambedue queste mancanze non poterono acquistare lo stato ed indole della sostanza di quelle. Laonde dobbiamo stimarli di un tempo molto posteriore alla formazione delle montagne.

Che le acque del mare posseggano ancor oggi un principio consolidante, e forse anche trasmutante, parmi che le osservazioni lo dimostrino. Imperocchè si osservano per lo lido alcune porzioni del continente composte p. e. di calce ed arena, delle quali la parte che è sommersa, o bagnata dall'onde, è tutta ferma e ben consolidata, ed al

contrario fragile e tenera quella che è fuori del bene ficio dell'onde: condizione che non la riceve dall'aria ambiente, imperocchè anche molto in fondo nelle fue viscere, ove l'aria non ha avuto accesso alcuno, tali qualità di tenerezza e fragilità possiede. I Tropejani tagliano le macine da mulino nella loro marina sotto le onde: e son quelle composte di piccioli ciottolini e d'arena, ed in buona parte anche di testacei; e tutto si osserva ben sortemente compatto e legato, ed i testacei induriti a segno che resistono assai bene, e per notabile durata di tempo, allo scambievole strosinio della rotazione delle macine; materiali che suor dell'onde non acquistano tale condizione, soprattutto l'indole della cristallizzazione.

Adunque bisogna dire che que' cumoli di calcarei testacei, calci concacee e testacee, arene di mare, marghe, e testacei, che ingombrano le due coste di quella regione, o furono depositi lasciati dalle acque che a mano a mano, o da tempo in tempo, siccome la corteccia del globo, da la elettrica anima che tutto l'informa, andava spandendosi ed amplificandosi in maggior volume, si ritiravano nelle valli e crepature che si formavano, e con ciò lasciavano scoverti i lidi, dopo aver già quella corteccia del globo fottomarino acquistata la consolidazione che osserviamo oggi ne'continenti, e le acque già spogliate di quel pronto e forte principio consolidanté, onde è che oltre i testacei semoventi, i sisti eziandio sì per gli bassi luoghi, come per le alture incontriamo; così richiedendo l'economia che di questo globo prima si fuise la sua corteccia rassodata e consolidata, almeno per quella parte che bisognava, perchè i viventi che dovevano poi abitarla avessero avuto ricovero e sostegno per la di ·loro vita già preparato dalla natura. O pure senza abrogare l'economia anzidetta, furono que' materiali per forza di catastrofi nel corso de' secoli accadute, che sollevarono l'onde ed insieme i fondi de loro mari, slanciari ed appoggiati sulle coste di quelle montagne, che erano state già sotto

le onde: e che sebbene sussero scorsi molti secoli, non poterono acquistare le calci testacee quell'indole e consolidazione che le montagne calcaree posseggono, per mancanza di quel mezzo che avesse loro potuto comunicare quel principio consolidante, quali sarebbero state le acque del mare. In alcuni luoghi soltanto, ove le acque terrestri imbevute di un tal principio le hanno incontrate, le troviamo consolidate e critiallizzate.

Da Scilla fino al Pittaro la costa littorale, da due sino a quattro miglia entro terra ferma, è un continuo e profondo ammasso di ciottoli di diverse specie e grandezze, ed in gran parte rotolati, frammezzati da poca marga, e molta arena in gran parte marina. Le valli tra quel tratto frapposte non sono per lo loro fondo che un perpetuo letto d'arena quarzosa, spatosa, e di altre sorti. Tale è parimente il suolo dell'opposto littorale di Sicilia, da Nisi verso Peloro scorrendo, e molto di là eziandio verso Melazzo a ponente; soltanto diverso per gli cumoli immensi di arena di mare, cumoli che s'incontrano a lungo per la spiaggia sul Peloro, e per non poca quantità di argilla marina colorita, che occupa le falde delle colline, dal mare depositatavi. Per le colline che formano l'imminente costa del canale di quel Faro da Pentimele sino a capo Cenide, esistono lunghi strati di breccia indeterminata, composti di diverse specie di ciottoli in gran parte fluitati, e poca arena, ben legati e forti, e della densità da dodici in quindici palmi ( dico di que che 10 ebbi luogo di offervare ) e paralleli all'orizonte. Tali strati si veggono eziandio per la spiaggia sul Peloro.

La costa sinistra del siume Valanidi, molto prima di giungere a quel villaggio, in distanza da Reggio verso scirocco miglia quattro, e da circa miglia due dal Faro, è tutta sormata di strati a dolco piano inclinato, gli uni a gli altri soprapposti, sormati di diverse specie di arene angolose e di marga, quali prosondano molto più in giù del liscollo del lacco del simple del simple

del livello del letto del fiume.

A libeccio del Pittaro è posto il capo detto oggi dell' Arme, un tempo Leucopetra per la sua bianchezza. Sembra egli un'appendice apposta a quel monte, del quale il primitivo originario corpo è quasi tutto quarzoso e per istrati perpendicolari all'orizzonte; quel capo al contrario tutto calcareo, e di struttura tutta diversa. Egli è situato ful lido sì che il mare lo bagna, e si stende lungo quel!a marina per circa un miglio e mezzo, e colla sua base si profonda nello stesso mare. La sua altezza sul lido, per quanto sembra alla vista, può stimarsi poco meno di palmi quattrocento: la sua sostanza è del calcareo commune tutta bianca, e la durezza la stessa, e la faccia tutta eguale. E' per tutto formato di strati laminosi di picciola e variata crassezza, gli uni agli altri soprapposti, ed aderenti, ma non già incorporati; paralleli tra loro, e tutti insieme quasi paralleli all'orizzonte. Da cima a fondo ful lido è tutto ruinato per tagli a picco: onde a giusta distanza si presenta agli occhi in forma di un antico superbo edifizio fabbricato a grossi e lunghi tasselloni. Ed è ben avvertire che le sue ruine non son recenti, ma di molto lunga età: imperocchè per quel lido non esiste pezzo aleuno del suo corpo caduto, e la faccia de' tasselloni è tutta liscia e levigata.

Da cotesto capo, e propriamente dal siume Montebello, sino alle vicinanze di Capo-Spartivento per tre e quattro miglia entro terra dalla marina salendo, tutta quella estensione è un orrido prosondo ammasso di rottami di diversa qualità e grandezza, ed in parte anche rotondati. Le rive de siumi son di questi materiali composte e framischiate di arena e marghe, e sono molto alte e tagliate a linea. Si mostra questa saccia particolarmente intorno Pentadattilo, collina che sembra avere un tempo dovuto molto sossirire, ed il territorio sentire della rivoluzioni.

Nella marina di Bova a picciola distanza dal siume esiste come isolato un masso quasi una collina, tutto composto di pezzi di picciola e diversa grandezza, tutti grossolanamente

faccettati,

faccettati, e per maggiore intelligenza dico di figura poliedra: figura che troppo ben s' intende, che dovevano que' pezzi ricevere nell'aggregarsi insieme, allorchè erano nello stato di pasta molle e figurabile. La materia n'è tutta calcarea bianca, ed i pezzi assai duri, e tra loro ben commessi. Intanto si vede molto minorato per li pezzi che se ne staccano dall'azione potente del tempo; onde dovè per gli secoli innanzi essere di assai maggior mole che oggi non è.

Or considerando la sigura di que' pezzi, e che la dovettero ricevere nell'aggregarsi e commettersi insieme, dobbiamo necessariamente credere non solo che doveano essere nello stato di una pasta molle e cedevole, ma che sotto le acque medesime dovettero incontrar l'occasione di prima sormarsi, e di una sigura avvicinautesi al rotondo, per poi quella nella loro aggregazione potere acquistare. Onde non dee recar maraviglia se nella superficie della terra per tanti luoghi ravvisiamo ciottoli rotondati in numerosi e gran cumoli, quando essi ebbero l'origine sotto le acque, i quali poi per leggiera sluitazione e strosinio si sussero anche levigati.

Il capo Leucopetra e la roccia aggregata anzidescritta son due monumenti di molta significazione. laminosi del Leucopetra, il cui livello superiore quasi si eguaglia col livello superiore del monte, dimostrano che si dovè formare tutto per successive precipitazioni e sedimenti della materia calcarea sciolta ed allungata nell'acque: che le acque andando a mano a mano ritirandosi, e con ciò ristringendosi, erano giunte ad uno stato melmoso, molle, e colante: che tal era eziandio la superficie della terra almeno per parti: e che ne' luoghi meno agitati e riposti le acque facevano tali depositi. Per lo che dobbiamo parimente dire, che per quel tempo si erano per la superficie della terra già formati de' luoghi vallicosi e de' fossati che servirono nelle occasioni per dare una formale disposizione a sissatti depositi. E cosi che tale dovè esser quel tratto del capo dell' Arme, e che 'l Pittaro, a cui come appendice

sembra apposto, avesse satto parte del recinto di uno di tali luoghi: monte che per tutte le ragioni dovè esser formato e consolidato molto innanzi di quel capo, alla cui formazione favorì ( non lasciando divagare quella materia colante) ad ivi depositarsi. Egli è composto di strati quarzosi, e di strati del sasso micaceo quarzoso da mezzogiorno a

settentrione dirigendoss.

Quella roccia aggregata poi indica che la materia calcarea si era già ristretta, e giaceva in uno stato molle e pastoso, e che una violenta agitazione di marea o corrente aveise quel maiso pastoso sconvolto e lacerato in pezzi, i quali rotolando nelle acque acquistarono figure avvicinantesi alla rotondata, e che cessata poi l'agitazione si fussero uniti insieme, favoriti, come è di ragione, anche dalla disposizione ristretta del luogo, a potersi aggregare, e a non divagarsi; nella cui occasione poi dalla scambievole pressione riceverono

quella figura faccettata poliedra.

Da tutto ciò sembra potersi avanzare non senza ragione, che dal Pittaro fino a Capo Cenide, e dalle montagne di Nisi sino al Peloro e a lungo verso ponente, quella gran valle che ivi tra que' due continenti oggi vediamo, il cui fondo occupano reciprocamente l'onde di due mari, e Faro è appellato, era già sotto le onde, per le prime modificazioni disposizioni, che la superficie della terra ricevè già formata. Il Pittaro e i monti di Nisi sos formati di strati quarzosi eretti sull'orizzonte, e del sasso micaceo quarzoso che li fiancheggia e veste, e son tutti in direzione dall'angolo di mezzogiorno all'angolo di settentrione, onde non possiam supporre niuno necessario nesso tra la Pittaro e Nisi, anzi più tosto, ravvisando le disposizioni delle picciole catene che le grandi compongono, come per là anche si può ravvisare, dobbiamo conoscere che valle vi era frapposta come oggi già offerviamo, formata sin dai primi tempi fotto l'onde medesime, valle che verso Messina doveva prolungarsi, e con ciò sar porzione del Faro. Eravi in somma uno di quegl'intervalli, che naturalmente sogliono esservi tra filo e filo di montagne che le gran catene sulla

medesima disposizione compongono.

Gl' immensi ammassi di ciottoli, che prosondano oltre il piano del mare per ambedue que' littorali di Reggio e di Messina, per le spiagge del Peloro, certo che non si potevano a quel grado di quantità accumulare e divagare. se non vi avessero incontrato spazi ampi e prosondi, e nel medesimo tempo formare, se le acque non avessero occupati que' luoghi. Gli strati orizzontali di breccia indeterminata, che esistono sulle colline di Pentimele, sulla riva del canale all'elevazione più o meno di cinquanta in sessanta piedi ful piano del mare, come efistono eziandio per le bassissime spiagge del Peloro ed a picciolissima elevazione, indicano che un tempo le acque stazionarono sulla faccia di quei luoghi. Così gli strati sopraddescritti della costa del siume Valanidi, fignificando lo stesso; anzi come quelli profondano molto più in giù del piano del letto di quel fiume, mostrano che le acque parimente sino a tal termine di profondità occuparono quella valle; termine che forse è molto più in giù del piano del mare; imperocchè il letto del fiume pochi palmi fi eleva su di quello. Per le quali cose par benishmo che la predetta valle fu per successivi gradi sempre dalle acque occupata, onde che non vi fusse stato mai tempo in cui i suoli di que' due continenti si sussero continuati in elevazione superiore al piano dell'acque di quel Faro. Esiodo antichissimo scrittore, come quegli che visse intorno a settecento ottanta anni prima di Gesù Cristo, vuole che il mare si estendesse sul Peloro, e che Orione vi avesse satti degli argini per impedirnelo; fatto che parmi confermato dalla descritta faccia e qualità del luogo (1).

<sup>(1)</sup> Eustachio Antiocheno ne' Commentarii su Dionigi Periegeta nel verso 475 sa vedere che realmento la Sicilia si susse dissinta dalla L1 2

Il littorale di quella Calabria dal capo Suvero fino a Scilla mostra per se d'aver sosserto violenti tagli e troncamenti di ben lunghe porzioni del continente, e dopo formatofi il Tirreno, e tutto il Mediterraneo. Che il golfo di S. Eusemia di Nicastro fusse un cratere, e che susse stato un fondo di volcano, lo fanno sospettare la sua troppo determinata circoscrizione, quel tufo che alla sinistra del Pizzo esiste quasi simile a questo della nostra Campagna, e la qualità della terra su quello esistente, le terme stesse dette di S. Biase, e la gran copia di pomici sparsa in lungo ed in su per que' contorni. E che per quel tratto fienvi materiali accensibili, e che in effetto vi sieno accadute accensioni, lo dimostrano la famosa e grande miniera di carbon fossile in Briatico, e la voragine apertasi in Bivona accompagnata da fiamme nel terremoto dell'anno 1638, giusta la testimonianza di Cesare Recupito. La città di S. Eusemia ch'era sulla riva di quel golfo, in quello scotimento s' innabissò alla presenza del Kirker in un lago puzzolentissimo, onde è che quel littorale fu assai soggetto ad accidenti di tal genere. Dal capo Zambrone poi sino a Scilla sono sì evidenti i caratteri di laceramenti e lunghi troncamenti a quella costa accaduti, e le considerabili estensioni di essa occupate poi dal mare, ed essersi tutto per cagioni violenti operato, siccome la qualità de' caratteri lo indicano, non vi può essere uomo che volgendovi lo sguardo possa negarlo, particolarmente guardandone il taglio del monte S. Elia ful mare.

Che i terremoti abbiano da quel littorale troncate varie porzioni, ci si narra dalla storia, ed oggi l'abbiamo cogli

Calabria, a cui l'eruditissimo Fabro Tanaquillo acconsente (v. l'epist. 14 del libro I), e che tal distaccamento susse accaduto in tempo che gli Israeliti scossero il giogo di Faraone, e che Acasto sigliuolo del Re Eolo allora signoreggiava la Sicilia. Qual sede meritino tala autorità, a noi non appartiene l'esaminare.

occhi proprii veduto per l'accaduto alle rupi che cadono su quel lido, ed insieme a quanto si possano estendere le forze de' terremoti, ci vien comprovato per gli slanci delle falde delle colline a lunghe distanze sbalzate, e per le profonde sovversioni del suolo per ben lunghi tratti. E fon qui per dire che se mai il terremoto quanto produsse e operò per le basse falde dell'Aspromonte e sottoposte contrade. l'avesse operato e prodotto sulla gola descritta di quella penisola, l'avrebbe forse oggi disgiunta dalla parte superiore della sua provincia, e riunite l'acque degli opposti golfi di que' due mari: soprattutto se le direzioni degl'impeti delle scosse susser state da oriente in occidente, e non già da mezzogiorno a settentrione. Potrebbe forse un giorno un tale distaccamento ed altro ancora accadere, confiderando la serie delle catastrofi a cui è soggetta quella regione.

Il monte S. Elia di Palmi cala a Ponente a picco nel mare per un taglio da cima sin giù a sondo tutto a linea, e a mezza luna; è di una faccia sì aizzata, che troppo manisestamente dimostra una cagione tutta essicace e insieme violenta, che dal suo corpo n'avesse rabbiosamente distaccata e sbalzata molto più della metà, per quanto la sua base ed il taglio par che dimostrino. Calcolando la lunghezza del basso piano della sua falda che verso Bagnara a libeccio mezzogiorno si distende, n'è il raggio di quello di sopra miglia dieci, per lo che par che andava ad incontrare il continente di Sicilia colle antiche sue falde. Il taglio del lido da Rasocolmo al Peloro è in una curva che continuata verso Scilla e Bagnara e S. Elia prosiegue in quella sua curva disposizione, sempre col concavo sul mare sino a Nicotera e capo Vaticano verso setten: rione, talmente che forma un semicerchio, che tirata una linea a capo Rasocolmo a capo Vaticano o Nicotera, ne forma il diametro, dal cui mezzo tirate le linee nel concavo di quella curva, o vogliam dire la faccia concava del littorale, si possono avere quasi eguali, o di differenza non molto notabile; sicchè quel golso sorma un vero femicerchio, un vero mezzo cratere semicircolare, il cui taglio n'è per ogni dove a picco sul mare, e molto in sondo; le linee o raggi si possono stimare di circa dieci miglia.

La faccia del lido nel mare descendente da Rasocolmo al Peloro mostra benanche violenti troncamenti e squarciature similissime a quelle del lido da Scilla a Palmi. Per lo che dobbiam dire che anche da quello ne su troncata porzione, che in quel mare si estendeva, e con ciò, che andava ad incontrare le radici di quel monte. Sicchè tutto quel golso, molto dopo formato il Tirreno, era occupato dal continente, che poi da catastrose, o terremotica o vulcanica, ne su troncata quella porzione e innabbitsata,

concorrendo il mare ad occuparne la sede.

Or in tal caso io porto opinione, che si susse da Cenide al Peloro formato quel canale, e che si aperse la bocca di quel Faro oggi sul Tirreno. L'apertura di quella bocca fa porzione uniforme della curva che dalla faccia del Peloro sul mare si estende a Scilla. Il Faro prima forse si estendeva non oltre il capo Cenide: l'impeto della corrente da mezzogiorno venendo par che se l'avesse voluto continuare sino sul Tirreno, l'avrebbe dovuto dirigere ed aprire a settentrione se per altro la qualità del suolo era la stessa) ma la direzione del canale torce a greco, e la bocca s'apre a grecolevante nella parte più resissente per la massa della costa della Calabria, molto maggiore della costa del Peloro. Ma sebbene quella bocca si fusse allora aperta per dove poi l'acque del Tirreno entrarono, è certo però che le acque dovevano occupare le spiagge del Peloro sino a quel canale, poste le sopraddescritte qualità del suolo. Si può soltanto dire che erano bassissime e di pochi piedi di profondità, onde benissimo si poteva dire la Sicilia continuata colla Calabria per quell'angustissimo stretto: e che Orione vi avesse però potuto agevolmente sar degli argini, assinchè non venendo il suolo intermedio occupato dall'acque, libero e senza incomodo vi fusse stato il passaggio tra i due continenti; ma che di poi per l'accidente sopraddetto si fusse spezzato e profondato il suolo, formato con ciò quel canale, ed apertasi quella bocca per dove le acque si communicarono. Occupate le spiagge del Peloro dai rottami cadutivi sopra da que' monti per forza di rivoluzione ivi allora accaduta, non poterono le acque più montarle: ed il mare eziandio vi si sarà forse abbassato da quel tempo in quà nel corso di circa tremila anni. Io ripeto che chiunque visita le spiagge del Peloro, non può affatto negare che non fussero state a permanenza occupate dall'acque, ed in un piano molto più basso di quello che I suolo oggi possede; onde che non mai la Sicilia si susse continuata colla Calabria, ma che que' luoghi ricevettero tali disposizioni sotto le acque medesime, qualunque ne fusse stata la cagione.

Nel medesimo sopraddetto caso si dovè spezzare ed interrompere il recinto di quella valle tra Nicotera e Palmi perchè porzione della estensione delle falde del monte S. Elia.

Resta quì da aggiungere che salito un giorno sulle prossime colline sopra Reggio in distanza di un miglio e mezzo, incontrai tra quegl'immensi rottami pietrosi un grosso pezzo di bellissima lava tutta pesante, color blò oscuro per l'esteriore, fistulosa alquanto, semicristallizata, e della natura scerlacea: pezzo di lava che dovè certamente da qualche ignivomo prossimo esser venuto. Imperocchè, non vi è ragione, che fusse stato là trasportato per qualche bisogno; perchè sono ivi infinite pietre per uso di macerie o di fabbriche, o per altro. Nè vi potè essere slanciato nè dall' Etna, nè da Stromboli per la lunga lontananza. ie vi avessi potuto praticare le dovute diligenze, forse vi avrei incontrati degli altri pezzi, che potettero resistere alla voracità del tempo: atteso che molte spezie di lave son soggette e fra non lungo tempo, alla decomposizione e risoluzione, onde non più se ne possono distinguere le vestigia.

Passando alla costa orientale sul Jonio, sa a proposito per l'anzidetto avvisare, avere osservato nelle pareti di alcuni casini di campagna sulla spiaggia di Capo Spartivento e propriamenre nella marina di Brancaleone, ove agli 11 di giugno giunti all'ore ventidue fummo obbligati pernottare. come eziandio nelle pareti della Torre di guardia, avere osservato, replico, molti pezzi di diverse specie di lava. alcuni de' quali erano della stessa specie incontrata nelle colline di Reggio alcuni il Pumex vitreus, ed alcuni di altre specie che troppo sarebbe qui raccontare. Mancò il tempo a poter que' luoghi visitare: del resto noi crediamo che que' pezzi di lava furono raccolti insieme colle altre pietre di cui son fabbricati quegli edifizi dai luoghi vicini. e soprattutto pe' letti de' fiumi; imperocchè quella spiaggia lungo il mare è tutta arenosa, e sprovveduta di que' materiali che avessero potuto servire a quelle fabbriche: l'immediata profondità del lido in quel mare non permette alle onde di lanciar fuori i materiali del fondo: dobbiam perciò sospettare che per quelle vicinanze stati vi fusiero un tempo alcuni volcani.

Or quella costa littorale da Capo Spartivento sino alle vicinanze di Stilo e sorse più oltre, per lo tratto di circa einquanta miglia di cammino in lungo, e circa quattro in largo, è un assembramento di variate colline, e quasi su d'un medesimo livello, che scendono dolcemente sino sul lido arenoso, per lo più tutte bianche, che da capo Bruzzano si riguarda una suga tutta maravigliosa per la sua bianchezza per ben trenta miglia. Il lida è tutto arenoso, e basso sì che il suo piano quasi si affronta col piano del mare; ma intanto il suo taglio immediatamente si prosonda come a linea nel mare di tal modo che quasi per ogni

dove possono i legni afferrar quel lido.

Merita poi tutta l'attenzione la diversità e conformazione della faccia di questa costa sul Jonio, in paragone della sua opposta sul Tirreno ad occidente. Quella mostra ad evidenza aver sossero estraordinarie violenze che lunghe porzioni ne

troncarono

troncarono e distaccarono, mostrandone i caratteri non ancora obliterati dal tempo, anzi tali che quasi parrebbe aver di recente tutto sosserto: questa al contrario veruno di sissatti caratteri non manisesta, ma tutto sembra su di essa avvenuto per una cagione, sebbene grande ed essicace, operante però con lentezza e senza violenza: il taglio del lido che consina coll'acque, quantunque immediatamente si precipiti ed a lungo nel mare, intanto non ha que' caratteri di violenza che manisesta il lido della costa opposta: in somma non ha sosserto le rivoluzioni estraordinarie, e particolari dell'altra.

Son quelle colline quafi per ogni dove composte della terra figlia della risoluzione e decomposizione de' testacei, e di minuzzoli non ancora risoluti di quelli. Ma tale terra ordinariamente non forma tutto il corpo di ciascuna collina; imperocchè il loro fondo è di argille depositate per là in tempo della prima stazione che le acque vi fecero. Evvi eziandio melta marga, parte della quale è dovuta alla calce testacea: e vi è della lodevole argilla margacea in alcuni luoghi niente impropria a formar de' vasi, siccome in Gerace osservammo.. Vi sono frequenti e ben grandi miniere di gesso, che in tutto mi parve il Gypsum equabile del Vallerio spec. 68, e que paesani se ne valgono a fabbricarne anche le case. La terra detta Buonostare & tutta fabbricata di cotesto gesso, che venne dalle scosse del terremoto rispettivamente pochissimo maltrattata. Le decomposizioni perenni e grandi delle piriti, che a lungo formano gli strati delle falde delle montagne contigue. poterono benissimo dare occasione, per mezzo delle acque colanti, alla formazione di tali miniere di gesso in quei tratti di terreno ammailati di terra calcarea figlia già dei teffacei.

Senza divertire altrove, parmi qui opportuno luogo discorrere delle numerose nitriere che sono in quella costa. Fa veramente meraviglia non solo la frequenza, ma M m

l'ubertosità di tali nitriere, e l'eccellente qualità del nitro, come la gagliardia e prontezza della polvere da cannone che se ne sabbrica, lo dimostra. Sono quelle terre in massima parte figlie della risoluzione e decomposizione de' testacei, sono spongiose, fragilissime; ed ove s' incontrano ben compatte, la consistenza non oltrepassa quella del tuso fragile e tenero; e da per tutto promette del nitro. Le nitriere ordinariamente sono scavate nelle viscere di quelle colline a lunghe gallerie: di queste le molto grandi hanno dei colonnati lasciativi di passo in passo dagli scavatori, per sar che il tetto, o le volte non crollassero.

Quei salinitrai praticano il seguente metodo per avere di mano in mano della terra salnitrata fruttuosa. Essi da tempo in tempo, secondo le qualità delle stagioni, e l'opportunità de' luoghi, e propriamente ogni mese, o due in circa, tagliano con istrumenti proprii dalle pareti di quelle gallerie, o grotte una crosta della densità non più di un dito o due, già falnitrata: la polverano grossolan imente e la distendano nelle medesime grotte all'aria aperta per alcuni giorni, ed indi la lisciviano: ripetono quell'operazione secondo i tempi predetti ed opportuni, quanto dire, allorchè veggono che la faccia lasciata scoverta delle pareti di quelle gallerie, si è nuovamente salnitrata: e così in appresso. Le gallerie non praticate che a lungo danno di ben dense croste di nitro, e di belli gruppi di cristalli di nitro. Avendo dimandato alcuni Geracioti, perchè essi praticavano quelle terre più tosto che il letame per fabbricar del nitro? mi risposero che molto più conto rendevano loro quelle terre che'l letame, e la stercorazione. L'ordinaria ed assicurata dose di nitro che danno quelle terre, è di rotola quattro per cantaro, alle volte più, alle volte meno; ma bisogna attendere anche il tempo che si dà a quelle terre per salnitrarsi, e l'opportunità della stagione. Vi sono per altro alcuni luoghi alquanto più ubertosi degli altri, come le nitriere di Ardore. In Giojosa le terre sono ancora così ubertole, che nel mezzo de' mesi estivi trovasi il nitro alla superficie del suolo formato per le aperte campagne. Vi sono nitriere in Ardore, Condojanne, Gerace, Siderno, Giojosa, Castelvetere: ma sono oggi praticate quelle di Ardore, Castelvetere, e Gerace. Havvene eziandio molto più in là nello stato di Arena a ponente del monte Jejo.

Egli è cosa ben degna di avviso che da più secoli hanno que' paesani praticate le nitriere di quella provincia, ma sempre, anche suori del tempo del bando, con ogni riserbatezza e cautela tra loro medesimi per privati loro interessi. Imperocchè colui che ne avea in pratica alcuna, la teneva come patrimonio e sostegno della propria samiglia, onde tra loro stessi n'erano gelosi: per lo che a molti pochi surono a notizia, e soprattutto suori della provincia.

Nella fine poi del secolo passato, se mal non mi ricordo, e principio del corrente, essendosi banditi tutti i luoghi da cui si tiraisero delle terre da nitro, molte e molte nitriere furono abbandonate, anzi coverte e nascoste, pochissime restandone in riserbatissima pratica. Imperocchè da Capo Spartivento fino a Catanzaro era quella costa aperta in molti e molti luoghi in nitriere, ed anche per altre parti di quella provincia, e si vedeva per allora abbondare in piazza il nitro, tirandosi eziandio per altre contrade del nostro Regno. Or son'io per dire che se le nitriere naturali del Regno si mettessero in pratica, ed in parte (non veglio dir tutta) l'immensa stercorazione della Puglia s'impiegasse a quest'uso, giacchè quasi tutta fatalmente si lascia a perdersi dal tempo, il Re Nostro Signore goderebbe di un fondaco di nitro da farne vantaggioso commercio. E questo assai più crescerebbe, se si volesse tener conto delle ubertosissime e numerose nitriere naturali della Sicilia, delle quali le più rispettabili sono in Naro, Francosorte, Marsala, Girgenti, Caltagirona, Sciacca, Sortino, Terranuova, Siracuía. Esce da esse annualmente una prodigiosa quantità di nitro che si vende agli stranieri; e la natura, specialmente in Mm 2

Siracusa, lo produce tale, che non vi ha bisogno di molta

manifattura per rassinarlo.

Conosciamo benissimo che bisognava fare delle diligenti offervazioni in quelle gallerie per incontrar fortunatamente forse cosa onde poter rilevare le maniere che la natura tiene per gli suoi lavori, e quali sieno gli effetti dell'acido nitroso su quelle terre, e più quali trasmutazioni esse ricevano dopo lisciviate. Si osfervano in quelle grotte delle picciole stalattiti quarzose, che vale la calce forse testacea trasmutarsi in materiali di natura selciosa; lo che non può avvenire senza mestruo. Nel luogo detto le Zimpi. ove sono due o tre di coteste gallerie che tra loro si comunicano. ma che oggi sono abbandonate per gli stillicidi dell'acqua, onde non più producono falnitro, ma vi si vede soltanto una misera efflorescenza di alinitro piuttosto, avemmo il piacere d'incontrare in una delle pareti in fondo in picciolissima superficial dose, che invernicava una porzione di quell'umida parte, un Sapone acido naturale, del colore e della consistenza del nostro sapone comune, ma acido, siccome col favor del Signor Don Antonio Pitaro esperto Chimico della nostra Accademia, al nostro ritorno riconoscemmo.

Alla distanza di un miglio e mezzo da Gerace, a mezzogiorno della sua collina, in distanza dal mare per circa miglia quattro, nel sondo verso il principio del siume Mericio, ma meglio credo Nericio, o Naricio, dal nome dell'agro Locrese per cui scorre, che Naricia si diceva, vi è il samoso sonte termale, delle cui acque portate per condotto, siccome si vede, di circa miglia cinque, sacevano uso i Locresi nelle loro magnische terme, di cui oggi non esistono che pochi avanzi, siccome in compagnia del nostro prelodato collega il Sig. Pacisico a' 13 di giugno osservammo. Il suolo in cui oggi sorge quel sonte è tutto pantanoso e coverto di giunchi, e'l terreno del sonte medesimo è tutto argilloso e molle. L'argilla è di color sosco, ove pavonazzo, ove rossognolo, ove blò. La pedina della collina di Gerace

molto in grande, e quasi per un terzo e più della sua estensione sino al sondo della valle, è tutta della medesima argilla composto: argilla tutta omogenea della natura delle bolari, la quale prosciugata si spricciola in picciole dissormi particelle. Potrebbe sospettarsi quella di origine volcanica, ma confessiono non averne sufficienti argomenti. Le terme ivi esistenti lo potrebbero sar sospettare, come parimente la parte di quella collina che cala verso sciroccolevante alla porta S. Lucia, che è un tuso, le cui apparenze sembrano volcaniche. Ma parmi più verisimile, che gran parte di quell' argilla sia antica siglia della decomposizione de' grandi ammassi di piriti, come è indicato, dalle terme stesse che circonda.

Il corpo superiore della collina è un masso di ben lunga e prosonda estensione di un calcareo testaceo in consistenza di tuso, parte del quale mostra ancora i testacei non interamente risoluti. Le viscere di quella collina son quasi tutte Humus animalis siglia de' cadaveri de' testacei, che sa, voglio credere, la matrice del mitro, siccome in tutte l'altre nitriere di quella regione, ed eziandio di tutto il littorale superiore del Regno.

E' quel sonte in sorma di una vasca rotonda, di circa piedi dieci di diametro, di prosondità quattro: il sondo, come la sua sponda, sono tutti limacciosi: in una parte del suo contorno comparisce picciola porzione di muro e sabbrica di consusa costruzione. Il getto dell'acqua che nel suo corso osservai, era circa un'oncia quadrata di misura. Il colore era acquamarino: il calore io non potei definirlo non avendo avuto istrumento per misurarlo: ma prudentemente si può stimare pochi gradi superiore al calore del corpo umano, per quanto potemmo rilevare dall'immersione della mano: il sapore alquanto salso, accompagnato da picciola stitticità.

Intorno al margine della fonte, e lungo i lati dell'argilloso canale per cui quell'acqua scorre, lascia un materiale salino,

tutto lordo, spongioso, e terreo: questo purificato e cristallizzato ne dà il più bello e gentil sale mirabile di Glauber, che abbiamo mai potuto vedere. I Geracioti ne fanno uso con molto profitto, purgando senza incomodo alcuno: la dose da essi praticata è ordinariamente di mezz'oncia, al più una: si servono anche dell'acqua con vantaggio per lavanda di piaghe fordide. Dobbiamo credere che cotesto sale nasca dalla decomposizione delle piriti, che nel nostro caso communicano perciò il calore alle acque, e dalla decomposizione del sal comune cagionata dall'acido dello zolfo scomposto nella decomposizione di esse piriti; il quale acido combinato colla base del sal commune forma quel fal mirabile. Quelle argille possono anche contribuire ad un tal lavoro. Or questo sale non solo in quelle terme s'incontra, ma ben anche ne danno in abbondanza più forgenti sulla costa di quella provincia.

Le montagne che al di sopra circondano la valle ad occidente in distanza di un miglio a linea, sono quella parte orientale dell'Aspromonte, che forma la grande ed alta rupe detta Monte Esope. Giova qui avvisare che per questa parte orientale le falde dell'Aspromonte hanno lunghi e frequenti strati di piriti, e particolarmente il territorio di Canolo casale di Gerace. Ed è cosa notabilissima ciò che il Dott, Severino Professor di Medicina ci diceva: cioè che nel cader le acque autunnali si osservavano per quei luoghi di Canolo molti e diversi punti del suolo fumare

fensibilmente.

Ayendo in compagnia del prelodato Signor Pitaro fatte della predetta argilla che circonda quelle terme, e fi estende per la falda della collina di Gerace, due soluzioni, l'una nell'acido nitroso, l'altra nell'acido vetriolico: e dopo giorni avendole ambedue trattate coll'alcali fisso di tartaro, precipitarono in fiocchi una gran porzione di argilla color rossastro: e coll'alcali flogisticato precipitarono una soprabbondante copia di blò prussiano di eccellente qualità.

A settentrione in distanza di miglia due da quella collina esistono miniere di bellissimi marmi brecciati di diversi colori.

Il dì 16 di giugno passammo di Gerace nella città di Stilo posta a miglia quattro e mezzo-entro terra distante dal Jonio. Nel passaggio incontrammo per le sottoposte valli nell'aspetto di levante in diversi luoghi argille di variati colori, d'indole bolare, ma di quà e là per cumoli isolati, così eziandio di pezzi di granito di quà e là dispersi. Nell'avvicinarsi alla città cominciano gli strati arenarii in piani inclinati, molto numerosi, gli uni agli altri apposti, i quali formano le radici del monte. Sono quelli composti dell'arena quarzosa, del calcareo, della mica, di alquanto spato scintillante, il quale è molto tenero, e friabile, e pare estemporaneamente e come di recente quivi generato.

Nel terminare in su questi strati, che sanno a sciroccolevante di quel monte detto di Stilo, la pedina, la quale in sorma di ala si spande verso grecolevante suori del monte per là slargandosi, è posta la città, ed in gran parte su l'ala predetta a guisa di mezza luna si estende, sciroccomezzogiorno guardando, restando in molta parte sgombera del predetto monte nell'aspetto di tramontana.

Dal confine della predetta pedina s'innalza a linea quel monte, che non è che l'estrema parte in sorma di picciolo promontorio, o rupe del lungo giogo di un braccio laterale del Caulone, che da libeccioponente verso grecolevante si spinge. Egli è tutto di calcareo commune, siccome il braccio predetto, ma per quanto sa da tetto al sottoposto materiale, che cuopre nelle loro viscere, di cui parleremo a suo luogo. Per lungo il suo giogo è circa un miglio e quarto, per lo resto molto stretto, e nella cima angustissimo, su cui esistono gli avanzi dell'antica città, ma de' mezzi tempi. A grecolevante da cima a sondo cala tutto a picco, ed è bagnato dal siume Stilaro: per tramontana in lungo sino alla metà della sua lunghezza vicino Bivongi è rapidissimo;

in appresso sino a Pazzano l'altra metà è tutta per piani inclinati molto trattabili: proseguendo egli è il suo giogo a ponentelibeccio per un'apertura, o varco di cinquanta in sessata passi largo, ed alto altrettanto, separato dal giogo di tutto quel braccio. Le salde da Bivongi a Pazzano sino al siume Machera son coverte di poca terra vegetabile, ed in gran parte in giù calando son sormate di argille stratissicate in qualità di scissi, avendo per alcuni luoghi anche la pietra cornea. Il Machera ramo dello Stilaro lo bagna a tramontana. Un altro picciolo ruscello, che per quel varco scorre, lo bagna a scirocco, le cui acque vanno poi ad unirsi allo Stilaro.

Nel mezzo dell'ardita falda a grecolevante în distanza dalla città per passi cento a linea, sui condotto sulla falsa idea di alcuni di que' paesani, che vi susse miniera di oro. Esiste ivi una grotta, che penetrando nelle viscere del monte si divide in due rami angustissimi, di cui il sinistro scorre molto dentro: le pareti sono incamiciate di una bianchissima e trasparente stallattite, la grotta è ripiena di un'argilla che sa da silone, carica di una lucentissima mica rappresentante dell' oro in paglietta: onde molti lusingati dall'ingordigia, hanno da quella tirata un'immensa quantità di quell'argilla, ma infruttuosamente. Per altri caratteri però è certo, che le viscere di quel monte contengano qualche miniera di ferro, o di rame, e ben lo indica la forma della grotte che scavandosi può a quella condurre.

Or da questo monte, e propriamente dal siume Stilaro in appresso verso greco di sotto le faide orientali del Jejo per tratti di molte miglia, è quel paese tutto di frequenti e contigue colline, e spesso per gruppi, e senza esagerazione alcuna son quelle la conserva di ogni sorte di metalli, e semimetalli, di vetriuoli, di zolsi, e di altri materiali preziosi; e non mancano di belle ed utili specie di terre, che dicono bolari, delle quali cose discorreremo in appresso.

A' 21 di quel mese partimmo di Stilo per S. Stefano del Bosco. Or giova non poco quì dire, ch'è troppo rara cosa incontrare situazione più selice e più opportuna di questa di S. Stefano per una rispettabile Capitale. E' quella nel mezzo a lungo nel giogo del Jejo, ed ivi in discreta clevazione: ha lunga e valla estensione, per molte miglia tutta per pianure: traversata dai rami del fiume Ancinale ricchi d'acqua salubre, e di molti ruscelli di altra origine. assai opportuni per ogni uso economico: tutta per ogni dove erbosa in forma di vistosissime fruttuose praterie: a tramontana ha le alture le più grandi del Jejo, ma a giusta distanza, così anche verso mezzogiorno, ma molto più basse, vestite di boschi di faggi, di abeti, di quercie, di lecci, ed altre piante. Tutta aperta da oriente ad occidente ha l'aria lontana da qualunque sospetto d'insalubrità. A brevi distanze ha due mari per ogni trafico; e nelle sue vicinanze ha miniere d'ogni sorte.

Ripigliando qui la catena di quegli Appennini, di cui avvertimmo esser l'interna ossatura sormata a strati per lo più eretti sull'orizzonte, e quelli tutti quarzosi, fian heggiati quasi per ogni dove dal sasso che ci piacque cognominare Roroessense Linn., sasso composto di quasi egual dose di grossolani grani quarzosi, e di minuta mica color nerognolo, o color d'oro; diciamo che questo sasso alle volte ha la parte quarzosa a sottilissimi strati; alle volte così la parte quarzosa come la micacea sono ambedue in disposizione stratosa, e come per tante sasce che si abbracciano, e la mica snole avere varii coloriti; ed alle volte cotesta mistura ha parimente dell'argilloso.

S'incontrano talora gli strati quarzosi siancheggiati dal Saxum ferreum sopraddetto, e dal Corneus Trapezius. Ma questi due sassi, per quanto ci su permesso di osservare, quasi sempre trovansi in elevazione superiore al Roroesiense; infatti per le cime del Jejo si vede in più luoghi il Corneus Trapezius traversare il granito, Or qui proseguendo a

discorrere della struttura di quella catena, si vuole avvisare, che lo scisto argilloso spesso sa da camicia a quelle colline I noi intendiamo delle colline primitive rispettivamente alle formate di materiali possicci, o depositati posteriormente). siecome si vede con particolarità per quasi tutte le colline à levante del Jejo, e fiancheggia alle volte anche le alture maggiori, siccome nel Pittaro, nel Sagittario, ed altri luoghi offervai. Suole a questo seguire come ultima veste l'argilla di variati colori che prosciugata diviene tutta fragile, ed in minuzzoli del tutto difformi; ed in alcuni luoghi ha molto della natura delle argille bolari; che hanno naturalmente sempre del marziale. Or quante volté s'incontra cotessa argilla, ed in seguito, o pur sottoposto, o alla scoverta lo scisto, massimamente se questo abbia de particolari e forti coloriti, e fosse di sostanza rigida, al tatto aspero e secco, e quasi sempre sicuro indizio, che nelle viscere delle colline che incamicia, o de' monti, le cui falde stratifica, esistano delle miniere metalliche. Coteste argille, e conseguentemente cotetti scissi, debbonsi al deposito delle acque, che coprirono nella prima età que' luoghi: e ficcome cotesti s'incontrano sulla costa orientale con particolarità esistere, ne siegue anche per questo carattere, che quella non soffri le violenze e i disturbi patiti dalla costa sul Tirreno.

Siccome le nominate argille suddette ed i scissi terminano le alture, così eziandio dobbiam dire che l'calcareo comune sia anche ultimo termine del materiale della corteccia del nostro globo: volendo con ciò intendere che così le argille come il calcareo sieno l'ultimo deposito delle acque: e con particolarità il calcareo come figlio de testacei, che surono posteriormente creati, e che si stratificarono sotto le acque sopra di ogni altro materiale: i quali per la loro estraordinaria moltiplicazione ed abbondanza somministrarono a proporzione un materiale che ne vediamo oggi la massima estensione superficiale del globo coprirne, e sempre superiore alle argille. I graniti, sebbene s'incommo

non di raro terminare l'ultime alture, non però debbone aversi per ultimo materiale terminante la corteccia del globo.

E' il calcareo predetto melto raro in quella Calabria, ed ove s'incontra ordinariamente sa da tetto agli altri materiali. Sicchè dunque nel consolidarsi la corteccia del globo, i primi prodotti surono i quarzi, e le miche; indi la mistura de' quarzi, miche e seldssati, tramischiandovisi tra questi, ma come accessorio, la pietra cornea; per ultimo il calcareo. In cotesta formazione non bastò la semplice unione, per quanto sorte si possa credere il contatto delle loro particelle cossitutive, ma vi dovè intervenire qualche particolar mestruo coagulante, come indica la di loro eristallizzazione, anche ne' calcarei stessi. Quale poi susse stata l'origine de' metalli, che nel seno di sì fatti materiali si nascondono, consessiamo non saperla indovinare.

Per ultimo pai quello che merita tutta l'attenzione riguardo all'interna offatura, della catena de' monti, per quanto ci si presentò nell'osservar la Calabria, si è la direzione degli strati dall'angolo di mezzogiorno all'angolo di settentrione, o da libeccio a greco. Or esponendo noi la nostra opinione, sissatta situazione e direzione la crediamo tutta per forza della sistematica circolazione di quel fluido (1) che dai poli verso l'equatore si spinge: disposizioni indotta nell'età, che'l materiale della corteccia del globo era ancora molle, e facilmento cedevole allo spinte della correpte di quel fluido: onde per allora tutto si dispose e si dirizzò in tanti rialti prolungati dai poli all'equatore, sulle cui disposizioni si accomodarono poi tutti i nuovi materiali, che sotto le acque si produssero. Quanto da alcune irregolarità che si ravvisano, che debbonsi piuttosto dire nuovi esteriori materiali, hisogna crederle nato dagli

Nn 2

<sup>(1)</sup> Il Signor Fasano ne savella alla distesa in un Discorso sulle sagioni del Terremoni.

urti di quel fluido medesimo, non incontrando, per gli nuovi materiali soprannati, come coibenti, quella libertà di effusione e di passaggio, che prima godeva; fluido che ficcome per gli primi tempi non ebbe veruno ostacolo rilevante, si diffondeva equabilmente dal corpo del globo e nell'atmosfera; onde niun disturbo, niuna irregolarità ne nasceva; tutto ugualmente animava e vivisicava; e la vita di cui egli è la primitiva cagione, parimente tutta equabile, tutta regolare, elercitava senza verun disturbo le proprie funzioni. Ma crescendo per la superficie del globo gli ostacoli al suo libero patsaggio, cominciarono le irregolarità, gli urti, le violenze, gli slanci del suolo, quindi gli sconcerti che crescendo di mano in mano apportarono notabili e spaventevoli rivoluzioni, una delle quali alla per fine diede un guasto generale a tutta la superficie, e tutto sovvertì a fegno che quella si cambiò per ogni dove. Sicchè per le nuove insolite disposizioni e qualità di materiali rimescolati, non più in appresso si è goduta la costante generale equabilità dell'effusione di quel fluido nell'atmosfera; onde una serie di moltiplici sconcerti sul fisico de' viventi, ed in conseguenza anche ful morale.

La catena di que' monti mi fa sovvenire la promessa di avvertire, che parte dell'eminente contorno di quella gran valle con porzione de' monti contigui susse un tempo, dopo ritirate le acque, scoppiata in volcano. Or il giogo di quella catena, e propriamente dell'Aspromonte, si conoice suori di ogni sua unisormità per la parte che guarda settentrione, interrotto, anzi spezzato, ed abbassato in una valle rappresentante un cratere cinto da colline, aperto soltanto in picciola parte a settentrione. Egli è cotesto cratere tra le sorgenti del siume Cumi, e del siume Sitizano, ambedue rami del Petrace: e propriamente tral monte detto Cocozzo ad oriente, le montagne di Pedauli e Scido a ponente libeccio, e le colline di S. Cristina, una detta dello Spirito Santo, e l'altra detta Crisma a settentrione: ed il

suo contorno può stimarsi di circa miglia quindici. Quasi nel mezzo ha la lunghissima collina detta monte Attasio, altrimente Currao, delle valli di brevi estensioni, ma molto profonde. La terra di cotesto cratere è tutta diversa e diffinta da qualunque noi ne incontrammo nel nostro cammino. Quel monte, da cui la scossa de' cinque di sebbrajo svelse a settentrione da capo a sondo una lunga porzione, tutta riducendola in pezzi di diverse grandezze, non è che un tufo calcareo, cioè composto di terra calcarea che ne sa la dose maggiore, di argilla, e di ghiaja; è di color bianco pallido; que'pezzi urtandoli fra loro davano un fordo fuono tale quale lo danno le pietre calcaree cotte in fornace in calcina. Da noi si sospetta che susse stata una delle colline formata d'arena eterogenea marina cotta lentamente da fuoco sotterraneo. Infatti incontrammo in uno de' luoghi di quell'ampia apertura molti di que'pezzi tutti invernicati nell' interna loro sostanza d'una vernice prodotta da vapori sulfurei, o come per liquore di piriti decomposte: ed in quel fondo s'incontrarono delle globette di zolfo nativo, lanciate fuori dal fondo per la scossa del terremoto. tufo si estende anche per lo territorio di Lubrici, che sa parte di quel cratere. Son frequenti le pomici, che vi s'incontrano, e vengono raccolte da'paesani, come alcuni di S. Cristina mi dicevano. Per le rive del fiume di Sitizano andando verfo Scido vi sono non equivoci segni di lava. Ma bisogna pensare che le lave son soggette alla decomposizione, onde facilmente se ne perdono i caratteri, e con ciò nel nottro caso anche alla lunghezza immemorabile del tempo in cui dovè ivi andare quel volcano. Nella contrada detta di Franco, sul principio del territorio di Castellace, posta tra i due predetti siumi; contrada a settentrione di Lubrici alla distanza di un miglio, ed un miglio e mezzo dal Currao, la scossa de cinque di sebbrajo dalla parte, che sa costa al fiume Sitizano, ne troncò a picco una gran porzione della profondità di circa piedi ottanta,

tutta spezzandola in minuti pezzi che mostravano essere parte di quegli strati orizzontali, che quella contrada formano, composti di argilla color celeste dilavato, di sottilissima arena. e sparsa di mano in mano di globetti di ferro fangoso, e di minuzzoli, benchè rari, di conchiglie. Trai pezzi i più prossimi alla rottura e i più grandi, ne incontrammo alcuni. che per tutta la loro lunghezza erano a lungo divisi da strati di arena volcanica pumicosa, della densità di un terzo o due di palmo napolitano: e fra immensi rottami girando. s'incontrava la stessa arena sparsa in molti luoghi. Tale strato di arena volcanica, come le rotture in quel territorio cagionate dal terremoto mostravano, si estendeva a lungo per circa miglia due. Or quest' arena volcanica, e gli altri materiali sopraddescritti e i denotati caratteri di locale conformazione, troppo indicano che in quella contrada ardeva un tempo un vulcano, che qui diciamo Currao, dal nome del monte o collina, che sembra occupare oggi il mezzo di quel cratere; collina detta eziandio Attafio, che vale insepolto, e nel caso nostro non più prosondato, ma restato ivi erto ed isolato, come lo è infatti.

Dal Cumi fino alla Sevena del Metauro il ramo più grosso per miglia sei verso mezzogiorno, le radici di quella porzione dell'Aspromonte, sono un masso stupendo di argilla a strati sopra strati di diverse densità, e coloriti qual di celeste, e qual di pallido colore. Il masso tutto insieme, siccome i tagli prodotti dal terremoto dimostrarono, è della prosondità di sopra piedi 150, per quanto appare al di suori. La collina su cui era posta la città di Oppido, collina rasa dal siume Tricucci, le cui salde cadono a linea nel letto del siume, è sormata di cotesta argilla: ed è meraviglia che la parte superiore della collina è occupata da arena di mare. S'incontrano tral Cumi, e la Sevena, e particolarmente nel territorio di Castellace de' pezzi di argilla bolare tutta simile alla terra, o sia argilla rossa d'Ischia, che ben sappiamo esser siglia delle antiche lave. Cotesti pezzi

287

recentemente tirati dal seno della terra sentono un certo che dell'odoroso. Meritavano quelle contrade esser visitate con ogni diligenza, ma le nostre circostanze non lo permisero.

Veniamo ora a discorrere delle miniere metalliche, che quelle montagne posseggono nelle loro viscere. Dalle relazioni dei diligenti viaggiatori ben si rileva, che le qualità del suolo del Perù che sì ricche e tante miniere possede, e quelle del suolo delle nostre Calabrie quasi in nulla disferiscono. Si passi in quelle regioni, si ravvisi il suolo, si vedrà immediatamente un aspetto tutto nuovo, e ben disferente da quello di altri paesi. Da per tutto si ravvisano, caratteri che troppo indicano la frequenza e ricchezza delle miniere che posseggono. La prossima Sicilia si avvicina, anzi si uguaglia in gran parte alle Galabrie per ricchezza di minerali; e ben ne incresce non poter noi metterlo alla vista con quella nettezza e precisione che l'assare meriterebbe.

Or principiando dal l'ittaro sul l'aro, diciamo che questo monte è tutto traversato di siloni metallici. Nel luogo detto Motta S. Giovanni vi sono miniere di argento e di piombo, e nel luogo detto Ricciardo altra miniera di argento, e vi è eziandio miniera di rame. Sono quelle di argento molto fruttuose: una delle quali è miniera rossa, onde secondo tutti i mineralisti deve essere molto ricca: questa, come anche le altre, si erano negli ultimi tempi già poste in pratica, ma perchè erano arsenicate, le abbandonarono subito, per non prendersi la pena e la satica di tirarne l'arsenico, come se questo non susse stato materiale frattuoso.

La miniera di rame si mostrò di mediocre rendita por la testa de' siloni, ma profondandosi, come è di pagione, riesce certamente, per ogni regola metallurgica, fruttuosa è ricca. Diciamolo una volta per sempre, farono in questii ultimi tempi quelle miniere quasi tutte tocche soltanto per le teste, e pure riuscivano fruttuose, come si noterà. Le miniere di piembo dello stesso Pittaro sono struordinariamente

ricche, come quelle che possono dare dal quaranta sino al sessanta di metallo puro, per un cantaro di minerale grezzo, e dippiù contengono anche dell'argento; ed intanto sono

queste sempre state neglette.

Prima di discorrere delle miniere di Valanidi altro casale di Reggio, bisogna, per la determinazione del luogo, sapere che 'l fiume, sulle cui rive son situate le case di quel villaggio, da quello sino al Faro ne scorre il fiumo per un solo letto, da quello poi in su verso levante, si divide in due rami, uno a finistra detto propriamente Valanidi, l'altro alla destra dopo pochi passi si divide in due altri, uno detto Adda, e l'altro Musciddi.

La costa sinistra del Valanidi sin dal suo principio per il corso di circa miglia tre, è tutta traversata di magnifici strati di quarzo da capo a fondo, e di strati del ridetto faiso micaceo quarzoso. La faccia di quella costa mostra per ogni dove il colore del rame di cui è gravida, colore ordinariamente o di fegato, o lionato, o rossognolo. Il quarzo fa da matrice, ed alcune volte anche in parte il sasso micaceoquarzoso: i filoni sieguono la situazione degli strati. vale a dire, perpendicolare, o poco inclinata all'orizzonte; carattere che ha sempre indicata ricchezza, e con i fatti verificata nello scavo delle miniere, onde tale situazione ha sempre animati i minatori allo scavo. Tale situazione s'incontra nelle miniere di quelle provincie, onde da ciò si può in parte ben rilevare la loro ricchezza. Furono nella detta costa aperte due grotte, una nel luogo detto Stroffa, e l'altro la Lamia. La prima si aprì quasi & livello del letto del fiume, si profondò a sufficienza, onde anche con tutti gl'inconvenienti, che diremo a ino luogo, la rendita era sufficientissima. Erano in questo luogo i filoni come ramificati, carattere che spesso s'incontra nelle miniere di rame. Le loro teste, come scorrendo quella costa osservammo, erano quasi tutti alla scoverta, o vogliam dire a fior di terra. Cotesta miniera per ogni regola metallurgica

metallurgica si può dire ricca. Nino Manitti, che su mia guida per que' luoghi, e che anni sette era stato per minatore in quelle grotte, mi replicò più volte, tra l'altre cose, che spesso scavando s'incontravano de' pezzi ben grandi di matrice globosa, che avevano del rame anche nativo. Restarono in questa grotta, allor che surono abbandonati gli scavi, tutti gli utensili. La bocca era stata già dal tempo e dalle lave del fiume occecata. Lo scavo, siccome il Manitti mi diceva, era per gallerie. Quella della Lamia la ritrovammo aperta, ma tutta nel fondo ripiena di acqua. che dentro per la falda della costa vi colava: le pareti si erano tutte calcinate: mostrava la sua gran ricchezza il peso della sua calce, il colore per intero sempre lo stesso. nella faccia delle sue pareti, e fratture de' pezzi, qual era un bellissimo azzurro. Son frequentissimi per quella costa i filoni, i quali appariscono, come già si avvisò, a livello del di lei piano colle loro teste. E si afferrarono per lo scavo, come lo stesso Manitti mi diceva, i più facili, non già i più ricchi. Dopo cento passi presso la Lamia mostra quella costa caratteri di notabile ricchezza. Graziosa cosa è il vedere le acque, su per le falde erbose di alcune piccio'e rupi in quella contrada, cadere in pioggia tutta a color di fmeraldo.

La montagna, di cui si è discorso, che sa costa al Valanidi, scorre per miglia otto sino a Croceromeo, e Cardito verso tramontana, sempre nella medesima struttura, e nelle medesime qualità sopraddescritte.

La costa a man destra è molto bassa, ed assai più ha del sasso micaceoquarzoso, che di strati quarzosi; e questi sono in quella ripiegati, e come caduti dalla sua metà in su sull'orizzonte: lo che sembra essere accaduto per qualche accidente sin dalla prima loro nascita. Non ha, per quanto l'esteriore dimostra, quella fertilità della sua opposta. Osservammo dirimpetto alla grotta della Lamia in questa costa un picciol silone di pirite di rame a color di sangue

assai vistoso; così dell'altre piriti negli strati micaceoquarzosi che erano in atto di decomposizione, da cui si elevava un sottile vapore in qualità di nebbietta all'altezza meno di un piede, e sentiva molto del solso. Son molti i filoni in questa costa, ma sottili molto e piriticosi molto.

Nella costa del ramo detto Adda vi son sei grotte anche per iscavo di rame: nel ramo Musciddi altre quattro. Da queste grotte, quantunque non della grandezza, e dei selici caratteri delle anzi descritte, pure si tirava del minerale grezzo, che nella sussone dava un rame di

squisitissima qualità.

Verso la cima della costa destra del Musciddi nel confine del territorio di Motta S. Giovanni, nel luogo detto Pedauli, esiste la famosa miniera di argento, da quei paesani chiamata l'Argentera. E' questa cavata a pozzo, il cui diametro è circa palmi dieci, e la sua prosondità, come il Manitti mi diceva, di circa passi quaranta. La sua rendita si valuta di once diciotto in diciannove di argento puro per un cantaro di minerale grezzo; ma noi siamo più che sicuri che renda molto più. Ci assicurava il Manitti che nello scavo di quel silone spesso s' incontravano delle verghette di argento nativo puro. L'argento in questa miniera che merita bene il nome di ricca, è tutto per ramissicazioni, e alle volte s' incontra per piccioli nodi.

Sieguono il monte Sagittario, e'l monte Sagro, i quali hanno frequenti filoni metallici, e forse più del Pittaro. Nelle montagne di S. Lorenzo, e Bagaladi, parti di quei due monti, si sono scoverte quattro o cinque miniere di argento con piombo, da stimarsi fruttuose. Nel luogo detto Grana di S. Lorenzo esistono alla scoverta smisurati massi di miniera di rame con ferro in matrice quarzosa, che ci parve povera; ma sorse penetrando nelle viscere di quel monte, che per altro col suo esterno indica di molto possedere, può la miniera probabilmente migliorarsi. Nello stesso luogo eravisi principiata una grotta per tirarne il

rame grezzo per la R. Fonderia di Reggio. In S. Angelo Vallatucci distante cinque miglia da S. Lorenzo a settentrione del monte Sagro, sono due miniere di rame anche praticate; ed in contrada di Cerasio ve ne sono altre di argento già scoverte. Hanno questi due monti per ovunque tutti i caratteri, onde si può francamente dire, che le loro viscere son pienissime di miniere metalliche.

Nelle falde del monte Zesirio presso al Sagro, e propriamente nel territorio di Precacore, su rivelato che esista ricchissima miniera di argento con oro. Noi non possiamo darne altra notizia, o idea; ma ben possiamo dire che questa parte dell'Aspromonte è ricchissima di miniere, che traversando il suo corpo sporgono a settentrione sulla

gran valle.

Nelle falde orientali dell'Esope in territorio di Canolo esistono ricche miniere di rame a soglietti, e noi ne osservammo in Gerace di bellissimi pezzi tirati di recente dalle miniere. Queste specie di miniere sogliono esser

ricche, e di ottima qualità,

Nelle falde orientali del Caulone in territorio di Castelvetere, nella contrada di Crochi, esistono quattro miniere di argento con piombo, e due di rame, che si vogliono fruttuose secondo le relazioni. Alla parte opposta sulla testa del siume detto ivi Marro, sulla gran piana o valle, esiste una miniera di argento, che si crede molto ricca.

Dalla parte orientale del Caulone verso grecolevante sporge un grosso e corporuto braccio, e si prolunga per miglia sei sino a Stilo, ove termina in forma di promontorio detto monte di Stilo. Questo braccio per tutta la sua estensione ha le viscere, e molto in sondo, pregne di serro, sì che può dirsi una continuata miniera di serro, il cui tetto è il calcareo commune. Siegue immediatamente il monte Jejo, che sa molta parte del territorio di Stilo. Le viscere di questo son parimente immense e continuate

miniere di ferro. Tale è la quantità del ferro che in quelle montagne essse, che dovunque voglia scavarsi si trovano miniere di questo metallo, e sempre vaste; di modo che i scavatori prendono a far degli scavi dove loro rende più commodo e per la sonderia più opportuno. Ordinariamente non sono queste miniere per siloni, ma per massi di lunghe estensioni, gli uni agli altri contigui, e senza interruzioni: o vogliam dire, son per siloni di vasta fronte ed estensione: per lo che gli scavi son quasi tutti per lunghe gallerie, ed ampie grotte. Si veggono gli scavi antichi prosondati tanto a lungo, che per poco non giunsero al livello del mare. Si sono spesso incontrati laghetti di acqua, che però non han disturbato lo scavo; imperocchè per la vastità delle miniere possono i scavatori divertirlo a loro piacere.

Son tali miniere per lo più nello stato calcisorme, e sempre pure; onde n'è facile l'esplottazione. Si pratica in quella sonderia di situare in sornace il carbone col minerale per istrati alternativi per sondere il serro: onde tutto si sa per riduzione. Il minerale in pietra ossia duro, quando l'incontrano, lo scartano dal calcisorme ossia ocraceo; sorse per non prendersi la fatiga di altre operazioni che richiede per metterlo poi in sonderia. E sebbene il calcisorme sia di molta rendita, nondimeno, per quanto osservammo, quello in pietra è pesantissimo, e possiede maggior quantità di ferro.

L'eccellenti qualità e bontà del ferro di quelle miniere fon troppo note ed afficurate presso le persone patriotiche e non preoccupate; e l'esperienze di ogni genere l'han troppo evidentemente dimostrato. Ci viene assicurato che i cannoni fabbricati di quel ferro anche in azione viva di guerra sono riusciti migliori di quelli fabbricati di ferro straniero. Potrebbero quelle miniere sole soddissare, in ragione di ferro, tutti i bisogni del regno; e per altro sono in disposizioni tali, che potrebbero benissimo riceverne l'opere

per gli scavi. È quanto mai possa bisognare per completare una fonderia per grande che si voglia, trovasi ivi tutto a soddisfazione, e senza bisogno d'incomodare le vicine popolazioni. D ppiù qualunque sorte di lavori per lo comodo delle vie carrozzabili, si può trasportare sino alla marina, siccome oggi con i carri si trasportano sino alla marina del Pizzo. È pure in ragion di ferro siamo in commercio passivo colle altre nazioni!

Nel fiume Machera ramo dello Stilaro, al di sotto di Pazzano nel luogo detto la salita di Drappida, incentrammo nella sua costa molto vitriuolo di zinco, carattere dimostrativo della esistenza ivi della sua miniera. E se non c'ingannammo, esisteno per lo letto e per le rive di quel siume pezzi di pietra calaminare, ossa giallamina color lionato, e color di siamma; e porzione di alcuni era tutta nera, e come sbricciolata e risoluta. La terra su cui raccogliemmo il vitriolo era di color griggio piombino.

Questo ramo stello si divide in due altri piccioli; verso la fine del ramo destro esistono fruttuosissime miniere di piombo; e nel ramo sinistro sotto la foresta detta del medico incontrammo un grosso strato di quarzo che sa da matrice

a una ricca miniera d'argento non ancor cognita.

In territorio di Bivongi nell'inforcatura de' due rami maggiori dello Stilaro si alza una grossa e lunga collina, che possiede fruttuosa miniera di argento, che su già in pratica. Nella costa del ramo alla destra, nel luogo detto Vasali incontrammo la miniera di rame gialloverde, ossia di color di soglia d'arancio. Ella è accompagnata come da matrice della pietra cornea, è pesantissima, ha la tessitura granosa, la consistenza morbida, di sacile esplottazione, ed è molto ricca.

Ad un miglio in avanti in territorio di S. Stefano nella contrada di Raspa esiste nella stessa costa la tanto famigerata miniera di argento detta di Raspa, di cui ne su principiata la pratica. Or questa di proposito si sece crollare, e se ne coperse la bocca. Per quanto potè superficialmente scorgersi e rayvisare, la testa di un ramo laterale, sorse del filone maestro, come dal sito si congetturava, che trasversalmente si spingeva suori della bassa falda della costa di quel siume, pare che quella miniera debba avere per matrice la pietra cornea griggia, ed il silone n'è perpendicolare; onde secondo tutte le regole metallurgiche esser dee quale appunto veniva decantata, la più ubertosa e la più ricca. È quando, secondo che Vallemont Bomare pretende, è quella la miniera cornea, per esserne la pietra cornea la matrice, dovrebbe, per conto della maggior parte de' mineralisti, dar due terzi per quintale nella sua sussone, che sarebbe una ricchezza estraordinaria; e per altro ne leggiamo registrata la rendita della merà di argento per cantaro,

Si notano in oltre le seguenti miniere, cioè una di argento con piombo nella Serra della Quercia, che dà once quattro di argento, e rotola trenta di piombo per cantaro, e perciò da stimarsi fruttuosa; una simile in contrada di Fiumari, che rende once sei di argento, e rotola venticinque di piombo per cantaro; altre d'argento in territorio di Stilo e nella contrada di Assi del Notero di rendita once dieci per cantaro; altra di argento e piombo nella medesima

contrada, benchè non mai praticata.

Nella foresta di S. Giovanni il vecchio luogo detto i Cafoni esiste ricca miniera di argento, che su in pratica; e per quanto osservammo, è ella fruttuosa. Di sotto la stessa foresta lungo la costa del siume Assi visitammo una miniera di pirite di serro con alquanto di rame, di una estensione e prosondità meravigliosa: era stata questa aperta per quattro bocche tra loro molto distanti, avanti delle quali vi era una notabile quantità di minerale grezzo esplottato, ch' era per ragion del tempo in parte risoluto e decomposto, onde aveva al di suori dato del vitriuolo, dell'alume, e molto solso, il cui odore prima di giungervi era già

cominciato a farsi sentire. E' questa pirite di una tessitura tutta particolare, e pesantissima, ed ha poca matrice grano:a di quarzo; il solso è quello che somministra in notabile dose. Si servivano di questa pirite per metallina.

Alla riva dello Stilaro in aspetto di libeccio, dirimpetto alla Chiesa de' PP. Domenicani di Stilo, esiste una miniera di pirite di rame con sospetto di oro, che si sece coprire.

Or possiamo assicurare che per poco che si guardaise il territorio di Stilo, di Pazzano suo casale, di Bivongi, e in parte di S. Stefano, si ravvisava sempre del minerale, e ad cgni pedata si calpestavano miniere. Le guide che ci scortarono dicevano che alle sorgenti del fiume Assi esistevano ricche miniere di antimonio, che in fatti le ritroviamo registrate coll'espressione miniere di antimonio massiccio; ma il tempo che ci mancava non permise di andarle a visitare. Cade quì a proposito avvisare che dalla famosa miniera di antimonio di Nisi vicino Meisina annualmente si tirano intorno a dugentomila libbre di antimonio grezzo, che i forestieri comprano a vilissimo prezzo, e specialmente i Veneziani, e a noi poscia lo riportano per venderlo carissimamente, purificato che l'hanno ne'loro paesi. La miniera di Nisi dà il quaranta di metallo puro per cento di minerale grezzo, onde si deve stimare ricchissimà; e dello stesso valore dobbiamo stimare le sopraddette di Assi. Gioverebbe assaissimo di averne noi di tali miniere non solo la pratica, ma anche la purificazione, essendone l'una e l'altra operazione facilissima, e di poca spesa, e rispettivamente di molta rendita. Ad oriente di S. Stefano sulle rive del siume Calipari in territorio di Badolato sono miniere di argento, e piombo di molto frutto.

Passiamo sulla costa littorale del Tirreno. Nella marina del Pizzo cade colle sue falde il monte detto di S. Vere i in queste falde, e propriamente nel luogo detto li scogli, esiste miniera zincoserrea in doppia sorma: vi è la miniera detta dal Cronstedt Minera calciformis impura, ocra sive cala

zinci martialis, la quale è per ammassi- di grande estensione. facendo quafi tutta la falda del monte sulla marina, ed è nello stato di una continua fatiscenza, e decomposizione: la sua composizione è il quarzo color celeste smorto, ma per briccioli e granelli: le miche color d'oro, di argento, ed anche nerognolo: la parte ioprabbondante è l'ocra color giallognolo, o rossigno, che forma la giallamina: si veggono ancora in eisa alcuni piccioli granelli quarzoii, per quanto appare, e sono della grandezza più o meno di un seme di canapa, quali rotondi, quali difformi, quali solitarii, quali aggruppati in druse, e di color rosso vinoso: son di faccia come crepolati, onde si veggono come formati per foglietti micacei. L'altra è zincoferrea granitosa, ossia un sasso zincoferreo: e questo è in massi di lunga estensione, e sa da base all'altra soprannotata. E' questo saiso composto di quarzo quasi per ovunque di colore acquamarina, di pochissima mica, e de' medelimi granelli, ove folitarii, ove drutici. Si offerva questo sasso andare, sebbene lentamente, in fatiscenza, e massime ove è più carico di colo.e; e sormare ivi dell'ocra: questa mutazione si osserva particolarmente nella faccia contigua alla miniera sopra incumbente: ove sembra che quella susse prodotta dalla decomposizione di questa, come le composizioni di ambedue par che lo dimostrassero. Nel confine della contiguità di esse si osservano per lo più generarsi due vitriuoli, cioè il verde, ed il bianco, i quali alle volte s' incontrano uniti, alle volte solitarii. Una lunga siliera di grossi pezzi ci questo sasso dal piè della rupe si prolunga sino nell'onde del prossimo mare: e si veggono que' pezzi per la faccia esteriore tutti fioriti in ocra, o meglio in terra vitrinolica rossigna in forma di vernice, parte aderente a quel sasso: e tale invernicatura è molto più copiosa e densa nella vicinanza, e confine tra le due predette minière.

Gli usi economici dello zinco son troppo noti: sarebbe per altro desiderabile che la nostra nazione, giacche abbiamo

miniere

297

miniere ancora noi di zinco, imitasse l'industriosa nazione Francese. Il Sig. Morvò ha tirato dal zinco un bianco inalterabile per qualunque flogisto; ne ha egli insegnato il metodo, e già si è in Francia posto in commercio con sommo vantaggio: ed ecco già soddisfatto il desiderio del pittori per un bianco inalterabile, giacchè quello del piombo riusciva sempre infelice, perchè troppo volentieri si alterava,

e svisava le di loro belle opere.

Bisogna qui avvisare che le montagne del Pizzo e Monteleone son anch' esse formate per ittrati quarzosi, trai quali havvene anche de'micacei, e sono eretti sull'orizzonte, ed in direzione eziandio dall'angolo di mezzogiorno all'angolo di settentrione. Vi esiste benanche il Saxum serreum, ed il Corneus trapezius, che comparisce sì nelle falde sulla marina, come sulla piana. Per le falde spesso s'incontrano di gran pezzi di granito: sulla cima ad oriente della città presso il castello s'incontrano grossi pezzi di un sasso quasi nero, che potrebbe stimarsi un Corneus, ma quello è composto di moltissima mica basaltina nera, e di granelli di quarzo in picciola dose tra loro ben legati; onde sembra piuttosto sasso volcanico.

Sono in Calanda in profonde e lunghe estensioni miniere

di piriti.

In Rosali sopra la Catona esiste ricchissima miniera di argento, non mai praticata nè rivelata, anzi fatta seppellire

tosto che fu scoperta.

In Pedauli nella montagna detta l' Ermelia esiste abbondantissima miniera di ferro e di pirite di ferro eziandio, ben note a que' paesani, delle quali il Sig. Pacifico ne recò varie mostre molto fignificanti.

In Mileto esiste ricca miniera di piombo con argento, ed è questa la miniera di piombo a rombi, ben nota a que' paesani, dai quali ne ricevemmo qualche saggio. Nel luogo detto Saccari esiste per istrati una terra ben particolare, di color fuliginoso chiaro, leggiera piuttosto, che rasa mostra

una faccia tutta liscia e splendente, opportunissima per

disegnare.

Sarebbe uscir troppo lungi del nostro cammino, se volessimo in proposito di miniere scorrere anche la Calabria citeriore, provincia che n'è in possesso egualmente che l'ulteriore, e forse in maggior numero, e in più opportune circostanze. Ma per vantaggio del nostro Sovrano, e per decoro della nazione, e per disinganno de' deboli preoccupati, diremo soltanto, che esistono in Longobucco dieci ben grandi e fruttifere e ricche miniere di argento, le quali surono in lunga pratica, e particolarmente sin dai tempi degli Angioini: ove esistono ancora tre samose miniere di rame, sette di serro, e cinque di piombo. Così che in lungo per le radici di monte Cocozzo, e per le coste di Fiumefreddo esistono nientemeno che diciassette miniere di ferro, e due di rame; e vaste estensioni stratisicate di piriti. Si vuole altresì con sicurezza che in Caccuri esista miniera d'oro.

Le da noi sin qui notate son le miniere aperte e cognite: molte e molte sono in ambedue quelle provincie le nascoste, e molte che per esperienza essendo fruttuose e ricche, secondo le politiche vicende del paese, si coprirono, e particolarmente in parte della Sicilia. Di miniere d'oro non par che si faccia menzione alcuna, benchè a noi sembri che ne debbano esistere (1), e che non sieno per anche note per essere di caratteri difficilissimi, e per non essersi mai avuta premura di cercarle. Le anzi notate sono note e praticate; perchè la natura liberale par che sorzosamente abbia voluto gettarle avanti gli occhi; ed in fatti esse quasi tutte sono colle loro teste a sior di terra.

Giova assaissimo, anzi è di tutto dovere quì avvisare,

<sup>(1)</sup> E' costante tradizione che nelle vicinanze di Nisi i Saraceni tenessero in pratica una miniera di oro da essi stessi in occasione di sconcerti ricoperta.

299

che in ambedue quelle provincie esistono tutti i materiali necessarii per sabbricar delle sornaci, come altresi materiali per qualunque opportunità per facilitare e migliorare la sussione delle miniere di ogni condizione. Oltreacciò i siumi cospirano colle opportunità locali per piantare agiatamente le sonderie, a vantaggio delle compagnie e senza incommodo

delle popolazioni vicine.

Prossimi, frequenti e di molte miglia di estensione sono i boschi, così che se ne può sar taglio senza disagio alcuno delle popolazioni, soprattutto quando la prudenza ne consiglia e dirige l'uso. Una porzione di bosco non più che di quattro o cinque miglia in quadro ripartita in un dato numero di divisioni può a sufficienza somministrar carboni e legna a molte sornaci, ed in perpetuo, facendosene il taglio, come è di dovere, nel modo e legge delle selve cedue divise in tante partizioni. Le sonderie di Stilo, dette le Ferriere, godono per la loro situazione opportunità di ogni genere, massimamente per le legna che son prossime, per le vie che son carrozzabili, e per la salubrità dell'aria.

Si può in oltre mettere in pratica per le fonderie il carbon fossile. In Briatico nel siume da que' paesani detto Spataro, una ben lunga, e prosonda miniera di carbon sossile sa da letto a quel siume, e molto sotto le alte sue sponde si dilata, il qual carbone ancor quando non riuscisse opportuno quale dalla miniera si tira, può però benissimo accommodarsi e medicarsi secondo le regole che c'integnano oggi le nazioni industriose per renderlo atto al bisogno. Fuori della miniera di Briatico vi sono indizi e sospetti sondati che nelle vicinanze di quella stessa, ed in altri luoghi delle due provincie esistano altre miniere del medesimo genere.

Or per quanto la storia ne insegna, surono le miniere delle Calabrie, ed in parte anche della Sicilia, sin dai più alti tempi in permanente e fruttuosa pratica. Ma senza

montar tant'alto, i Registri del R. Archivio della Zecca di questa nostra Capitale ci dettano che dagli Angioini sino a Carlo VI, furono quelle miniere costantemente e con frutto praticate. Da una sola delle dieci di argento di Longobucco gli Angioini tiravano sopra cinquecento quaranta libbre di nostro peso di argento. Ultimamente quasi che la natura per vecchiezza fusse divenuta infeconda, in tempo di Carlo III amantissimo nostro Signore, ebbero quelle la disgrazia di essere discreditate come incorrispondenti ed infruttuose presso la credulità sorpresa dall' accortezza Quelle miniere non mancarono giammai di corrispondenza, se non per molte e capricciose spese e per opere inutili ed estrance all'affare, che vollero farvisi; e chi le ha visitate e conosciute, e fattone anche colle più ubertose di Europa il paragone, non le dirà mai infruttuose e incorrispondenti, ma bensì ubertose e ricche, e per avventura superiori a molte altre dell' Europa.

L'insufficienza o vera o finta degli artefici e lavoratori fece sì che i filoni si praticarono soltanto per le teste, che rispettivamente son sempre povere, nè furono mai profondate a dovere, attaccandosene piuttosto di mano in mano dei nuovi senza necessità. Sembra che l'esplottazioni ovvero scavi si facessero a disagio e senza le regole metallurgiche; e basta veder quelli che si fecero nelle miniere di argento di Nisi per persuadersene, essendo esse tali miniere che senza equivoco alcuno si trovarono sempre in altri tempi fruttuose e felici in pratica. L'operazione la più scrupolosa e di massima e prima diligenza è lo sceltume, cioè la diligente separazione per quanto sia possibile della matrice dal suo minerale; operazione che negletta o satta contro te regole porta per necessità nella fusione spese molto maggiori e discapito ed incorrispondenza di metallo puro; or quali fussero state le fusioni nelle fonderie di Reggio, basta vederne le ferrugini ancora esistenti in gran parte avanti di esse. Dalla negligenza nell'anzidetta operazione e susone ne avvenne per neceilaria conseguenza che fussero quelle miniere valutate di poche once di rendita, quantunque forse si fussero conosciute più vantaggiose; e contuttociò, come si dirà, non infruttuose. Quando dunque queste operazioni fussero state fatte secondo che la docimasia insegna, siam più che certi, che la miniera, p. e., di argento di Valanidi che fu valutata per once diciotto per cantaro di minerale grezzo, l'avrebbero ficuramente valutata per libbre e non per once: e così massimamente le miniere di Nisi, quella di argento in contrada di Assi in territorio di Stilo, e quella di argento detta l'Argentera in territorio di Bivongi. La famigerata miniera di Raspa, siamo troppo sicuri, che debbasi valutare per libbre; per la sua ricchezza manifesta rimase atterrata e coverta essendosi lasciata cadere sulla di lei bocca la falda della collina. Ben volle il generoso Monarca farla riaprire; ma il caso, o gli altrui artifici, o gli accidenti ne lo distolsero. Non per tanto non si vuole preterire che ad onta delle opere di prima mano fattevi con molto lusso e della vera o simulata inespertezza, il Regio Erario se non ebbe vantaggio, non soffrì però discapito alcuno, siccome manifestamente apparisce in un'occhiata dal bilancio che ci troviamo fortunatamente nelle mani favoritoci amichevolmente in Reggio.

Or da qui giova aggiungere che quantunque si valutatle la rendita di quelle miniere per once dodici, quattordici, e diciotto, e quelle di Nisi diciannove, possono benissimo dirsi fruttuose, non sembrandomi di si picciolo valore l'aver di rendita per un cantaro di minerale grezzo, o dodici o quattordici o diciotto o dicionnove once di argento puro, cioè per ogni cantaro o diciotto o ventuno o ventisette o ventotto ducati e mezzo; senza mettere a conto la miniera di Raspa, ed altre che anche si possono incontrare fruttuose.

Le altre miniere non hanno bisogno di apologia. Quelle di rame, quando anche la pratica non le avesse dichiarate fruttuose ed ubertose es per ottimo il loro metallo,

si manisestano tali dapertutto a' buoni osservatori. Quelle di serro non hanno bisogno de' nostri elogii nè per l' ubertosità, nè per la vastità, nè per la bontà della loro natura. Quelle di piombo presentano per ogni dove copiosamente il loro metallo, onorate dalla compagnia dell'argento, per cui fruttuosissima n'è la rendita. Quelle di antimonio sono fruttuose e di ottima indole. Quelle di zinco che sino ad oggi sono rimaste incognite, non si possono valutare, sebbene per altri caratteri promettono di essere fruttuose. Di quelle di arsenico, e di manganese, benchè sappiamo che esistano, non possiamo darne idea chiara. Dell'esistenza di quelle di stagno e di mercurio nulla possiamo assicurare. Debbono esservene di cobalto e bismuto.

Esiste in Squillace ubertosa miniera di piombagine, ed è di molta rendita per gli usi civili ed economici: i caratteri esteriori indicano avere del ferro: e altre molte n'esistono in quella provincia; nelle rive del siume Amato evvene eziandio in molta copia. Ne' luoghi detti Punghi e Poddillo in territorio di Bivongi osservammo due miniere di squissta molibdena. Trattata collo stesso processo di Scheele ci diede i medesimi risultati: il Sig. D. Antonio Pitaro mi favorì di sua assistenza: le miniere di molibdena sono state sino ad oggi, per quanto mi ricorda, totalmente incognite in questo paese.

E' troppo stimabile una spezie di seldspato che in quella provincia incontrammo. Ha la faccia vitrea e quasi diafana e scintillante al batterlo coll'acciarino, resistente agli acidi minerali; le particelle costitutive son di sigura indeterminata, e solo in rarissimi punti son come laminose. Il colore è tutto bianco, in rare parti dei suoi massi comparisce alle volte acquamarino. Esiste ordinariamente in massi di maravigliosa grandezza servendo di salda alle colline: s'incontra alle volte di quà e là in pezzi totalmente disparati, e di diverse grandezze, o a sior di terra, o nelle sue viscere internato. La natura con maraviglia di chi l'esamina

dappresso risolve questa pietra in una farina sottilissima e tutta bianca: si vede alla prima screpolarsi sottilmente, indi come andare a perdere l'acqua della cristallizzazione e rendersi opaca, se ne rilasciano in seguito vieppiù le particelle e compariscono sin dal fondo come farinose per la loro superficie; risoluzione che nasce sin dal più interno de' massi; ond'è che in alcuni luoghi sembrano i suoi massi tanti grossi aggregati di minutissimi briccioli come incalcinati, i quali alle percosse facilmente si sciolgono. Ed ordinariamente è tale la risoluzione che attacca tutto insieme i massi e i pezzi che s'incontrano, e per tutta la di loro fostanza, anche prima di perdere l'acqua della cristallizazione; di modo che anche strofinandosi colle dita si sbricciolano e si convertono in polvere minuta. Nelle rupi piovendo, fi vede colare la sua farina in tanti rivoli di latte, che imbianca quanto ricopre.

Posto a suoco di sussione questo seldipato, o la sua terra farinosa, come nella sornace della R. Porcellana la prima volta si osservò, si sonde, senza aggiunta alcuna di sali, in un vetro tutto duro, eguale, diasano, e di un color paglino leggerissimo e delicato, quando la sua farina n'è tutta sottile: ma la mistura tutta insieme di grossolano e di farinoso, acquista un colore ssumato acquamarino.

L'analisi ci dimostrò, che suor della sua terra silicea, ed argillosa, conteneva una dose molto sensibile di magnesia. Fuori delle terre predette manisestò possedere anche del

ferro, ma in una dose disprezzabile.

Avendone da persona pratica ed intendente del mestiero satto sare impasto coll'argilla di Vicenza, e sormare piccioli lavori, cotesti biscotti, sebbene satti per un semplice ed estemporaneo saggio, e senza le doyute lunghe preparazioni, son pure riusciti tali, che presentati, e satti esaminare a persone troppo bene intese e pratiche, tutte comunemente gli hanno dichiarati, senza equivoco alcuno per un saggio dimostrativo di una verace porcellana per tutte le sue

qualità: convenendo in assicurare che un tal materiale non solo era opportunissimo per tali lavori, ma che impassato colle dovute regole, e con argille proprie, avrebbe data una porcellana eccellente, se non superiore, eguale certamente, e niente inseriore alle migliori di Europa. I più eccellenti e pratici vasellai della città l'hanno tutti comunemente stimato per eccellente, e ne hanno satte premurose richieste. Oltreacciò le pruove han dimostrato esser proprio eziandio per la vernice o coverta della porcellana, riuscendo dilicata, trasparente e bianchissima. Ma la proprietà più stimabile, e vantaggiosa di tal seldspato, è appunto l'esser di tutti i sondenti conosciuti il più proprio e qualificativo per sormar degli smalti, soprattutto a color blò, ed a color verde, come l'esperienze sattesene hanno dimostrato.

L'ingrediente di cui i Sassoni si servono per la loro eccellentissima porcellana, stimata superiore ad ogni altra Europea, non è che il feldspato, siccome è già ultimamente stato scoverto e pubblicato. E noi siamo in opinione che l nostro feldspato sia forse assai più persetto di quello dei Sassoni, e che si accosti al petunsi de' Cinesi. Per altro non farebbe maraviglia, massime per coloro, che le condizioni delle nostre Calabrie conoscono bene, che esse possedessero un materiale quale la stessa Cina possiede. Laonde avendos un'argilla porcellana verace qual si trova nella Cina, o simile almeno ( la qual cosa nè anche porrebbe mancare nelle Calabrie che hanno sì nobile petunsi) potrebbe fabbricarsene una porcellana simile a quella che nella Cina si fabbrica. Diciamo sinceramente, per alcuni indiz e contrassegni che n'abbiamo, che un'argilla porcellana verace, facilmente essta in quella provincia. Molte e molte eccellenti argille sono in quelle provincie, onde si potrebbero fabbricare, non solo vasellami nobili di eccellenti e diversi gradi di bontà, ma eziandio di altre sorti, che sebbene d'inferior qualità, utilissime sarebbero per l'economia civile, che troppo si duole di esserne priva, ed intanto le trascuriamo, e siam contenti di tirarle da straniere contrade. Vuolfi

### 305 W

Vuolsi avvertire che 'l prelodato seldspato non in tutti i luoghi s'incontra della medesima bontà, per quanto il suo esteriore par che dimostri. Noi l'incontrammo in Paralia, in Tropea, in Casalnuovo, e nelle Serre di Sinopolillo, ed esiste ancora in molti altri luoghi. Quello di Casalnuovo ci parve di minor bontà, siccome quello di Sinopolillo di

tutti il migliore.

Incontrammo parimente per que' luoghi altra pietra di fimili proprietà, ma di color misto di bianco e cenerino. o torchinetto, ed alle volte inclinante al verdognolo. Ella egualmente, senza ajuto alcuno, è tutta fusibile, e dà un vetro quasi tutto opaco, duro, scintillante, eguale, di color grigio metallico fimile al color che presenta nella sua frattura un pezzo di bronzo; e con meraviglia si veste al di fuori di una vernice naturale tutta eguale, e che poco sente la lima, non trasparente, ma di un lustro metallico, e di color castagno assai vago: la quale veduta dagl'intendenti è stata caratterizzata per la vernice di color castagno della Cina, ma il suo lustro è atsai più bello. Questa pietra è composta dello stesso sopraddetto feldspato, di molta argilla vetrificabile, e di non picciola dose di ferro, e la natura la risolve nella stessa guisa del feldspato. S'incontra quasi sempre per gran massi già risoluti, ma come pastosi per la dose dell'argilla sviluppata. Il feldspato facendo da fondente. incontrando la calce metallica in compagnia in questa pietra, ben s'intende la formazione di quell'esteriore smalto, di cui si veste nella sua susione: ed ecco come la stessa natura ci fa da maestra, e quando la sappiamo ascoltare, riportiamo dalla fua fcuola fempre mai speciosi vantaggi.

La parte la più sottile è quasi amidacea della terra farinosa del soprallodato petunsì posta a digerire in vaso di vetro al sole, e coverto, in una dose di acqua venti volte maggiore per ragion di peso: dopo quindici in venti giorni cominciò quell' infusione a dare un puzzo stomacoso, e quasi che cadaverico; e quantunque si sulle cambiata l'acqua per

più volte, non però cessò quel puzzo, ma foltanto fi diminui ed al fine si dileguò totalmente, restando quella terra simile ad un amido. Questo senomeno richiede ulteriori osservazioni.

Quali mezzi pratichi la natura per risolvere, e diciamo anche decomporre, pietre di tal genere in quella provincia, (quando non si vogliano quelle di specie d'un' indole particolare) confessiamo non vedere con chiarezza. E' certo però che non mancano in quel suolo vapori falini, e flogistosalini, i quali incontrandole potrebbero forse indurvi sissatti cambiamenti. e far acquistare alla loro sostanza nuove qualità, ed eziandio trasmutarle in materiali di altra sorte. Nella confinante Calabria nel territorio della terra Longobardi la miniera di marchesita, che ha per matrice il quarzo, si osserva che decomponendoii, risolve e decompone con i suoi vapori sulsurei il suo quarzo in una terra argillacea, e silicina tutta nera; ove friabile e come carbonosa, ove restando legata quasi in forma di lapis da designare: ed in fatti è tutta liicia, dolce al tatto, ed imbratta di nero le dita, e noi ne abbiamo alcune mostre molto interessanti.

Il fegato di solfo è frequente per quel suolo: si sa benissimo, elevato questo in aria epatica, quanto vaglia sopra le sostanze metalliche massimamente e per risolvere, e per trassormare, e per decomporre, e per produrre suovi prodotti.

Avendo a lungo discorso della struttura interna di quella catena di montagne, egli è supersuo parlar dei quarzi. Diciamo tuttavia che noi, suori del Quarzum Iacobinum, v'incontrammo tutte l'altre spezie: il crystallinum è assai lodevole: l'arenaceum s'incontra far delle rupi. In Drapia picciolo casale di Tropea sa questo da matrice ai granati, i quali sebbene grandi, e ben saccettati, son però friabili e sarinosi. Molto frequenti ed assai lodevoli sono le cristallizzazioni quarzose che s'incontrano in monte Cocozzo, e Fiumesreddo della Calabria consinante.

La mica, che volgarmente diciamo talco, vi è anche in abbondanza. In Pedauli ve n'è una bellissima miniera a lunghi strati. In S. Lorenzo s'incontra in disposizione alternativa col quarzo; quanto dire le lamine o strati calcosi alternano con gli strati quarzosi sottilissimi.

L'amianto color verdognolo è in abbondanza nel territorio di Casalnuovo. Incontrammo l'amianto alusa montana sul littorale della Calabria citeriore nel luogo detto

Galamascione.

In S. Fili per le rive del fiume Vacale, esiste per istrati di lunghe estensioni lo Schistus pinguis del Vallerio. Questa pietra sciolta in vaso pieno di acqua veggonsi a capo di un giorno a pelo d'acqua spianate delle gocciole di petrolio: l'acqua ne dà un odore piuttosto grazioso; e gustata un sapore eguale al sapore dell'acqua di pece liquida, o sia catrame. La terra di questa pietra purificata riesce per la pittura assai utile soprattutto per la sua facile e grande estensione.

Le torbe in seno delle valli della piana son frequenti, e propriamente ne' luoghi argillosi. Le terre imbevute di petrolio si son satte vedere in molti luoghi aperti dalle scosse del terremoto.

Le scosse de terremoti dal fondo delle aperture per quella piana prodotte, diedero fuori in gran copia il ferro,

detto ferrum arenosum.

Le spezie di steatiti che in Vallerio leggiamo, tutte s'incontrano in quelle due provincie, e massime nella citeriore, e sono assai lodevoli. La steatites lardites, o steatites vera s'incontra per vene molto larghe, e come a strati nella contrada detta degli Archi a tramontana di Reggio, ed è di assai buona qualità, e sarebbe opportunissima per ornamenti, e per vasi. Or questa spezie di steatites se non dapertutto in ogni dove, trovasi in alcuni luoghi siglia del quarzo. Noi abbiamo un bel pezzo di quarzo, di cui una porzione è passata in steatite; e ci riserbiamo ad altro tempo l'indagarne e dirne la ragione.

Avendo nel nostro ritorno dovuto pernottare alla marina del Cetraro, ne' pochi momenti che avemmo di agio, scorso alquanto il letto e le rive di quel siume, incontrammo diaspri d'una durezza inestimabile, e bei sassi serpentini degni di adoperarsi in qualunque nobil lavoro. Erane una spezie dura, alquanto scintillante, colore acquamarino, che pare una spezie di zeolite, tutta guernita di glandole bianche silicine, il che produce una vista graziosa; noi ne serbiamo un pezzo. La Calabria citeriore è melto ricca in pietre di ornamenti per altri usi nobili.

Sarebbe stato giovevole sar l'enumerazione delle specie de' testacei non ancor risoluti, che nella Calabria ulteriore s'incontrano, veggendosene delle spezie rare, ed alcune che ne' nostri mari oggi non vediamo. In Briatico, in Schiti, in Tropea è frequente una spezie di echino molto rara, che è l'Echinanthus Ovalis (1). Un'altra assai più bella spezie n'incontrammo nella marina del Pizzo alla destra verso l'Angitola; la quale è l'Echinanthus planus secunda species del Runsio (2). Ne tralasciamo le descrizioni per

non esser troppo lunghi.

In seno delle argille in Seminara, ed in altri luoghi vicini, alla prosondità di cento cinquanta piedi, s'incontrarono molti ben grossi dentali. Verso le più alte parti del Jejo, e Sagro ad occidente, tra gli altri testacei s'incontrarono molti del Cornu ammonis (3). Mi ricorda a questo proposito, avere ad occidente di Monteleone poco suori le niura, lungo la via, osservato, non senza maraviglia, le pareti di un picciolo antico edisizio sabbricate di pezzi quadrati a taglio, il cui composto naturale era un ammasso ben legato e gagliardo di picciole telline con pochissima sabbia tramischiata.

<sup>(1)</sup> Gualther. Tav. 110, fig. IV.

<sup>(2)</sup> Thefaur. Tab. XIV, lit. F.

<sup>(3)</sup> Runf. T. LX, lit. D.

I pezzi di taglio delle mura dell'antico Hypponium, nel cui mezzo oggi siede la città di Monteleone, sono arenarii composti d'arena di mare, frantumi di testacei, e testacei

interi legati con poca marga.

Un miglio a mezzogiorno da Tropea nel luogo detto Riace, la costa che a picco cade sul lido arenoso, ed a lungo s'innalza per piedi cento cinquanta e dugento, è un ammasso ben compatto e legato d'arena, di marga, e d'una strabocchevole copia di diverse specie di testacei, e vi s'incontrano eziandio madrepore, retipore, dell'iside nobile, o sia corallo rosso, come l'Echinanthus ovalis. Vi osservammo eziandio ne'luoghi ro:ti dal terremoto, ma di raro, de'pezzi di ossa, che di pesce non erano assatto. Nella stessa costa nel luogo detto il Campo in compagnia del Sig. D. Giuseppe Russa Professor di medicina in Tropea, osservammo che nelle salde ivi di una valletta erano prosondi ammassi di minutissimi tritumi di testacei già divenuti di sostanza spatica ed in parte anche silicea.

Or quella penisola è bagnata, oltre de'piccioli ruscelli, da quarantotto fiumi, che in gran parte rassembrano piuttosto torrenti. I due fiumi più grossi sono il Metramo, o come altri dicono Mesima, ed il Metauro, oggi detto Petrace, che a ponente sboccano nel golfo di Gioja, a distanza fra loro di miglia quattro. Questi colle loro moltiplici ramificazioni bagnano tutta l'estensione del suolo di quella gran valle, o piana, il Metauro a mezzogiorno, il Metramo a settentrione; e così dividono e suddividono il suolo per profondi tagli in tante linguate, che que' paesani chiamano filese, sulle quali son poste per lo più le città e i villaggi della piana. I fianchi di tali filese, perchè sono ordinariamente composte per la maggior dose di marga bianca, compariscono a lunghi tratti bianchi, che vengono chiamate galasse. I predetti due fiumi per un terzo del loro corso in giù fino alle loro foci, scorrono per piani molto bassi e dolci, son perciò lenti e ardi, ed i loro letti ne sono a ribocco interrati, per lo

che ne nascono lateralmente varii ristagni, siccome si vede con particolarità nel territorio di Rosarno. Le acque del Metramo (per quanto nel mese di maggio era la loro portata, e secondo la larghezza del letto che osservammo) e la loro altezza possono valutarsi per passi venticinque in larghezza nell'altezza di palmi due. Quelli del Petrace son quasi della stessa misura.

D'ordinario le acque di quella regione non sono di buona qualità, per la condizione del suolo per cui scorrono: onde ve ne sono anche delle nocevolissime alla salute, massimamente a persone non avvezze a berne, e queste propriamente per le marine: imperocchè scorrono per suoli margaceoargillosi, o argillosi, onde son sempre lorde di tali elementi, che nuocono alla salute. Sappiamo noi per esperienza che i luoghi argillosi sogliono spesso cagionar malattie perniciose, e d'indole maligna. Da Reggio a Gerace per lo cammino di tre giorni su la nostra picciola compagnia obbligata a tollerar la sete per quel cocentissimo lido, per la cattiva qualità dell'acqua.

Sono in S. Biase di Nicastro sulla marina delle terme molto copiose, ma da noi non visitate. Di quelle di Gerace se n'è già fatto motto. Nel borgo della città del Pizzo vi è un picciolo ruscelletto di una debolissima acidola, che sorge tra gli strati del Saxum ferreum: nel suo corso tinge di ocra di serro quanto incontra. Erano in Rosarno delle acque minerali, ma la negligenza le ha fatte disperdere.

La piena e pronta vegetazione ed immancante ubertofità di quella provincia, particolarmente della piana, è tutta dovuta alla gran copia delle calci testacee rimescolate colle argille, e con altre terre vegetabili che dalle montagne dilamano: e ad una perenne e dolce fomentazione che l'uolo riceve da un sotterraneo nativo calore proprio del luogo per la qualità de materiali sottoposti.

Il fuolo quasi per ogni dove è occupato da vaste e folte selve di olivi di grandezza notabilissima, e di meravigliosa ubertosità: la bontà degli olei, particolarmente intendendo della costa sul Jonio, è in grado eminente. Le piantagioni di viti sono abbondanti; e la squisita qualità de' vini si vuole antiporre a molti vini sorettieri. Quelli della predetta costa orientale del Jonio, e particolarmente que' di Gerace, senz'arte e senza ajuto alcuno, liquori più tosto che vini possono dirsì, e sono d'una grazia di bocca inestimabile, nè loro manca per allucinare i ricchi che il titolo di stranieri. Il commercio delle sete, e degli spiriti e liquori che se n'estraggono, dimostra la feracità della provincia.

Sono i lini, particolarmente detti femminelli, eguali a quelli di Alessandria per la loro qualità; massime quando non vengono adulterati per aliené mani, e questa derrata

tutta si manda suori regno.

I grani sono a sufficienza, e per lo paraggio di Catanzaro e vicinanze in grado anche di commerciarli. Si potrebbero le vaste estensioni di quel marchesato impiegare a semina, quando non s'impiegano ad altro uso niuno per sollievo ed aumento di quella nazione. Vi sono sufficienti pascoli, e

non pochi bos hi di quercie per la pastura.

Sulla punta d'Italia, o sia Capo Spartivento, è quella picciola contrada alla destra del siume Alice, o di Amendolia, non corrispondente al suolo di quella provincia, e per ogni altro carattere assai particolare. Per l'asprezza del suolo sassos è tutta sterile; onde gli abitanti ne son poveri, massime che per l'inaccessibilità de' luoghi manca ogni commercio con i circonvicini: per lo che vi è pochissima, e quasi niuna cognizione di denaro. Sono quegli abitanti un avanzo delle prime emigrazioni de' Greci venuti in quella costa, che non ha ricevuto niun'alterazione estrinseca, suorchè dal tempo; per la qual cosa sentesi nelle loro bocche il nativo greco linguaggio, comechè debole e rozzo, senza lasciare di possederne alcune picciole reliquie e smorte radici.

# SEED SEED SEED. SEED.

MEZZANA ANTICHITÀ IV CLASSE.

## XIV

#### ILLUSTRAZIONE DELLE MONETE

CHE SI NOMINANO NELLE COSTITUZIONI DELLE DUE SICILIE

DEL SOCIO D. DOMENICO DIODATI

Letta nella R. A. in due assemblee nel 1784 e 1786.

TNa novella accademía stabilita a vantaggio e decoro dello stato è debitrice alla nazione di prima illustrar le cose patrie, anteponendo sempre le utili e fruttuose materie alle galanti. E' già gran tempo da che si brama di veder messa in lume quella parte di antichità, che tende a rischiarar le leggi, colle quali viviamo; voglio dire il codice delle costituzioni delle due Sicilie dell'immortal Federico II. Quest' opera stupenda della mezzana antichità è il più delle volte oscurissima per le poco conosciute usanze di que' tempi. Or fralle cose che più ne turbano la chiarezza e l'esecuzione insieme, sono appunto le monete che spesso vi si adoperano, ora per pesi feudali, ora per ricompense, spessissimo per pene pecuniarie, talvolta per salarj de' notari, tal altra per mercedi de' subalterni, senza punto annoverar le somme prescritte per norma de' contratti, e l'ordine de' giudizii: quindi è che senza una esatta cognizione di que' danari, le leggi suddette a buona equità non si

possono eseguire, nè osservare. Avendo io a queste cose riguardo, ho preso ad illustrar le monete tutte nominate in quel codice, a determinarne il valore, e a far di esse colla pecunia che oggi corre tra noi un accurato ragguaglio. Non si riguardi questo lavoro come consacrato unicamente al soro; perciocchè è diretto egualmente alla utilità della storia, della diplomatica, e delle antichità de' tempi mezzani; e sebbene appartenga a' secoli rozzi, spero nondimeno che non sia per essere dispiacevole. Le muse barbare, benchè ruvide e disadorne, hanno pure le loro attrattive. Esse però adescano i seguaci loro non con vezzi, ma con doni; e godono di essere riputate anzi benesiche, che lusinghiere.

#### PARTE PRIMA

## Valor legale delle monete nominate nelle costituzioni.

Prima di entrare in aringo fa di mestieri premettere un'osservazione molto essenziale, che serve all'opera come di base e di sondamento. In tutte le monete si debbono distinguere tre diverse specie di valori, cioè; I il valor legale, o sia estrinseco; II il valore intrinseco; e III il valore, che io chiamo di commercio. Si dice estrinseca, o legale, ed anche numeraria quella valuta, che la legge o il governo assegna a ciascuna delle proprie monete. In questo regno, a cagion di esempio, è stato assegnato al grano la valuta di dodici calli, al carlino di dieci grana, al tari di venti, al ducato di cento, e così discorrasi delle altre. Si chiama valore intrinseco il prezzo del metallo, che ogni moneta in se contiene. Questo valore è più o meno secondo la qualità, il peso, e la bontà del metallo, che ha la moneta. Così presso di noi nove trappesi ed acini diciassette e mezzo d'oro di carati ventuno e tre quarti formano il valore

intrinseco della doppia di sei ducati; trappesi venticinque d'argento della bontà d'once dieci costituiscono il valore intrinseco del ducato di fresco coniato nella nostra zecca: e trappesi sette di rame fanno l'intrinseco del nuovo grano. Chiamo finalmente valor di commercio quella proporzione. che la moneta ha colle cose tutte che sono in commercio. Questa proporzione non è costante, ma varia cogli anni. Oggia cagion di esempio, venti carlini in circa corrispondono al valore di un tomolo di farina: ma ne' passati secoli cogli stessi carlini venti se ne avevano più tomoli. E' stato osservato in un testamento antico, che un nobile Siciliano lasciò ad un suo schiavo quattro grana al giorno con questa espressione, ut commode vivat (1), Oggi quattro grana appena basterebbero ad una persona per vivere di pane ed acqua; appunto perchè la proporzione tra la moneta ed i generi, che sono in commercio, è notabilmente variata. Stante queste premesse ognun vede, che per illustrar pienamente le monete delle nostre costituzioni, e per farne l'accurata riduzione, conviene di ricercare in esse le tre divisate specie di valori, e confrontarle co' respettivi valori delle odierne. L'opera è ben malagevole, ma necessaria, senza la quale ogni rapporto è grossolano ed inutile. Quindi per ordinatamente procedere, distribuirò questo mio accademico lavoro in tre parti, nelle quali esaminerò partitamente ciascuno de' divisati valori; ed in questa prima il valor legale.

Della Libbra D'oro semplice.

Quanto era usata a' tempi barbari la libbra d'oro, altrettanto sconosciuta è a' giorni nostri. Che cosa era la libbra d'oro? Era nome di peso, o di moneta? Era metallo in massa, lavorato, o pure coniato? Essendo in

<sup>(1)</sup> Memorie per la Stor. Letter. di Sicilia tom. 3 par. 6 p. 66. R r 2

massa o lavorato, perchè si adoperava per moneta? E se era moneta, perchè si esigeva a peso, e non in numero? In conclusione quanto si valutava in que' tempi la libbra suddetta? Ecco qui un gruppo di dubbj intrigatissimi, che niuno de' nostri scrittori, per quanto io sappia, ha pensati ancora, non che sciolti. Essendo una tal libbra usata frequentemente nel codice Federiciano, e sormando essa una parte essenziale della numismatica de' rozzi secoli, sarà pregio dell'opera esaminarla a sondo; tanto più perchè da essa derivano molte altre monete non solo nostre, ma di altre nazioni d'Europa.

Offervo nelle costituzioni del regno due specie di libbre d'oro: la prima semplicemente detta libra auri, e la seconda libra auri purissimi. Erano queste due libbre differenti tra loro, e perciò si devono distintamente illustrare. La libbra d' oro semplice viene sempre mai usata come specie di moneta. Così nella costituzione Quastiones omnes si dichiara, che il credito che si pretende contro il sisco, si excedit libram auri, probari debet per instrumentum, et per quinque testes. Nella costituzione Instrumentorum robur si stabilisce, che negl'istrumenti dei contratti infra libram auri vi debbano intervenire due testimonj, et ultra libram tre. Nella costituzione In causa depositi si legge, che a provare il deposito infra libram auri ci bisognano tre testimoni, et ultra libram quattro; e così altrove, In queste costituzioni, come è manifesto, le libbre vengono adoperate come monete, colle quali si misura il valore de' crediti e de' contratti.

Per dimostrar l'origine di queste libbre, sa mestieri ricorrere ai secoli superiori. Nella decadenza del Romano impero insieme colle scienze e colle belle arti, anche le monete dall'antica loro dignità tralignarono. Laddove prima erano di argento e di oro puro, al declinar dell'impero, e specialmente all'arrivo de' Goti, cominciarono ad essere alterate. Quindi surono introdotti i nummi tinsti, che noi

chiamiamo monete metalline, le monete erose, dette da' Francesi billon, e quelle de auro electro (1). Ma questo era poco. La zecca generale d'Italia era prima stabilità in Roma. Alla venuta dei barbari ne uscirono diverse: e queste a poco a poco si moltiplicarono a segno, che non vi era città libera o fignoria, la quale non avetse zecca propria. I privati feudatari, i vescovi, e fin anche i monaci esercitavano questa regalia (2). E questo anche era poco. I principi stessi, che doveano essere difensori della pubblica fede. erano talvolta i primi a violarla, o valutando il proprio danaro più del dovere (3), o caricandolo di soverchia lega, o fabbricandolo di piombo, di cuojo, di cartone, di vetro, o di altre vili materie, comecchè non ne avessero avuto sempre il bisogno. A così pessimi esempi può immaginare ognuno quel che potevano attentare le persone private: onde ogni nazione si vide a buon'ora inondata da un diluvio di danari logori, scemi, e tosati, senza punto parlar dei falsi. In mezzo a tanti sconcerti le zecche di Europa, e le monete tutte caddero generalmente in discredito. Il traffico era continuamente perturbato; i compratori e venditori in perpetue contese; e tanta era la diffidenza della moneta. che il più delle volte si risiutava anche la buona. Li principi zelanti, per rendere la calma al commercio, emanavano tutto di rigorosi ordini, perchè non si ricusatse la pecunia buona e di giusto peso, come si vede nel codice delle leggi barbare raccolte dal Lindebrogio (4), senza punto parlare delle Romane. Sicchè i contraenti forzati dalle leggi, e più dalla necessità del commercio, per disendersi dalle frodi universali, adoperavano diverse cautele. Taluni

<sup>(1)</sup> Frölich Not. element. numism. p. 3. edit. Vien. 1758.

<sup>(2)</sup> V. Tomasino Eccl. Difc. P. III lib. 1 c. 27 n. 4 c. 28 n. 2.

<sup>(3)</sup> Muratori Antiq. medi Evi Disser. 28 pag. 773 lit. D.

<sup>(4)</sup> Lindebrogio Cod. Leg. antiq. pag. 155 307 355 687 89&

ne' privati contratti, specialmente quando trattavasi di picciole somme, convenivano di pagarsi moneta buona; e la spiegavano con alcuni di questi aggiunti, danari probati, sonanti, grossi, mundi, expendiviles, o con altri simili, de' quali son piene le carte di quei secoli. Altri poi più acconciamente si

cautelavano ricevendo le monete a peso.

La costumanza di ponderare il denaro, comecchè praticata dalle antiche nazioni, nondimeno per la calamità de' tempi fu în molta voga ne' secoli mezzani e bassi. Abbiamo nel codice Teodosiano due leggi a tal proposito. La prima è di Costantino il grande, il quale prescrisse il modo come doveansi bilanciar le monete: la seconda è dell'imperador Giuliano, che per frenare i contrasti, che da per tutto facevansi a causa de' soldi logori e tosati, in ciascuna città dell'impero stabili un zygostates, o tia un pubblico pelatore (1). Parecchie altre leggi trovo emanate all'istesso proposito da diversi sovrani posteriori, come da Teodorico re de Goti, da Giacomo re di Sicilia, da Carlo I di Angiò, dal re Roberto, dal medefimo Federico II, e da altri; ma le tralascio tutte per recare un bel passo di Odoranno cronista Franzese del XI secolo, in cui si rappresenta al vivo l'usanza, che allora correva di ponderare Et statim proferens auri tredecim solidos ad il denaro. publicam monetam Aurelianensem appensos; si tibi, inquit, non sufficit mea ponderatio, prabeat sidem proprio oculo iterata propensio (2).

Un tal peso però non si faceva alla minuta, quando le monete erano assai, ma bensì all'ingrosso, cioè a libbre. Giova molto al mio disegno il mettere in chiaro questa verità, che sorma la face principale delle mie illustrazioni. In uno strumento dell'archivio di Montoliveto di Napoli

<sup>(1)</sup> Codice Teodos. lib. XII tit. VII leg. 1 & 2.

<sup>(2)</sup> Duchesne Hist. Francor. Scriptor. tom. II pag. 640,

rogato in Leece nel 1187 si legge venduto un orto, e per prezzo il venditore si ricevè una libbra di buoni provisini (che erano monete di argento molto usuali in quell'età (1)) Pro confirmatione hujus mee vendicionis recepi a manibus tuis libram unam bonorum provisinorum finitum et constitutum pretium. In una carta del 996 inserita nella cronaca di Vulturno si promettono novantasei libbre di argento monetato: Pana obligata componere promittimus & obligamus de argento monetato libra 96, quia talis fuit nostra convenientia (2). M3 quando si trattava di grosse somme, allora facevansi i pagamenti a libbre di monete d'oro. S. Gregorio Magno per una penuria accaduta in Roma verso l'anno 590 commise a Pietro suddiacono in Sicilia di spendere cinquanta libbre d'oro in compra di grani. Quinquaginta auri libras nova frumenta compara (3). Anastasio Bibliotecario narra, che il pontesice Gregorio II per riavere da' Longobardi il castel di Cuma, Septuaginta auri libras dedit (4); che papa Zaccaria impiegò viginti auri libras pro emendo oleo (5); che papa Adriano per rifare le mura e le torri di Roma Ufque ad centum auri libras expendit (6). Ma perchè taluno potrebbe anche dubitare, che le libbre d'oro qui allegate fossero state libbre di monete, voglio aggiungere altre pruove speciali specialissime che erano libbre d'oro monetato. I soldi michelati, come gli eruditi sanno, erano nummi aurei Michaelis Constantinopolitant imagine signati (7); e pure nella cronica Casinese si legge, che l'imperatore Alessio mandò in dono al monistero di Montecasino otto libbre di que' soldi: Libras osto solidorum

<sup>(1)</sup> V Argelati de Monetis Italia tom. Il pag. 184. (2) Muratori Script. Rev. Italia. tom. I patt. II pag. 486.

<sup>(3)</sup> Di Giovanni Ced. Diplem. Diplem. 77 pag. 123. (4) Anastasio Bibliot. tom. I pag. 166 n. 181.

<sup>(5)</sup> Lo stesso ivi pag 189 n. 2192 (6) Lo stesso ivi pag. 255 n. 326.

<sup>(7)</sup> Ducange in Gloss. Latin. voce Michaelitia.

Michalatorum misit ideo Imperator (1). Gli agostari, come tutti sanno, erano monete d'oro fabbricate da Federico II: e pure Guido Bonati scrittore contemporaneo descrivendo la somma del danaro lasciata dal famoso Pier delle Vigne l'enumerò a libbre di agostari. Eccone le parole: Est inventus habuisse en bonis solum in auro 1000 libras augustanensium (2). In una carta del 998 inserita nella citata cronaca di Vulturno, si promettono sei libbre di monete di oro: Quod fi he: omnia non conservaverimus.... pæna obligamus nos vel nostris heradibus de auro monetato libras sex (3). Dal che si ritrae, che le libbre d'oro nominate nelle nostre costituzioni, e che sono tanto rinomate nelle memorie, e negli scrittori de' tempi barbari, erano libbre di monete, che si ricevevano a peso, a fine di scansare le frodi delle scarse e mancanti. Talchè se le monete erano logore o tosate, un maggior numero di esse ce ne bisognava per formar la libbra; se erano calanti ce n'entrava un numero minore. Quindi la libbra d'oro, che da principio era nome di peso, a poco a poco col rendersi comune e generale diventò una specie di moneta di determinato valore, onde le cose più preziole erano comprate e valutate: moneta che non si pagava numerando, come si fa di tutte le altre, ma bensì ad pondus: e per conseguenza in essa non si aveva riguardo al numero de' nummi, ma al peso totale. E poichè il peso della libbra in queste nostre regioni su generalmente diviso in dodici once, l'oncia in trenta tari (che i nostri argentiere chiamano trappesi), ed il tarì in venti grani, o sieno acini; quindi addivenne, che l'oncia d'oro, il tarì d'oro, ed il grano d'oro da nomi di pesi passarono anch'esti in nomi di monete. Ed ecco svelata l'origine dell'oncià, del tarì,

<sup>(2)</sup> Chronic. Cafin. lib. IV cap. 17.

<sup>(2)</sup> Guido Bonati Affron. Trat. V Conf. n. 141.

<sup>(3)</sup> Muratori Scrip. Rer. Ital. tom. I p. II pag. 486. B

e del grano tanto nominati ne' secoli barbari, e nelle costituzioni del regno; monete le quali anche oggi sono in

pieno uso presso di noi.

Nella stessa guisa giudico, che nascessero le tante specie di libbre o sieno lire, che oggi si usano in diverse contrade di Europa. Esse erano da principio pondi di monete d'argento, o di rame: coll' andar del tempo divennero altrettante spezie di monete, le quali secondo la diversità de' metalli e de' pesi, che allora si adopravano ne' diversi suoghi, diverso valore acquistarono. La lira sterlina, che oggi si adopra in Inghilterra, credo che da principio sosse stata libbra di monete di argento. La lira di Francia, e quelle di Amburgo, Basilea, Ginevra, Strasburgo, Milano, Torino, Genova, Venezia ec. non dovettero esser altro da principio che libbre di monete di rame. E poichè il peso della libbra presso le nazioni già dette era diviso in soldi, e i soldi suddivisi in denari; quindi addivenne, che i soldi e i denari passarono anch' essi in monete.

Or da queste considerazioni raccogliamo qui di passaggio, che ne' tempi barbari fi facevano i pagamenti in due maniere. o in pecunia numerata, o pure ad pondus: e questi due modi di pagare il danaro vengono espressamente allegati nelle costituzioni di Federico. Nella costituzione Inter multas si dice; Stipendia, que in numerata pecunia consistunt, castellanis et servientibus ac personis aliis statutis in castris per magistros camera volumus ministrari. Ecco i pagamenti in pecunia numerata. Nella costituzione Causas alias si flabilisce; Actorum notarii pecuniam omnem tam ex provisionibus, quam undecumque ex iustitiariorum officiis proventuram, ad generale pondus recipiant, et conservent. Ed ecco i pagamenti a peso. La stessa distinzione facevasi similmente in altre contrade di Europa, singolarmente in Francia, dove la pecunia numerata chiamavali libra ad numerum; e quella a peso dicevasi libra pensata, libra ad pensum, libra ad

pondus, ficcome si ricava dal Glossario del più volte citato

Ducange (1).

Ma quanto si valutava in queste nostre contrade la libbra d'oro, o per meglio dire quanto era il valor legale della libbra d'oro semplice nominata nelle costituzioni? Per isciorre il problema conviene scordarsi affatto dell'odierno prezzo dell'oro. E ciò sia detto una volta per sempre: giacchè una delle principali cause, che ha imbrogliati quasi tutti gli eruditi, è questa appunto, perchè hanno misurate le monete de' bassi tempi dal moderno prezzo de' metalli. Oggi, com' è noto, compriamo l'oro corrente alla ragione di ducati diciotto l'oncia, e ducati 216 la libbra; ma i nostri avoli lo compravano a molto miglior mercato. In un registro di tesoreria del 1442 e 1443 esistente nell'archivio della regia camera apparisce, che in quel tempo l'oro di 24 carati si vendeva in Napoli alla ragione di ducati nove e mezzo l'oncia: eccone le parole; Ducati 57 per un cerchio d'oro di 24 carati di larghezza di due dita a due cordoni donato all'illustre D. Ferdinando di Aragona figliuolo del detto Signor Re pesa sei once, a ragione di ducati 9, tari 2, e grena 10 l'oncia (2). Francesco Dino di Iacopo Kartolajo riferisce, che a' tempi suoi in questo regno l'oro di venti carati vendevasi a tari trentasei, e un quarto l'oncia, che fanno ducati sette e grana venticinque (3). Or dunque per indagare il valor legale della libbra, conviene esaminare quante monete di giusto peso entravano in essa. Per far questo calcolo giustamente, conviene avvalersi del tarì, ch'era moneta d'oro usata in regno nel XIII secolo, ed era altresì moneta nata dalla libbra medesima, di cui era parte. Il tari d'oro, come dimostrerò Più innanzi, valeva grana venti, quanto il tarì moderno,

<sup>(1)</sup> Ducange gloff, latin. voc. Arfura. Libra penfa &c,

<sup>(2)</sup> Archiv. della reg. cam. registro del 1443 e 1443 pag. 189.

<sup>(3)</sup> Presso il Conte Carli tom. Il pag. 458 della nuova edizione.

era di carati sedici ed un terzo, e pesava venti acini. Sicchè in una libbra entravano 360 tari di giusto peso. Ma 360 tarì fanno fettantadue ducati di moneta odierna: dunque la libbra d'oro aveva di valor legale, o fia estrinseco settantadue ducati. Volendo poi calcolare la stessa libbra colle once d'oro, benchè fossero state monete immaginarie. anche si riduce allo stesso. L'oncia, come or ora vedremo, valeva sei cucati. Dunque se dodici once compongono la libbra, moltiplicando 12 per 6, avremo anche 72 ducati. E tanto in pratica è stata sempremai valutata la libbra d'oro ne' nostri tribunali, siccome ce ne assicurano gli scrittori forensi. Duodecim enim uncia faciunt libram: libra autem est ducatorum septuaginta duorum; così Matteo d'Afflitto (1), così Gaito (2), così il Nigris (3), ed altri scrittori del foro. E questo è quanto riguarda la libbra d'oro semplice,

## DELLA LIBBRA D'ORO PURISSIMO,

Benchè ne' rozzi secoli le monete d' oro fossero generalmente deboli e di bassa lega, nondimeno ve n' erano alcune di metallo più sino, ed altre di purissimo oro. Mastro lacopo di Fiorenza nel trattato di aritmetica scritto nel 1307 ci sa sapere, che i siorini d' oro Fiorentini, i bisanti vecchi, le santelene sine, le medaglie dette massamutine, i bisanti vecchi di Alessandria, i carlini d'oro di Carlo I di Angiò ec. erano tutti di 24 carati (4). Or se le monete impure si ricevevano a peso, molto più doveva usarsi una

(2) Gaito de Credite cap. 3 tit. 1 n. 417.

 $\mathbf{T}$ t 2

<sup>(1)</sup> Afflitto in cost. Poenam novem unciarum n. 2 pag. 233.

<sup>(3)</sup> De Nigris in cap. Ad boc de furtis, n. 131 pag. 52.

(4) Questo trattato si trova manoscritto nella Biblioteca Riccardians in Firenze. Il Dottor Lami nelle Novelle Lesterarie del 1754 ce ne diede gli estratti col. 295 ad 299.

tal cautela nelle monete di metallo puro, la tosatura delle quali era di maggior rilievo: e perciò anch'eise si esigevano in pondere piuttosto, che in numero. In fatti Balducci Pegolotti (che fiori nel XIV secolo, come osservò il lodato Giovanni Lami (1)) ci sa sapere, che in Costantinopoli, ed in Pera li perperi, ch'erano monete d'oro di ventidue carati, si spendevano a peso; Il pagamento di perperi si fa a peso, e non a novero di conto (2). Lo stesso Pegolotti ci dice, che i bisanti di Alessandria, ch' erano di 24 carati, si spendevano nella stessa guisa (3). Queste pruove fan comprendere ad ognuno che le librae auri purissimi nominate nelle costituzioni Constitutionem praedecessorum = Advocatos tam in curia = Quisquis de burgensibus = Cum universis = Magistros mechanicarum = Ad legitima pondera erano similmente composte di monete di finissimo metallo (a). Il valor legale delle libbre purissime lo ricavo dai tarì d'oro, i quali, come si è veduto, erano di carati sedici e un terzo. Se una libbra di monete di sedici carati e un terzo nel decimoterzo secolo valeva settantadue ducati, a

<sup>(1)</sup> Novelle Letterarie del 1754 col. 522. e 523.

<sup>(2)</sup> Ivi col. 685 e 686.

<sup>(3)</sup> Ivi col. 653 e 654.

<sup>(</sup>a) Il dottissimo Signor Abate Don Niccolò Ignarra, uno dei principali ornamenti della letteratura Napoletana, mi sece osservare anni sono una varietà essenziale nel codice delle costituzioni Greche, trascritto da quello della biblioteca del re di Francia, il quale nel 17% è stato per la prima volta stampato in Napoli col testo Latino del Tuppi. La cossituzione Constitutionem praedecessorum nel Greco, in vece di due libbre purissime, dice semplicemente dio dispas approsi, cioè duas libras auri. Oc sra libbra semplice e purissima ci è molta differenza, come ognun vede. Io però son di avviso di doversi preserire la lezione Latina, come originale, alla Greca, che è semplice versione. Ora in tutte l'edizioni Latine, cominciando da quella del Tuppi del 1474 sino alla novissima, che ci ha data in Venezia l'egregio Padre Cangiani, la costituzione allegata costantemente nomina duas libras auri purissimi.

proporzione una libbra di 24 carati aveva di valore ducati dugentocinque, e 195/245.

Ma poiche dissicilissimo era in que' tempi il rinvenir monete di finissimo oro, quindi credo che nelle occorrenze di doversi pagare libbre purissime si ricevesse anche l'oro in massa. L'oro in massa correva in commercio in luogo di moneta fin dal quarto secolo della chiesa, e veniva dimandato aurum purum, ovvero mundum, purgatum, obryzatum, codum, purissimum, excodum &c. Costantino il grande in una costituzione pubblicata nell'anno 325 diede la facoltà ai popoli di pagare i tributi o in soldi coniati, o pure in oro materiale (1). Lo stesso su ordinato dagl' imperatori Valentiniano il vecchio, e Valente con due altre costituzioni, che si leggono nel codice Teodosiano (2). Venne dichiarato in una di eise, che l'oro in maisa non potest displicere, e che questo modo di pagare ad compendium simplicis satisfactionis inventum est. Anzi nella corte imperiale ci era un tesoro particolare chiamato Scrinium aureae massae, al quale presedeva il Primicerius detto sacrae massae, il quale tra gli altri ossiziali aveva un Aurisex per conoscere la qualità dell'oro, che vi si recava (3). Questa usanza prese maggior forza ne' secoli posteriori, siccome da innumerabili documenti apparisce; rechiamone qualcheduno. Sciat se compositurum ducentas libras auri colli; così in un diploma dell'imperatore Errico del 1012 (4). Ed in una carta recata dal Padre Carpentier; Dedit. michi domnus Albertus Abas ...... quatuor libras costi auri (5). L'oro cotto non era certamente in moneta, ma squagliato, e ridotto in pasta; e così si efigeva

<sup>(1)</sup> Cod. Teod. leg. I de Ponderat, et auri inlatione V. Gotoff. ivi.

<sup>(2)</sup> Cod. Teod. L. 12 et 13 de Suscepsoribus.

<sup>(3)</sup> Cod. Giust V. la L. I & 7 de Palatinis Sacranum largitionum.

<sup>(4)</sup> Ughelli Ital. Sacra tom. 8 pag.:44.

<sup>(5)</sup> Carpontier Glossar. novum tom. I v. Aurum coctum.

in luogo di denaro, come è stato anche opinato dal Liruti(1), dal Conte Carli (2), dal Zanetti (3), e da altri. E tanto bassi di aver detto intorno alle libbre d'oro,

## DELL'ONCIA D'ORO,

Questa moneta viene adoperata nelle costituzioni Usurariorum nequitiam = Intentionis nostrae = Poenam novem unciarum = Quaestiones jurisperitorum = Post mortem baronis. L'oncia d'oro è stata molto usuale non solo nel regno, ma ben anche nella Sicilia, specialmente nel secolo XIII; anzi in que' tempi nell'una e nell'altra regione era moneta di conto. Siccome oggi fi tiene la scrittura in ducati e grana, allora si teneva in once, tarì, e grana. Questa cottumanza si mantiene tuttavia illesa nella Sicilia; ma nel regno è in qualche modo andata in disuso. Dico in qualche modo disusata, ma non già spenta interamente, come con manifesto errore affermo il Chiarito (4); essendo noto, che anche a giorni nostri si adopra in questo regno. Infatti nelle dogane per calcolare il dazio, che si deve riscuotere da una mercatanzia che s'introduce, se ne sa prima la stima; e questa stima non si sa a ducati, ma ad once. Nelle università del regno si apprezzano i capitali de' beni per gli catasti ad once; ed il libro in cui si registrano gli apprezzi vien domandato onciario. Nel foro tuttavia s'impongono mandati penali di tanté once d'oro, non altrimenti di quello che si faceva ne' secoli passati. In varj luoghi delle provincie si fanno anche i contratti, e particolarmente gli stromenti dotali a ragione d'once, come

<sup>(1)</sup> V. Argelati do Men. Ital. form. II pag. 93.

<sup>(2)</sup> Carli Zecobe d'Italia tom. IV pag. 64 e leg.

<sup>(3)</sup> Zanetti Monete d'Bal. tom; II pag. 391.

<sup>(4)</sup> Chiarito Comment, sulla Cost. de Instrum, conficiendis pag. 95.

327 W

notò il Vergara (1). E per ultimo la Maestà del Cattolico re Carlo Borbone regnando tra noi non solo non permise, che si estinguesse l'uso dell'oncia; ma da moneta immaginaria, qual era stata ne' passati secoli, la convertì in reale sacendo coniare la doppia di sei ducati; la quale colla prammatica de' 27 novembre 1749, su chiamata Oncia Napoletana (2).

In quanto all'origine dell'oncia io fon d'avviso, che nacque dalla libbra d'oro fin dalla decadenza del Romano impero. In que' tempi, come si è detto, essendo in gran voga l'usanza di esigere il danaro a peso; siccome la libbra era una quantità di monete, la quale non si numerava, ma si pagava ad pondus, altrettanto si faceva coll'oncia, che era la dodicesima parte della libbra. Cosicchè l'oncia confisteva in tanti denari posti in bilancia, quanti n'erano capienti nel peso di questo nome. Le prove di questa mia opinione sono assai pronte e maniseste. In una carta del 997 inserita nella cronaca di Vulturno si obbligano quaranta once d'oro monetato, o in moneta; Componere obligamus .... de aura monetata unciae quadraginta (3). Nell'unico registro di Federico II, che abbiamo nell'archivio della zecca, ho trovato un diploma diretto ad Errico Abate, cui venne commesso di mandare a quel sovrano (che allora si trovava in Anagni) diecimila once, pesate però ad pondus curiae: e per esser sicuro delle frodi, se gli mandarono i pesi, affinche il latore potesse consegnar le once a quel peso che le riceveva. Il documento troppo importante richiede che a' inserisca tutto. Henrico Abati &c. Fidelitati tue precipiendo mandamus, quatenus Iohanni Girardini de Trano latori presentium fideli nostro. de pecunia per te in Galeis nostris delate, decem millia Unciarum ad pondus curie

<sup>(1)</sup> Vergara Monete del Regno di Napoli pag. 123.

<sup>(2)</sup> Prammatica 55 de Monetis ediz. del 1772.

<sup>(3)</sup> Muratori Script. Rer. Ital. tom. I part. II pag. 492 col. 2. B

nostre debeas assignare, mictenda militibus nestris morantibus in Marchia Trivisana. Pondus enim curie nostre quo ipsa pecunia ponderari debet, consimile ponderi Camere nostre tibi miclimus per eundem, quod sidem debeas resignare. ut ipse eandem pecuniam ad idem pondus sicut recepit, exsolvat. Mandamus preterea tibi quatenus quadraginta Uncias ad distum pondus pro emendis someriis & expensis necessariis saciendis eidem Iohanni assignes. Et recipias ab eo de omnibus que fibi dederis apodixam (1). In questo documento si vede chiaramente, che ne' rozzi secoli l'oncia si pagava ad pondus. Or se va così la faccenda, inutil fatica è quella che fanno taluni ricercando se l'oncia d'oro in que' tempi foile stata moneta reale, o immaginaria. Imperocchè non era una moneta sola, ma tanta quantità di monete quante n'entravano per formare un'oncia di peso: ed in conseguenza non era, nè poteva essere moneta reale. In fatti l'oncia d'oro allora non era uguale in tutti i luoghi -del regno, ma diversa secondo la diversità dei pesi, che si adopravano. Nell'istesso archivio della zecca abbiamo un istrumento rogato in Foggia nella fine del decimoterzo secolo, o principio del decimoquarto, nel quale si leggono convenute due once e mezza d'oro pelate ad parvum pondus curiae, le quali poi si ragguagliano al peso generale, e si valutano once due, tari sette, e grana dieci, Eccone parvum pondus Curiae uncias auri duas & medium quo parvo pondere ad generale converso sunt ad idem generale pondus auri uncias duas tarenos septem & grana decem (2). Questo documento ci sa vedere il ragguaglio tra l'oncia ad pondus generale, e quella ad pondus Curiae. Di. più in un istrumento dell'archivio della Cava del 1185 si nominano once d'oro di

<sup>(1)</sup> Archiv. della Zecca Regist. di Federico II pag. 30 a t,

<sup>(2)</sup> Archiv. della Zecca Arca B. maz. 51 n. 24.

196 3:29 WA

di monete di Sicilia al peso di Salerno; Uncias auri monete Sicilie bonas & juste ponderatas ad pondus Salerni (1). Di qui fu che ad evitare la confusione de' pesi e del valore delle once, il più delle volte le ne specificava la qualità, del che infiniti esempi ne occorrono ne' diplomi: e tenza ricorrere agli archivii, ne abbiamo innumerabili nel citato registro di Federico II, che recentemente è stato pubblicato nella reale stamperia unito alle costituzioni di questo imperatore; dove molte volte si nominano Unciae ad pondus curiae (2), moltissime altre Unciae ad pondus generale (3), e spesso Unciae auri semplicemente (4), le quali erano le stesse del peso generale. Di qui su parimente, che il re Carlo II d'Angiò (sotto cui surono compilati i riti della regia camera, come ha provato il valoroso D. Giuseppe Ajusso nella nuova compilazione di que' riti, che tien quasi preparata per pubblicare, e non già fotto Roberto come volgarmente si crede) per evitare la diversità de' pesi e de' valori, volle che le once d'oro non si pagassero più in monete di oro a peso, come si costumava, ma se ne dovesse pagare l'equivalente in moneta d'argento, computando sessanta carlini per ogni Così trovo registrato in uno de' suddetti riti; Sicut Rex fecit de sicla ut nullus in commerciis exigeret. vel nominaret unciam ad aurum, ut solverezur in auro, sed ad argentum: statuens sexaginta carolenos argenti ad unciam (5).

Il valor legale dell'oncia generale è più noto di quello che potrebbe esser provato; sapendo ognuno che valeva trenta tarì, o pure sessanta carlini, o pure sei ducati di moneta odierna. Nondimeno essendosi gli scrittori Siciliani molto discostati da noi, stimo opportuno di stabilire questo

(1) Archivio della Cava Arca 32 n. 135.

<sup>(2)</sup> Registro di Federico II pag. 280 307 330 338, ed altrove.

<sup>(3)</sup> Ivi pag. 237 238 241 250 251 254 326, ed altrove.

<sup>(4)</sup> Ivi pag. 242 262 276 287, ed altrove. (5) Riti della R. Camera de jur. Cambii Rit. 3.

punto con incontrastabili documenti. In un registro del 1277 dell' archivio della zecca abbiamo; Uncie auri quincentum in Karolensibus argenti ad rationem de sexaginta Karolensibus pro uncia auri una (1). Così in un conto del 1333 al 1336 portato dal Ducange; De pecunia recepta in carolenis argenti, et redusta ad slorenos de Florentia, computata qualibet uncia pro quinque slorenis, et quolibet sloreno pro sex tarenis, et quolibet tareno pro duobus carolenis, et quolibet caroleno pro decem granis (2). Così il Cabrospini presso il Muratori (3) per tacere innumerabili altre testimonianze; le quali concordemente consermano il valor legase dell'oncia in ducati sei di nostra meneta, e tanto appunto è stata sempre valutata in pratica, ne' nostri tribunali, come ce ne assicurano gli scrittori sorensi testè allegati.

## DEL TARI COMUNE,

Il tari è propriamente nome di peso, che nel nostro regno viene volgarmente addimandato trappeso, o pure scrupolo, ed è la trigesima parte dell'oncia. Impropriamente poi è voce di moneta, che tuttavia adopriamo in commercio. Quindi incontrando una tal voce nelle vecchie carte, convien essere avvertente quando indica peso, e quando moneta; il che sia detto non solo del tari, ma anche dell'oncia, e del grano: giacchè alcuni moderni autori, benchè sentissero molto innanzi in queste materie, pure sono inciampati nel sallo di prendere per peso quel che era moneta, e per moneta quel ch' era peso. Parlando adunque del tari monetato, esso si adopra nelle costituzioni Bajulos et omnes sudices — Sic nostra servitia — Castellani et servientes, e nell'altra che comincia Quia nunquam sciri potest.

<sup>(1)</sup> Archiv. della Zecca Reg. 1277 F. fol. 273 t.

<sup>(2)</sup> Ducange gloff. lat. voce Uncia.
(3) Murasori Diff. 28 Antiq. Med. Evi tom. II pag. 784 B.

Questa moneta è stata di grandissimo uso nel regno, e nella Sicilia, ed è molto ovvia nelle membrane e memorie de' secoli di mezzo. Essa, come si è poc'anzi notato, derivò dalla libbra, e dall'oncia, delle quali era parte. Dopo che la libbra di oro acquistò sorza di moneta, le diverse parti di essa divennere altrettante monete. E poichè dodici once sormano il peso della libbra, e trenta tarì compongono quello dell'oncia; quindi è che il tarì, o sia trappeso d'oro acquistò anch'esso sorza di moneta. E sebbene nella sua origine sosse stata immaginaria, come la libbra e l'oncia, in progresso di tempo essendosi conosciuta molto commoda, su ridotta in moneta reale. Sicchè fra tutte le monete d'oro nate dalla libbra il solo tarì su ridotto in moneta reale, e le altre restarono immaginarie.

Varie sono le opinioni sul valor legale del tarì d'oro. Il dottor Vincenzo Venuti scrittore Siciliano, dopo di aver detto che il tarì d'oro sosse moneta immaginaria, affermò che valeise quanto il moderno tari di Sicilia, il quale corrisponde al carlino Napoletano (1). Il canonico Schiavo pretese che fosse valuto tari quattro, grana tre, ed un piccolo dell'odierna moneta di Sicilia. Il medesimo autore sa dire a Luigi Lello scriptore della chiesa di Monreale, che si spendeva per uno scudo, o sia dodici tari d'argento (2). lo però sostengo che il tarì d'oro nell'una e nell'altra Sicilia valeva quanto il tari d'argento nostrale, cioè venti grana Napoletane. Si dubita forse, ch' io dica troppo nell'affermare una moneta d'oro tanto picciola, che valesse venti grana? Sì, tanto è; il tari d'oro in ambedue le Sicilie valeva lo stesso, che vale oggi il tarì d'argento del nostro regno. Se ne sentano le prove, e si noti se potlano essere più convincenti. Carlo I di Angiò nel 1267, cioè

(2) Opuscoli suddetti Tom. XVI pag. 229.

<sup>(1)</sup> Opuscoli di autori Siciliani tom. VII pag. 59.

nell'istesso secolo di Federico II, volle che nelle zecche di Barletta e di Messina si fabbricassero diverse specie di monete, e fra queste i tari d'oro. Nel mese di novembre emanò due commissioni a' direttori di ambedue le zecche. zi quali ordinò di fabbricare i nuovi tari in tutto simili ai vecchi, che tuttavia ne' due regni correvano. A tal proposito spiegò con tutta precissone il peso, la bontà, ed il valore che avevano i vecchi tarì. Si possono desiderare documenti più opportuni di questi? Certo che nò. Ecco il tenore della commissione indirizzata ai direttori di Barletta. Quelibet vero libra auri tarenorum in pondere de auro puro contineat uncias octo et tarenos quinque in pondere ficut ejusdem zenute erat aureus tarenus quod olim in dicto regno fiebat et quod quilibet tarenus quem cudi et laborari feceritis in sicla predicta sit in pondere videlicet granorum viginti. Ita quod priginta tareni ex ipsis in numero expendantur et sint in pondere uncie auri unius. Colle medesime parole venne distesa la commissione agli zecchieri di Messina, che trascrivo in piè di pagina (1). Or nelle ultime parole di questi diplomi sta chiaramente spiegato il valore del tarì d'oro. Triginta tareni ex ipsis expendantur et sint in pondere uncie suri unius. Si può dubitare che l'oncia d'oro fi spendeva per sessanta carlini, o trenta tari di moneta odierna? Chi ne dubitasse, darebbe segno di non aver compresi i documenti che ne abbiamo prodotti. Se dunque trenta tarì d'oro si spendevano per un'oncia, è manisesto che il tarì d'oro valeva lo stesso che il nostro tarì d'argento, cioè venti grana. Ci è che replicare in contrario,?

<sup>(1)</sup> Quelibet vero libra auri tarenorum in pondere de auto puro contineat uncias octo et tarenos quinque in pondere dicte tenute, sicut, erat aureus tarenus quod olim in dicto regno fiebat et quod quilibet tarenus quem laborari et cudi seceritis in sicla predicta sit in pondere unius tareni, videlicet gravorum viginti. Ita quod triginta tareni ex ipsis in numero expendantur et sint in pondere uncie auri unius. Archivio della Zecca Reg. 1280 litt. C sol. 5.

Dippiù Mastro Iacopo di Fiorenza, che come si è detto, scrisse il suo trattato nel 1307, facendo ricordo di parecchie monete che correvano nel XIII secolo, indicandone il titolo ed il valore, tra queste parlò anche del tari d'oro, da lui chiamato tero. Ecco le sue parole: Trenta Teri sono un oncia d'oro, & i venti grani sono un Tero d'oro (1). E finalmente nella costituzione Quia nunquam, sciri si nomina il tarì d'oro in questo modo; Medicus ..... ab aegroto non recipiat per diem . . . . ultra dimidium tareni auri. Afflitto chiosando queste parole, converte il dimidium tareni auri in dieci grana, e dice; Salarium quolibet die sit granorum decem (2). Sicche se dieci grana formavano mezzo tarì d'oro, un tarì intero ne componeva venti. La testimonianza di questo scrittore è ugualmente decisiva, giacchè fiori nel XV secolo, ed in quel tempo correvano tuttavia nel regno i tarì d'oro, come si ricava da una carta dell'archivio della Cava del 1409 (3).

Con tutto ciò temo, che taluno resterà più convinto che persuaso di questa verità; non potendo comprendere come si sosse data una moneta d'oro di così tenue valore; se pure non si volesse dire che sosse stato di così poco metallo, che incapace sosse queste dubbiezze, che hanno imbarazzato alcuni eruditi. Primieramente è da rissettersi che ne' trasandati secoli il sistema delle zecche era diverso dalle odierne; imperocchè vi si consavano monete di così piccola mole, che oggi sanno stupore a vederle. In secondo luogo sa d'uopo ripetere quel che poc'anzi ho accennato, che i metalli nel XIII secolo si compravano a prezzo molto inferiore dell'odierno. Nel 1281 lo stesso Carlo I d'Angiò sece comprare diverse partite d'oro; e tralle altre ce ne

ages and a fill state that the property of the contracts

<sup>(1)</sup> Lami Novel. Letter. del 1754 Col. 297.

<sup>(2)</sup> Afflitto ad const. Quia nunquam in princ. sol. 159.

<sup>(3)</sup> Archivio della Cava Arc. 161 n. 282.

fu una di 218 libbre e più, considenti in tante doppie, che si dissero comprate Ad rationem de unciis auri una zarenis undecim et granis sex pro qualibet uncia in pondere duplarum ipsarum, come dal diploma esistente nell'archivio della zecca (1). Che val quanto dire su comprato l'oro suddetto a ducati otto e grana 26 l'oncia. E' da avventirsi in terzo luogo, che l'oro ond'erano sabbricati i tarì era basso; mentre ogni libbra di tarì doveva contenere de auro puro uncias octo et tarenos quinque. Sicchè il tarì era di sedici carati ed un terzo. E sinalmente ogni tari non pesava più di venti acini, o siano grani. Quilibet tarenus sit in pondere granorum viginti. Facendo adunque il conto, venti acini di un tal oro non valeva più di grana diciannove in circa; e perciò il valore intrinseco corrispondeva all'estrinseco, compresa eziandio la spesa del conio.

Ma a che servono tante ragioni, se ho il fatto che da se parla? Io ho il piacere di presentare al pubblico lo stesso tarì d' oro coniato da Federico II, e quel medesimo sabbricato da Carlo I d'Angiò; i quali, per quanto io sappia, da niuno ancora sono stati conosciuti e pubblicati.



Il primo rappresenta da una parte l'aquila imperiale, che era il solito emblema usato da Federico nelle sue

<sup>(1)</sup> Archiv. della Zecca Registro 1268 D fol. 91 e seg.

AL 335 WA

Il secondo è il tari di Carlo I d'Angiò, ed è quello appunto fabbricato in virtù della commissione poc' anzi allegata.



Esso da un lato rappresenta il monogromma di quel sovrano, cioè la lettera K., attorno al quale si legge Carolus Rex: nell'altro lato si vede lo scudo co' gigli, ed in giro le seguenti parole Siciliae & Ierusalem. Questa seconda moneta è molto ben conservata, ritenendo ancora il suo primitivo peso di venti acini. Or veggasi quanto siamo ancora albujo in satto di monete delibassi tempi. Non ha guari, che si è disputato in Sicilia, se il tari d'oro sosse stata moneta rease o immaginaria. Mentre il dottor Vincenzo Venuti pretese d'essere stata immaginaria, ed il canonico schiavo sossente su moneta rease, che su moneta rease, senza che ne producesse alcuna.

Essendos intanto il tari reso mosto comune ne' secoli bassi, e comodo al commercio per essere di mezzano valore, atto alle spese grosse e picciole, e buono per le persone più e meno facoltose, se ne moltiplicò la specie in modo, che per facilitarne più l'uso, se ne coniarono anche:

معل عود معد

d'argento, è questi erano dello stesso vulore del tari d'oro, ma di mole maggiore, e proporzionata alla inseriorità del metallo. Nacquero dunque i tari di argento dai tari d'oro; ed in progresso di tempo essendo cresciuti di prezzo i metalli, riuscirono più commodi i figli de' genitori. Sicchè a poco a peco da quelli surono questi cacciati, e restarono solamente i tari d'argento, che tuttavia adopriamo.

### DEL GRANO.

Questa moneta, che ha tanta voga nel commercio minuto de'giorni nostri, viene parimente adoperata nel codice Federiciano; cioè nella costituzione In civilibus eausis, e nell'altra che comincia Humanitate nobis suggerente. La fua origine deve ripetersi dalla libbra d'oro, di cui abbiamo ragionato abbastanza. Dopochè il peso della libbra in queste nostre regioni su sissato in quel modo che oggisi usa, cioè partita in dodici once, l'oncia in trenta tari, ed il tarì in venti grani, o sieno acipi; siccome la libbra d'ero, l'oncia d'oro, ed il tari d'oro da nomi di pesi si convertirono in nomi di monete; altrettanto addivenne al grano, che è il minimo componente, o sia la settemillesima ducentesima parte della libbra; ed in conseguenza il grano nella sua origine su moneta in oro. Non rechi meraviglia il fentire i grani d'oro; conciosiacche vengono spesso nominati nelle carte de' secoli bassi, E per non uscir dalle costituzioni del regno, nell'allegata costituzione In civilibus causis si ordina, che il portiere per una intimazione dentro la città, non potesse esigere più di un solo grano d'oro; Apparitori pre qualibet citatione infra civitatem, aut locum facienda granum suri ab actore praebeatur. E così in moltissime altre carte si vede usato il grano d'oro sino al secolo XVI (1). Vero è però

<sup>(1)</sup> Archiv. della Cava Arc. 26 num. 11 15 c 32.

è però che il grano suddetto era moneta immaginaria, e non reale. Un minuzolo d'oro quanto pesava un acino, incapace era di conio e d'impressione. Quindi intendevasi col grano d'oro di pagar tanto prezzo, quanto valeva e

pesava un acino di quel metallo.

Il valor legale del grano d'oro era il medesimo dell'odierno grano di rame, cioè due tornesi; o pure la decima parte del carlino d'argento, che torna allo stesso. Matteo degli Afsitti, nella cui età era tuttavia in uso un tal grano, commentando l'allegata costituzione In civilibus causis, dice; Nota ex textu ibi, granum auri; quod pre quolibet homine citando intra civitatem nuncio debent solvi pro assu citationis duos tornienses, quia duo tornienses sunt pretium grani unius auri (1). E nel Capitolo del regno lam saepe si legge, che dieci grani d'oro formavano un carlino; Ad rationem videlicet de granis auri decem pro quolibet caroleno... recipiat, et expendat.

Dopo che il grano d'oro acquistò sorza di moneta, e se ne radicò l'uso, per renderlo più comodo al commercio da immaginario su ridotto in moneta reale; e per sarlo così su d'uopo sabbricarlo di metallo meno prezioso. Giandonato Turbolo ci sa sapere, che sotto il governo di Filippo II, e propriamente negli anni 1572 e 1573 nella zecca di Napoli si battevano grani d'argento (2). Ecco quì un nuovo argomento di meraviglia. Come, dirà taluno, grani d'argento? Monete di così tenue valore erano coniate anche di metallo nobile? Ma questo non deve recar meraviglia per più ragioni. I perchè il valor dell'argento era in quei tempi diverso dall'odierno. L'argento puro detto di coppella, che oggi si compra a ducati diciassette e grana venti la libbra, allora si aveva a ducati dieci e grana ottanta,

<sup>(1)</sup> Assiste Com. ad constit. In civilibus n. 6.

<sup>(2)</sup> Turbolo Discorso sulle monete del regno pag. 34 6 35.

come lo stesso Turbolo riferiice. Il perchè quel grano era di piccolissima mole. III perchè era di argento meno puro del carlino. IV finalmente perchè aveva in commercio valore più grande di quello che ha oggidì: mentre allora con un grano si aveva più rota di quel che ora se ne ha. Per ben comprendere la forza di quest'ultima ragione, è necessario che scendiamo per poco in piazza a vedere i prezzi de' commestibili di que'tempi, e quel che valeva nel commercio minuto la moneta del grano. Tra i capitoli del ben vivere pubblicati dalla nostrà città nel 1509, ne ritrovo uno che oggi darà da ridere a chi lo sente. Siami lecito di riserirlo colle medefime sue parole, comecchè gosse; Quando la farina saglie per guerra, o carestia, o per indisposizione de stagione de cinque carlini in su el thomulo, non si debiano fare taralli, susanelli, ceppule, macarune, trii, vermicelli, ne altra cosa di pasta, excepto in caso de necessità de malati sotto pena de mezo augustale la prima volta ec. (1). Sentiste? Il prezzo della farina a carlini cinque in su il tomolo era prezzo di guerra, e di carestia. In satti ne' registri dell'archivio di S. Lorenzo si legge, che nel feguente anno 1510 vendevasi la farina al mercato alla ragione di grana venti, e venticinque il tomolo; ed una palata di pane di ventidue once non costava più d'un tornese. Sarebbe materia di divertimento il rivangare i prezzi, onde in que' tempi compravansi gli altri commettibili alla minuta. Il dotto Cavalier D. Domenico di Gennaro mi ha gentilmente proccurata un'assisa fatta dalla città di Napoli nell'istesso anno 1509, e giova al nostro intento riferirne qualche articolo.

La carne vaccina dovevasi vendere a grana due e mezzo il rotolo.

La vitella di Sorrento a grana cinque.

La carne di porco ad un grano, ed otto calli.

<sup>(1)</sup> Priv., Cap., e Grazie della Città di Napoli vol. I p. 70.

Il lardo a grana quattro il rotolo.

Il cacio di Calabria a grana quattro ed otto calli.

Il caciocavallo a grana cinque il rotolo. In quell'anno medesimo il monastero di San Severino. comprò il vino greco a carlini venti la botte, che veniva a grana fedici ed otto *calli* il barile; e l'olio a grana ventuno lo stajo (1): e così discorrasi del valore delle frutta, de' pesci, e di altri generi di grasce. Ma affinchè niuno porti invidia a quell' età, ed esclami col poeta

O dolce tempo, o vita sollazzevole! fa d'uopo considerare, che a proporzione della roba si guadagnava il denaro: se poco se ne spendeva per vivere, se ne guadagnava anche poco. Oggi, a cagion d'esempio, un servitore ha ducati cinque il mese di salario, che importano giornalmente grana 16 2: ma in que tempi aveva ducati sei l'anno che importavano un grano ed otto calli il giorno (2). Oggidì, com'è noto, si tratta di

(1) Veggasi Il Conte Carli zecche d'Italia tomo III par. 2 pag. TO2 della prima edizione.

Consideratis emnibus considerandis O adbibitis expertis in salibus decretum est per S.R.C. quod huiusmodi vestimenta & salaria taxentur prout presenti decreto taxantur pro singulo biennio ab binc in antea numerando per cosdem eius filios ipsi Domine Marie debenda ad summans 💇 quantitatem ducatorum octoginta Jex de oarlenis argenti modo 🗢 forma inferius distinctis

O declaratis.

la primis videlicet. Per una gonnella de panno nigro aczimato & bagujato de Florencia canne doy duca si quattordice . . V v 2

<sup>(2)</sup> Nell'anno 1388 il sacro Consiglio assegnò ad una dama la servitù, ed i vestimenti convenevoli al suo rango, e gliene tassò l'importo. Giudico di far cosa grata ai curiosi di aggiungere in questa nota l'intera decissione ricavata dall'archivio di quel tribunale, anche per conoscere la frugalità di que' tempi. = Die 17 Iulii 1488 = In causa magnifice Domine Marie Marramalde cum ejus filiis super petita taxatione vestimentorum & aliorum necessariorum pro persona ipsius Domine Marie vidue, ac etiam solutione samulorum &c.


# - 340 W

ridurre la limofina della messa a grana venti l'una: ma in que' tempi non era più di sette tornesi, o grana quattro, come ho ricavato da alcune memorie della chiesa di San Giovanni maggiore. E pure con tale limofina un prete poteva convenientemente campare. Si usavano allora le piccole monete di rame dette cavallucci, o fiano calli, dodici delle quali formavano un grano; sicchè scambiando le quattro grana in calli, si avevano quarantotto di quelle monetucce. ed una persona le scompartiva comodamente alli vari bisogni della vita. Ma tornando là, donde ci siam dipartiti, da tutto ciò si ricava, che il grano in que' tempi aveva coi generi di commercio una proporzione molto maggiore di quella che ha oggigiorno, onde non è da stupire, se veniva fabbricato di metallo nobile. Ma non più ragioni, non più autorità; vengasi ai fatti: io ho il piacere di pubblicare un grano d'argento coniato in quel tempo, che da niuno

Item per ana gonnella de saya negra de Perpignano larga sanne doy palmi sey duvari quastro	· <i>IIII</i>
dece tari doy, grana dece	VII III
Item per doy para di calcze ducati uno, sarì uno Item per cammise sey ducati see Item per sey para di scarpe tari tre Item per sey para di pianelle ducati uno tari uno Isem per le coseture de disti vestimenti ducati	Ш
Item per panne de la testa ducati	niano,

341 W

ancora, per quanto io sappia, è stato conosciuto. Eccolo appunto. Esso rappresenta da un lato la testa di Filippo II allora regnante col motto in giro Philippus Rex Aragoniae utriusque, e nel rovescio si vede impressa una maglia della collana d'oro colle parole Siciliae Hierusalem.



Ma finalmente coll'avanzar degli anni essendo anche avanzato il prezzo dell'argento, su necessario di sabbricare il grano di rame, come lo è al presente; e per conseguenza questa moneta acquistò nome e valore dell'oro, nacque in argento, e quindi su convertito in rame.

# DEL SOLDO LONGOBARDO.

Il soldo viene allegato una sola volta nel codice Federiciano, e propriamente nella costituzione Violentias subicesorum nostrorum; in cui si determina, che colui il quale violentemente spoglia un altro dal possesso di cosa immobile, oltre alla restituzione dello stabile, e de' frutti raccolti, debba pagare la metà del valore della cosa stessa, abolendo in tal guisa la pena di sei soldi prima stabilita per così satto attentato. Indi si aggiunse; Derisorium namque credimus aliquem sex solidorum tantam poena damnari. Ma quanto era il valor legale di cotai soldi? Or questo si che non è nodo da sciogliersi al bujo, nè è sosso da

saltarsi a piedi giunti; tanto più che i nostri scrittori, ed i commentatori delle costituzioni non ce ne hanno lasciata veruna traccia. Eranvi ne' secoli barbari diverse specie di soldi; altri erano i soldi imperiali, altri i Franchi, altri i Frisoni, altri i Longobardi, altri i soldi d'oro, ed altri quelli d'argento; la maggior purte de'quali era di diverso valore, in modo che han imbrogliati i più valentuomini nelle antichità de' mezzi tempi, non eccettuandone nè pure il Lindebrogio, il Dusresne, i Padri Maurini, il Frehero, ed il Muratori. Sicchè per venire alla soluzione del problema, prima di ogni altra cosa conviene investigare di quali soldi parli la costituzione, e quindi determinarne il valore.

In quanto al primo punto ho per fermo, che nella costituzione si parli de' soldi Longobardi; perchè una tal pena la trovo stabilita appunto nelle leggi di quella nazione: come può vedersi nelle leggi 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del libro I titolo 27 De invasionibus, es iis quae in terra aliena fiunt. Ond'è manisesto che Federico II volle alludere al diritto de' Longobardi, ed in questo si accordano anche i nostri

commentatori (1).

Ma più difficile è il determinare il secondo punto, cioè il valore de' soldi Longobardi. Tra i molti autori che han trattato del soldo, l'unico che a me sembra d'aver colpito nel segno si è il ch. Conte Carli, che con indicibile diligenza ha illustrate le monete e zecche d'Italia, ed è giunto a scoprir quello, che niuno de' monetografi suoi antecessori aveva scoperto. Egli ha dimostrato, che i Longobardi quando volevano indicare la moneta d'oro, chiamavano soldi d'oro; e quando nominavano soldi senz'altro aggiunto, intender volevano prezzo d'argento. Ha dimostrato in oltre, che il soldo semplice valeva dodici denari d'argento. E finalmente,

<sup>(2)</sup> Veggansi Bartolommeo di Capus, Matteo d'Asslitto, ed altri commentatori di detta costituzione.

che delle dette tre monete Longobarde, cioè soldo d'oro, soldo semplice, e denaro d'argento, la prima e l'ultima erano monete coniate e reali, ed il soldo semplice era immaginaria. Duolmi soltanto che questo valentuomo, che mi ha condotto per mano uno a questo punto, mi abbandoni in mezzo a questo difficile camino: mentre qui si arrettano tutte le sue ricerche (1). Da queste però ricavo due importanti avvisi; I che i sei soldi allegati nella nostra costituzione erano soldi semplici, giacchè vengono nominati senza verun aggiunto. Il che ognuno di detti soldi valeva dodici denari d'argento de' Longobardi. Ora per giungere al sospirato termine, e per sapere la corrrispondenza di cotali soldi colla moneta nostrale, sa di mestieri che da me medesimo mi apra il varco, valendomi di alcune carte Longobarde dell'archivio della Cava, delle quali è doviziosamente sornito.

Premetto in primo luogo, che siccome il soldo d'oro imperiale era composto di tre tremissi (2), così parimente il soldo d'oro Longobardo valeva tre tremissi, come apparisce da un istrumento dell'anno nono del principato di Benevento Domini Siconis, in cui si ha; Unde pro supradicta mea venditione accepi... auri sigurati solidos numero tres et duos tremisses ... et si forsitan nos ipsi per quodlibet ingenium retornare voluerimus, duplum pretium nos vobis componere promittimus, hoc sunt septem solidos et unum tremissem (3). Se dunque sette soldi, ed un tremisse facevano il doppio di tre soldi, e due tremissi; è evidente che il soldo costava di tre tremissi, come anche si ravvisa da altro istrumento dell'anno settimo dell'istesso Sicone (4).

Premetto in secondo luogo, che il tremisse valeva sedici denari Longobardi, come si legge in altre carte. Così in

<sup>(1)</sup> Carli Zecche d'Italia tom. IV Disser. 4 pag. 18 e seg.

<sup>(2)</sup> V. Isidoro Ispalense lib. XVI cap. 24 Orig., ed altri.

<sup>(3)</sup> Archivio della Cava Arc. 30 n. 17. (4) Detto Archivio Arc. 31 n. 234.

una di esse; Ego Maldigati filius Radiperti in mutuo accepi a te Sicone filio Tancomati tremissem unum de denariis qui

sunt denarii sedecim (1).

In terzo luogo premetto, che il soldo d'oro Longobardo valeva quattro tari Amalsitani. Così in uno strumento dell'anno 1076; Et propter consirmationem huius venditionis ipsi venditores susceperunt ab ipsis Theodoro et Leone statutum pretium auri solidos 110 quorum quisque habet tarenos auri

quatuor ex moneta Amalfitanorum (2).

Premetto finalmente, che il tarì d'Amalfi corrispondeva a grana tredici e denari due, o siano grana tredici e calli quattro di nostra moneta corrente. Questo apparisce da un inventario dell'abolito spedale di S. Attanasio del 1336 sapportato dal Chiarito; Item Ecclesia seu Parochia Sancti Petri de Ferrariis dare tensur tarenum unum Amalphiae consistentem in granis tresdecim et denariis duobus. Così in altro inventario del 1501 riserito dallo stesso scrittore (3).

Or da queste premesse io deduco le seguenti illazioni. I se il soldo d'oro valeva tre tremissi, ed il tremisse sedici denari; dunque il soldo d'oro valeva in tutto quarantotto danari. II se il soldo d'oro valeva quarantotto denari, ed il soldo semplice ne valeva dodici; dunque il primo era quadruplo del secondo. III se il soldo d'oro valeva quattro tarì Amalsitani; dunque il soldo semplice corrispondeva ad un solo tarì di quel paese; ed in conseguenza il soldo semplice Longobardo, che viene adoprato nella nostra costituzione, corrispondeva a grana tredici e quattro calli di moneta odierna. Sicchè la pena di sei soldi imposta dalle leggi Longobarde per lo delitto di spoglio ragguaglia in tutto a carlini otto di nostra moneta. Ebbe dunque ragione l'imperator

<sup>(1)</sup> Archivio della Cava Arca 86 n. 65. Più Arc. 18 n. 51.

<sup>(2)</sup> Arch. sud. Arc. 101 n. 494 Arc. 27 n. 14 Arc. 101 n. 272.
(3) Chiarito Comm. alla cost. de Instr. confic. p. 112 in nota.

## 345 W

l'imperator Federico di chiamar ridicola la pena per un attentato così enorme.

#### Dell' AGOSTARO.

Niuna specie di moneta è così spesso adoperata nelle costituzioni del regno quanto l'agostaro; perchè su introdotta dall' istesso legislatore Federico. Essa vien nominata nella costituzione Quicumque mulierem = Si damna clandestina = Rapinas eorum, ed altrove. La moneta suddetta viene chiamata in varie guise agustalis, augustalis, augustale. augustarius, augustanensis; ed in Italiano augusta!e, agostajo, agostaro ec.; il che sia detto per evitare l'imbroglio. qualora si vegga nominata in diversi modi nelle vecchie carte. Erano gli agostari monete di oro, ed in quel tempo furono in grandissima voga non solo in questi regni, ma in tutta Italia, ed anche fuori. Riccardo da Sangermano ci fa sapere, che nel 1231 se ne coniarono nelle zecche di Brindiss, e di Messina (1). Io però son d'avviso che se ne fossero battuti in diversi anni, ed in abbondanza. Diss. in diversi anni, argomentandolo singularmente dai diversi impronti; alcuni de'quali rappresentano la testa di Federico laureata, e questi sono comuni; altri poi la rappresentano coronata, e questi son rari. Dissi battuti in abbondanza, ricavandolo dal citato passo di Guido Bonati, il quale parlando de' tesori ammassati da Pier delle Vigne disse; Est inventus habuisse in bonis solum in auro 10000 libras augustanensium (2). Questa testimonianza può sembrare alterata; ma se ci è caricatura, non deve esser tanta, quanta apparisce a prima vista. Diecimila libbre di agostari, alla ragione di trappest sei l'uno, come or ora vedremo, fanno 600, 000 di quelle

(2) Bonati Astron. Trast. 5 Consid. 141.

<sup>(1)</sup> Riccardo da Sangermano Chron. 2011.

monete, e tutte insieme compongono la somma di 900,000 ducati nostrali. Non dovrebbe sembrare cosa strana che ne aveise accumulata sì gran somma un favorito così celebre. il quale, secondo l'espressione del Dante, tenne ambe le chiavi del cuor di Federico. Del resto qualunque sia stata la somma precisa lasciata da quel samoso segretario, è certo che dovette essere immensa. Conchiudo adunque che se questo solo ministro uni tanta copia di agostari, segno è che ne fu sabbricata gran quantità. Esti però surono di corta durata; perchè essendo succeduto pochi anni dopo Carlo I d'Angiò, questo non contento dell'esterminio di tutta la casa Sveva, volle cancellarne anche la memoria. Imperciocchè nel 1267 ordinò che si abolissero gli agostari, e di essi se ne facesse altra moneta d'oro da lui detta reale, come or ora vedremo. In cotal guisa gli agostari furono in buona parte squagliati. Infatti Matteo degli Afflitti, che fiorì due secoli dopo, attestò: Hodie ista moneta augustalium de auro non currit, quia pauci reperiuntur, et ideo debet solvi eius aestimatio (1). E sebbene si trovino nominati ne' secoli posteriori fino al XVI, come ne' capitoli del ben vivere di questa città (2) e nelle carte Beneventane (3), pure è da credersi che se ne fosse pagata la valuta.

Ma quanto era stimato il valor dell'agostaro? Si crede comunemente che valesse tarì sette e mezzo, ovvero carlini quindici nostrali. Questo è il sentimento universale, questa è la tradizione che ci è stata tramandata da' nostri avoli, e questa si conserva tuttavia nel soro da cinque secoli a questa parte (4). Nondimeno alcuni moderni scrittori

<sup>(1)</sup> Afflitto ad Coft. reg. lib. I rubr. 22 n. 2.

<sup>(2)</sup> Priv., e Capit. della città di Napoli vol. 1 p. 70 et a t.

<sup>(3)</sup> Borgia Mem. istor. di Benevento t. 1, pag. 416.

<sup>(4)</sup> Di ciò ne afficurano l'Afflitto nel luogo citato, il Nigris Com. ad Cap. ad Hoc n. 130, il Capecelatro Consult. 69 n. 2, Stesano di Stesano rag. post. t. I, c. 1, n. 27, p. 126, ed altri.

347 W

per troppo sottilizzare han messo in dubbio ciò che finora si è tenuto per indubitato, ponendo in campo diversi opposti fentimenti. Essi han presa principalmente in mira una testimonianza di Riccardo da S. Germano; ed è mirabile come da un testo medesimo se ne sian tratte tante varie opinioni. Le parole di Riccardo sono queste; Thomas de Pando civis Scalensis novam monetam auri, quae augustalis dicitur ad Sanctum Germanum detulit, ut ipfu moneta utantur homines in emptionibus et venditionibus suis juxta valorem et ab imperiali providentia constitutum, ut quilibet nummus aureus recipiatur, et expendatur pro quarta unciae (1). I moderni, come diceva, hanno molto arzigogolato su questo testo, interpretando in diverse maniere le ultime parole, expendatur pro quarta unciae. Il Vergara ha presa l'Uncle per nome di peso, giudicando che l'agostaro valeise quanto una dobla d'Italia meno ventinove grani, secondo il peso e prezzo corrente (2); e questo sentimento è stato adottato anche dal Muratori (3). Monfignor Testa arcivescovo di Monreale nella vita di Federico II re di Sicilia, ha fimilmente presa la parola uncia materialmente, opinando che l'agostaro valesse la quarta parte dell'oncia d'oro in massa (4). Il già defunto Abate Ferdinando Galiani nelle giunte al trattato della Moneta dopo [di avere adottata la comune opinione, si ritrattò nel decorso, e prese la voce uncia per nome di peso, aggiungendo che il testo di Riccardo sia viziato, sicchè in vece di quarta unciae debba leggersi quinta; e ne allegò questa ragione, perchè avendo posto in bilancia un agostaro ben tenuto, l'avea trovato di trappesi sei, che formano appunto la quinta parte dell'oncia

<sup>(1)</sup> Riccardo da Sangermano Chron, ad an, 1222,

<sup>(2)</sup> Vergara Moneto del Regno pref. pag 5, e nell' Op. pag. 15.

<sup>(3)</sup> Muratori Antiq. med. Ævi diss. 27 tom. II pag. 626 A.

<sup>(4)</sup> Testa de Vita et reb, gest. Federic, 11 pag. 141.

348

a peso (1). Oltre a questi il Conte Carli, benchè sia del comun sentimento, che valesse l'agostaro carlini quindici Napoletani, pure crede che avesse potuto corrispondere ad un fiorino ed un quarto, come su scritto dal Malaspina, dal Villani, e dal Castiglionchio ec. (2). Il Canonico Schiavo pretende, che l'agostaro sosse valuto tarì trentuno, e grana cinque moderni di Sicilia (3). Il Principe di Torremuzza sinalmente suppone, che valeva il quarto dell'oncia moderna Siciliana, che viene a ragguagliare grana 75 di nostra moneta (4).

Ma con buona pace di questi dottissimi uomini, che venero come maestri, le discordanti loro opinioni dimostrano quanto pericoloso sia allontanarsi talvolta da sentimenti comuni e ricevuti; massimamente quando sono stabiliti sopra tradizioni antiche e costanti. Che il valore dell'agostaro sia stato di sette tarì e mezzo, o vogliam dire di carlini quindici Napoletani, è un satto attestato concordemente da tutti gli

scrittori e dalle memorie di que'tempi.

Primieramente il testo di Riccardo da Sangermano, che è stato tanto cavillato, prendendosi nel senso ovvio e naturale, si uniforma al sentimento generale. Egli disse; Quiliber Augustalis recipiatur, et expendatur pro quarta unciae. Pigliandosi la parola uncia per l'oncia monetale, che correva in que' tempi, e che valeva in commercio sessanta carlini; la quarta parte di essa era carlini quindici, cioè tarì sette e mezzo, ed in questo modo lo storico suddetto conferma l'opinione universale.

Ricordano Malaspina storico Fiorentino contemporaneo di Federico II, parlando di questa moneta disse; Gli cambiò

(4) Ivi pag. 317 a 322.

<sup>(1)</sup> Galiani Della Moneta ediz. del 1780 pag. 381 396 416.

<sup>(2)</sup> Carli Zecche di Italia tom. III pag. 225 ad 226.

<sup>(3)</sup> Opuscoli di autori Siciliani tom. XVI pag. 240.

ad agostari d'oro, che valeva l'uno fiorini uno ed un quarto (1). Giovanni Villani anche Fiorentino, che fiorì nel seguente secolo scrisse; L'agostaro d'oro valeva l'uno la valuta d'uno fiorino e quarto d'oro (2). Di quesie parole del Villani si servi Lapo di Castiglionchio celebre giureconsulto Toscano dell'istesso secolo XIV, ragguagliando l'agostaro ad un fiorino e un quarto di Firenze (3). Ma il fiorino Fiorentino valeva in queste nostre regioni sei tari, come apparisce da innumerabili documenti, e tra gli altri da un conto del 1333 al 1336 rapportato dal Ducange; De pecunia recepta in Karolonis argenti, et reducta ad florenos de Florentia, computata qualibet uncia pro quinque florenis, et quolibet floreno pro sex tarenis, et quolibet tareno pro duobus carolenis, et quolibet caroleno, pro decem granis (4). Adunque se il fiorino di Firenze valeva sei tarì, o sieno carlini dodici, è manifesto che un fiorino e quarto faceva tarì sette e mezzo, o pure carlini quindici.

Giacomo, che regnò in Sicilia nell'istesso secolo di Federico, in uno de'suoi capitoli ordinò, che l'agostaro si spendesse in quella monarchia per tari sette e mezzo, secondo il suo natio valore; Providimus, et praecipimus augustales.... generaliter recipi, et expendi ad rationem videlicet de tarenis septem et granis decem pro quolibet

augustale (5).

Ma ciò più luminosamente si compruova con due diplomi, che abbiamo nell'archivio della zecca, i quali ci san sapere distintamente non solo il valore dell'agostaro, ma anche il titolo. Essi sono così importanti che meritano

<sup>(1)</sup> Ricord. Malaspina cap. 130 pag. 109.

<sup>(2)</sup> Giov. Villani Lib. VI cap. XI.

<sup>(3)</sup> Lapo da Castiglionchio epis. pag. 95.

<sup>(4)</sup> Ducange Gloss. Latin, voce Uncia.

<sup>(5)</sup> Capit. Regni Siciliae tom. I pag. 35 anno 1288.

di esser messi in veduta. Carlo I d'Angid, come si è accennato, volle che si abolissero gli agostari e mezzi agostari nell'una e nell'altra Sicilia, surrogando ad essi due nuove monete da lui chiamate reali e mezzi reali. In quelle stelle commissioni emanate nel 1267 ordinò, che nelle zecche di Barletta e di Messina si fossero battute le monete nuove, le quali dovessero avere il medesimo peso, bontà e valore delle Federiciane. Ecco le parole della commissione per Barletta, e si noti se possono essere più precise; Mandantes quaterus . . . in eadem sicla nostra Baroli Regules medios Regales et tarenos auri ad modum infrascriptum laborari et çudi façiatis videlicet quod quelibet libra Regalium et mediorum Regalium contineat de auro puro in pondere uncias auri decem tarenos septem et medium in pondere et quilibet Regalis sit in pondere tarenos sex et medius Regalis tarenos trium et Regalis quilibet pro tarenis septem et medio et medius Regalis pro tarenis tribus et granis quindecim expendantur prout augustales et medii augustales olim erant dicte tenute et ponderis et expendebantur hactenus pro quantitate predicta. Nell'istesso modo su distesa la commissione per la zecca di Messina, come si può osservare dallo squarcio in piè di pagina (1). Da questi diplomi ricaviamo le proprietà tutte del reale, ed agostaro insieme. Primieramente ne impariamo la bontà; Quelibet libra regalium contineat de auro puro in pondere uncias auri decem tarenos septem et medium. Che

<sup>(1)</sup> Mandantes quatenus.... in eadem sicla nostra Messane Regales medios Regales et tarenos auri ad modum infrascriptum laborari et cudi faciatis videlicet quod quelibet libra Regalium et mediorum Regalium contineat de auro puro in pondere uncias decem et tarenos septem et medium in pondere et quilibet Regalis sit in pondere tarenos sex et medius Regalis tarenos trium et Regalis quilibet pro tarenis septems o medium et medius Regalis pro tarenis tribus et granis quindecim expendantur prout augustales et medii augustales olim erant diste senute et ponderis et expendebantur bastenus pro quantitate predista. Arch. della Zecca Regist. 1280 lit. C, sol. 5 et o t.

val quanto dire l'oro de' reali, e degli agostari era di carati venti e mezzo. Ne conosciamo in secondo luogo il peso, ch'era di trappesi sei; Quilibet Regalis sit in pondere tarenos sex. Ne sappiamo per ultimo il valore, ch'era di tari sette e mezzo; Regalis quilibet pro tarenis septem et medio expendatur pro ut augustales olim erant ditte tenute et ponderis et expendebantur hactenus pro quantitate preditta. Ed ecco qui il valor legale dell'agostaro distinto dal peso, e dalla bontà. Or dopo rinvenuta questa specie di documenti, sarebbe una frenesia il dubitare più che l'agostaro valesse sette tarì e mezzo, come viene universalmente stimato. E so per dire, che una ventina di diplomi simili a questi basterebbero a dissipar le tenebre, delle quali sono ricoperte le monete de' secoli mezzani.

Da questi medesimi diplomi si conoscono parimente gli abbagli del Malaspina, del Villani e del Borghini nel descriverci il titolo degli agostari, senza parlare de' moderni scrittori. Il primo disse, che la qualità dell'oro era di carati venti, il secondo asserì essere di fine oro a paragone; ed il terzo giudicò che fosse di carati ventitre e mezzo o ventitre e tre quarti (1). Ma le testimonianze di questi privati scrittori devono cedere all'autorità degli allegati diplomi, i quali in fostanza contengono due commissioni regie emanate da un sovrano nel proprio stato dopo maturo esame e diligenti pruove, come quelle che riguardavano una materia così importante; Summa premeditatione et deliberatione pensata, et diligenti deliberatione perhabita; sono queste espressioni inserite in detti diplomi. Commissioni in somma, che vennero pubblicate con tutte le solennità, perchè accompagnate con lettere patenti dirette a tutti i conti, giustizieri, baroni, secreti, castellani, balii, giudici, alle università d'entrambi i regni, ai quali si se nota la

<sup>(1)</sup> Borghini Della Moneta Fiorentina tom. II pag. 220.

# 352

fabbrica, ed il titolo delle nuove monete, in tutto corrispondenti al valore, peso, e bontà degli agostari; ed in conseguenza si deve conchiudere, che la bontà di questi era di carati venti e mezzo; il che venne anche attestato da Mastro Jacopo di Fiorenza nella sua aritmetica seritta nel 1307, dove disse: Che gli agostari d'oro sono a carati venti e mezzo (1).

Ora per compimento dell'opera ne aggiungo quì il disegno ricavato dall'agostaro che ho presso di me. Eccolo



appunto.

Esso rappresenta da un lato il mezzo busto di Federico II colla leggenda CÆSAR. AUG. IMP. ROM., e nel rovescio l'aquila imperiale col nome FRIDERICUS. Stupisco come abbia potuto venire in mente al Poggio (2), al Liruti (3), ed altri, che questa moneta sosse stata in uso in Costantinopoli a' tempi di Costantino il grande; ed al Signor Apostolo Zeno, al Muratori (4), ed a Monsignor Borgia (5), che l'immagine in essa scolpita sia di Cesare Augusto, da cui tirano l'etimologia di augustale. Stupisco, io diceva, come nomini

(2) Calogerà Opusc. tom. XIX pag. 414.

(3) V. Argelati tom. II pag. 169.

<sup>(</sup>I) V. le Novell. Letter. del Lami del 1754. col. 295.

<sup>(4)</sup> V. Muratori Antich. Ital. diss. 27 403 diss. 28 p. 472. (5) Borgia Mem. di Benevento tom. Il p.g. 51 et 200.

nomini così dotti abbian potuto proferire asserzioni così polo ponderate con manifesta violenza all'autorità di due scrittori contemporanei, cioè di Riccardo da Sangermano, e di Ricordano Malaspina; il primo de' quali chiamò l'agostaro moneta nuova introdotta dal nostro Federico, ed il secondo dichiarò di effervi improntato il volto dell'istesso imperatore. Nè per rinvenire l'etimologia di agostaro ci era bisogno di ricorrere a tredici secoli indietro, e salire sino ad Ottaviano. quando che si poteva ricavare dall'istesso Federico, al quale non era straniero il titolo d'augusto, come apparisce da infiniti documenti. Ma senza cercarli altrove, l'abbiamo nelle stesse costituzioni, in fronte delle quali ci è l'istesso titolo apposto nell'agostaro; cioè Imperator Fredericus II Romanorum Caesar semper Augustus. Oltre di che chi può mai persuadersi, che Federico II, il quale fu tanto geloso della sua fama, avesse adoprato in una moneta propria il nome di un principe tanto remoto, col quale non ebbe mai alcuna relazione? Chi può mai credere che l'immagine impressa nell'agostaro la di Ottaviano, se ci è scolpito, il nome Fridericus? Ma lenza più intrattenermi a ribattere queste erronee asserzioni, mi rimetto a quel di più che ne hanno scritto lo Schiavo (1), e lo Zanetti (2); mentre io torno al mio scopo principale, qual'è di fissare il valor legale di questa moneta.

Crederei adunque di lasciare in qualche modo dubbio il valor dell'agostaro, se non indicassi la cagione degli abbagli de' moderni avversarj. A ben ristettersi le loro discordanze dipendono da puri equivoci, ne' quali sono incorsi, interpretando le testimonianze di Riccardo da Sangermano, del Malaspina, del Villani, e del Castiglionchio, equivoci facilissimi a prendersi in fatto di monete barbare, quando non si esaminano a sondo, ed a sangue freddo.

<sup>(1)</sup> Opuscoli di autori Siciliani tom. XVI pag. 237.

Primieramente la parola uncia usata da Riccardo nel luogo ora citato è parola ambigua e di doppio senso: imperocchè fignifica il peso dell'oncia, e la moneta di questo nome. Incontrandosi essa nelle vecchie earte, conviene diligentemente avvertire quando indica peso, e quando dinota la moneta; talchè pigliandosi una cosa per l'altra, volentieri si cade in errore. Tanto appunto è accaduto al Vergara, al Muratori, al prelato di Monreale, ed al conuglier Galiani, i quali prendendo la quarta unciae usata dal cronista per nome di peso, son usciti di squadra, perdendosi in diversi calcoli. L'uncia usata da Riccardo è da intendersi per nome di moneta; mentre egli per far capire a tutti il valore del nuovo denaro fabbricato da Federico, ragguagliò l'agostaro coll'oncia d'oro monetale allora nota a tutti, che correva in commercio, come oggi corre il ducato. Sicchè fece il ragguaglio fra moneta e moneta, e non già fra moneta e peso, come è stato immaginato da' mentovati scrittori. Or se l'oncia monetale valeva trenta tarì; la quarta parte di essa importava tarì sette e mezzo. e tanto appunto, come si è detto, valeva l'agostaro.

L'altro equivoco in cui facilmente si cade parlando di monete barbare, consiste ne' nomi stessi delle monete. Ve n'erano in que'tempi alcune che avevano il medesimo nome, ed un valore diverso; come si è osservato di sopra parlando de' soldi, senza nominare i tarì, ed altre monete consimili. Altrettanto è da dirsi de' fiorini. Altro era il fiorino di Firenze, che allora era il comune, altro il fiorino di camera, altro quello di Aragona, ed altro il fiorino di Sicilia, come egregiamente osserva l'illustre principe di Torremuzza (1). Il conte Carli desideroso di conciliare l'autorità del Malaspina, del Villani, e del Castiglionchio, con una carta Siciliana communicatagli dal canonico Schiavo,

<sup>(1)</sup> Opusc. di autori Sicil. tom. XVI pag. 345 e seg.

asseri, che l'agostaro valesse un fiorino ed un quinto, e non già un fiorino e quarto, come era stato avvisato dagli scrittori già detti; senza rislettere che il fiorino nominato in quella carta era fiorino di Sicilia, particolare di quell'isola; che correva tarì sei, e grana cinque, o siano carlini dodici e mezzo, come apparisce dalle parole della stessa carta recata dal Carli. In florenis viginti, computatis tarenis sex, et granis quinque pro quolibet (1). All'incontro il Malaspina, il Villani, il Castiglionchio, come Toscani, ragguagliarono l'agostaro col loro fiorino di Firenze, che valeva soli carlini dodici, come abbiamo provato. Quindi è che uno di questi fiorini ed un quarto saceva tarì sette e mezzo.

Il canonico Schiavo poi abbagliò nell'interpretare il Malaspina, e'l Villani che ragguagliarono l'agostaro ad un fiorino e quarto di Firenze. Quel valentuomo per rintracciar la valuta del detto fiorino, fi avviò pen una via tortuosa e malagevole, che il menò ben lontano dal suo scopo. Egli andò a ricorrere all'antico ducato d'oro di Venezia; dicendo che il fiorino Fiorentino, ed il ducato Veneziano sono stati computati del medesimo prezzo e valore. Dopo questa premessa valutò l'antico ducato d'oro di Venezia' all'istesso prezzo che correva a'giorni suoi il moderno zecchino Veneziano, cioè venticinque tarì Siciliani. In questo modo fece sbalzare l'agostaro a tari trentuno, e grana cinque di Sicilia; senza far conto che l'antico valore del ducato d'oro di Venezia era tutto diverso dall'odierno zecchino di quella repubblica. Si sa da tutti, che il moderno zecchino viene valutato ne' domini Veneti per lire ventidue. Ma il valore del ducato d'oro del XIII secolo è tuttavia incerto e controvertito. I Signori Zagata (2) e Zanon (3),

<sup>(1)</sup> Carli tom. III Zecche d'Italia pag. 225 e 226.

<sup>(2)</sup> Zigata Cron. di Verona presso Argelati t. II pag. 69.

<sup>(3)</sup> Zanon Lettere di Agricol. tom. V pag. 196.

lire tre, e soldi due (1). Il Signore Zanetti giudica che valeva soldi 39, e 40 (2). Il Conte Carli stima che valeva diciotto grossi (3). A qualunque delle divisate opinioni si voglia stare, si vede sempre che l'antico ducato d'oro aveva valore estrinseco di gran lunga inferiore a quello del moderno zecchino. Ma senza ricorrere altrove, il valore dell'antico siorino ci viene direttamente avvisato da vari documenti, e singolarmente da quello che ho recato poco sa, che computa ogni siorino di Firenze per sei tarì, ogni tarì per due carlini, ed ogni carlino per dieci grana. Or se il detto siorino valeva dodici carlini; dunque un siorino e quarto corrispondeva a quindici carlini Napoletani, e non già a tarì trentuno e grana cinque di Sicilia, come credette il lodato Schiavo.

E finalmente l'equivoco del principe di Torremuzza dipende da più remota cagione, come si vedrà nella fine di questa prima parte: basta per ora indicar il suo inganno. E' cosa indubitata, per ciò che si è dimostrato, che nel secolo XIII l'oro si vendeva circa a ducati otto l'oncia. Carlo I d'Angiò sece comprare 218 libbre d'oro di doppie, ch'era più puro, alla ragione di ducati otto e grana ventisei l'oncia, come dal diploma di sopra recato nell'articolo del tari. Ciò premesso, il principe di Torremuzza stima l'agostaro sette tarì e mezzo dell'odierna moneta di Sicilia, che sanno settantacinque grana di moneta Napoletana. Ma l'agostaro pesava sei trappesi: dunque cinque agostari pesavano un'oncia. Che val quanto dire cinque agostari avrebbero avuto di valor estrinseco ducati tre, e grana sertantacinque, e d'intrinseco prezzo d'oro ducati otto in

<sup>(1)</sup> V. Argelati tom. I pag. 156.

<sup>(2)</sup> Zanetti tom. II pag. 231.

<sup>(3)</sup> Carli Zecche d' Ital. tom. V pag. 153.

circa; e per conseguenza si dovrebbe dire, che gli agostari correvano in commercio meno della metà dell'intrinseco valore. Ma se questo è un assurdo, anzi un'eresia politica; è dunque evidentemente erronea la sua opinione. Non mi dissondo poi sulla proporzione che sa lo stesso autore tra l'oro, e l'argento de'secoli XI, XII, e XIII ec; mentre essa è tutta appoggiata sopra dati fallaci, come si vedrà in sine di questa prima parte. Ed ecco, se io non m'inganno, dissipata la polvere che han sollevata i moderni per ossuscare il valor dell'agostaro.

#### DEL MEZZO AGOSTARO.

Il mezzo agostaro viene allegato in due costituzioni, éioè in quella che comincia Dubitationem jurisperitorum, e nell'altra Salubritatem aeris. Oltre a ciò viene spesso nominato nelle vecchie carte. In un registro del 1268 apparisce, che nel 1268 i Napoletani furono condannati dalla G. C. a pagar mezzo agostaro per suoco, per aver devastato la vigna dell'abate Andrea Griffo (1), e così altrove (2). Ciò non ostante questa moneta è quasi ignota al mondo letterario. Il Borghini, il Paruta, l'Havercampo, il Ducange, il Vergara, il Muratori, l'Argelati, il conte Carli, il canonico Schiavo, il Bellini, il principe di Torremuzza, montignor Borgia, ed altri che han parlato dell'agostaro, e di attre nostre monete, non han fatto nè pur cenno del mezzo agostaro. Due, per quanto io sappia, tra i numismatici, l'hanno semplicemente ricordato. Il signor Chiarito tra i nostri, parlando di Carlo I d'Angiò, l'accenna in questo modo; Leggest di aver egli ordinato che nel regno per l'avvenire non avessere avuto corso gli

<sup>(1)</sup> Archiv. della Zecca regist. 1263 A pag. 79.

<sup>(2)</sup> Detto registro 1268 pag. 127.

augustali, e mezzi augustali (1). Tra gli esteri l'accenna parimenti il signore Zanetti colle seguenti parole; Dessi per ultimo avvertire, che oltre l'Agostaro di oro, sece Federico coniare probabilmente anche il doppio, ed il mezzo Agostaro; siccome il primo veduto abbiamo in documento del 1297 preso il Du-Cange nominati tres grossos Augustarios auri e quanto al secondo vengo assicurato da un mio autorevole Amico di averne veduti (2). Il Chiarito adunque non ce ne ha dato altro che il semplice nome, e lo Zanetti un giudizio satto sulla relazione altrui.

Ma perchè non ho omeisa diligenza per illustrar la materia non solo con documenti, ma anche colle monete stesse; dopo varie ricerche satte ne ho rinvenuto uno tralle antiquarie suppellettili del chiar. Don Francesco Daniele storiograso di Sua Maestà, e diligentissimo raccoglitore dei monumenti Federiciani; oltre a quello che io stesso ne posseggo procuratomi dal medesimo Signor Daniele. Lo presento per la prima volta al pubblico nella grandezza dell'originale.



Esso porta la stessa impressione dell'agostaro, mostrando da un lato il busto di Federico colle parole Caesar Aug.

<sup>(1)</sup> Chiarito Comm. alla Cost. de Inst. confic. pag. 94.

<sup>(2)</sup> Zanetti Monete d' Ital. tom. II pag. 437 e 438.

Imp. Rom., e dal rovescio l'aquila imperiale, attorno della quale stà scritto Fridericus. Il silenzio degli antiquari, e la rarità di questa moneta mi sanno credere che se ne sossero coniate poche, le quali si sono disperse e liquesatte.

Dalle commissioni di Carlo I d'Angiò, da me più volte allegate, sappiamo non solo il valore, ma anche il titolo de' mezzi agostari. La bontà dell'oro era la stessa degli agostari, cioè venti carati e mezzo; dapoichè ogni libbra di mezzi agostari doveva contenere once dieci e trappesi sette e mezzo d'oro puro. Il peso era di trappesi tre. Il valore finalmente era di tari tre, e grana quindici, o sieno carlini sette e mezzo di nostra moneta. Medius Regalis pro tarenis tribus et granis quindecim expendatur... prout medii augustales olim erant diete tenute et ponderis et expendebantur hactenus pro quantitate predicta. E queste son le monete tutte che si adoprano nel codice delle costituzioni delle due Sicilie.

### DEL CARLINO.

Sebbene il carlino non venga nominato nelle costituzioni del regno, pure dovendo servire al mio istituto, conviene qui dirne qualche cosa. Questa moneta viene nominata nelli capitoli de' re Angioini (1), e su di grandissimo uso non solo in questo regno, ma ben anche nella Sicilia; mentre essendo di valore mezzano tra le monete piccole, e le preziose, e comoda a tutti i ceti di persone, è stata di tempo in tempo con diversi impronti rinnovata da quasi tutti i sovrani di ambedue i regni, dove tuttavia se ne conserva l'uso. Il primo che l'introdusse su Carlo I d'Angiò, il quale dopo debellato Mansredi, e dopo di essersi pienamente impossessato di questi regni, sece stampare questa nuova moneta, che dal suo nome denominò cariino,

<sup>(1)</sup> Capitolo di Roberto Robertus = Perpensa deliberatione.

come apparisce dalle parecchie carte dell'archivio della zecca fatte in tempo del di lui governo. Il Muratori volle dire: Non so, se dal primo, o dal secondo sia disceso il costume tuttavia mantenuto nel Regno di Napoli di chiamar Carlini simiglianti denari (1). Ma questo su un dubbio insufistente, che si poteva agevolmente scansare, se aveise considerato, che una tal moneta su introdotta anche nella Sicilia; ed in quel regno non potette introdurla, che il folo Carlo I, che ne fu fignore per parecchi anni; mentre Carlo II non ebbe mai dominio in quel regno. Carlo I adunque introdusse il carlino, e ne sece coniare di due specie, cioè d'oro, e d'argento, avendoci fatto imprimere lo scudo co'gigli, ch'era l'impresa della casa Angioina, e perciò fu detto anche carlino gigliato. Il valor legale de' carlini è stato parimente di due specie; mentre quello di oro valeva quindici carlini, o sia la quarta parte dell'oncia, quanto valeva appunto l'agostaro; Karolensis auri ad rationem de quatuor eorum pro uncia una (2). Al carlino d'argento poi fu dato il valore di grana dieci, che ha ritenuto infino ad oggi; tal che due di essi facevano un tari, e sessanta un'oncia. Così in una carta della Cava del 1299; Uncias centum in carolenis argenteis novis ad rationem de sexaginta per unciam (3); e così in infinite altre carte del nostro regno. Così Andrea d'Isernia nei commentarja'libri feudali; Unum carolenum, qui valet granos decem, E poco dopo; carleno valente decem granos (4).

Considerazioni sul valor legale delle monete della Sicilia.

Prima di terminare questa prima parte voglio, che facciamo una scoperta di molta importanza sul valor legale delle

<sup>(1)</sup> Muratori Antichità Italiane Diff. 27 tom. I pag. 404.

<sup>(2)</sup> Archivio della Zecca 1280 C Fol. 86. (3) Archivio della Cava Arc. 87 num. 86.

<sup>(4)</sup> Isernia Que sunt Regalia v. Monete n. 22 p. 293.

361 W

delle monete Siciliane, il che serve per sempre più confermare, che le monete de'bassi tempi trovansi immerse in dense caligini. E' cosa degna di osservazione, che tanto la Sicilia, quanto le contrade, che oggi formano il regno di Napoli da parecchi secoli a questa parte hanno avuta: la steisa sorte, ed ugual sorma di governo. Esse dopo essere state per più tempo divise in piccoli domini, ed esposte alle incursioni di barbare nazioni, finalmente nel fecolo XI furono ridotte in monarchia da' principi Normanni: e dal XI fino al XIII furono governate da' medesimi sovrani. E benché sotto Carlo I d'Angiò la Sicilia si divise da noi col famoso vespro Siciliano, e restò separata per lo spazio di circa 150 anni, pure si riuni nuovamente sotto Alfonso d'Aragona nella metà del secolo XV; e da quel tempo in poi, a riserva di pochi intervalli, è stata, com'è al presente, a noi unita e congiunta. Or questi due regni. o che fin da que' primi secoli fossero stati separati tra loro, e l'uno indipendente dall'altro, come sostiene il Giannone (1), o che avessero formato un regno solo, come più ragionevolmente pretendono gli scrittori Siciliani (2); è cosa certa, ch'ebbero quasi tutte le monete uniformi. I Siciliani sin da quei tempi, ed anche prima, usarono ugualmente che noi la libbra, l'oncia, il tarì, il grano, ed altre; e da quel tempo sino a' di nostri sono in uso nell'una, e nell'altra parte, ad eccezione della libbra, che a poco a poco è andata in disuso. Ciò però non ostante facendosi il confronto fra denaro e denaro, si trova un divario enormissimo: imperocchè la pecunia della Sicilia vale oggi la metà meno di quella del regno. Infatti l'oncia moderna Siciliana corrisponde a tre ducati Napoletani, e non a sei, quanto si valuta l'oncia nostra: il tari Siculo corre presso

<sup>(1)</sup> Giannone lib. XI cap. 4.

<sup>(2)</sup> V. Inveges Storia di Palermo tom. III.

di noi per semplice carlino: il carlino di Sicilia equivale a cinque grana nostrali: ed il grano di quell'isola si spende in questo nostro continente per semplice tornese (1).

Or ciò supposto io qui propongo un dubbio assai degno de' vostri ingegni. Ne' primi secoli della monarchia le monete Siciliane erano così difformi dal valore delle Napoletane? E per proporre il problema in modo più preciso; le monete della Sicilia hanno oggi quello stesso valore, che avevano ne' fecoli XI, XII, e XIII, ed anche prima? Gli scrittori di quell'isola credono generalmente di sì; perchè sono persuasi, che le monete loro siensi sempre mai mantenute sul piede, in cui oggi sono, cioè la metà meno delle nostre. E per rendervene certi, voglio che lo sentiate da un Siciliano medesimo, qual'è il lodato canonico Schiavo, che lo attesta co' seguenti termini; I nostri nazionali scrittori, senza ricercar più oltre, qualora nelle antiche scritture si sono incontrati ne nomi d'oncia d'oro, l'hanno a dirittura creduta un'oncia semplice simile a quelle, che di sovente nella nostra zecca si coniano . . . . di tre ducati Napoletani composta (2). E stupisco, come il ch. autore delle Mémorie delle zecche di Sicilia scritte dopo la morte di Schiavo, non abbia nè meno avvertito questo enorme divario, anzi si lasci anch' egli trascinare dalla comune opinione. Infatti parlando egli dell'agostaro, dice, ch'era l'Agostale col piccolo importo di tari sette e mezzo di Argento de' nostri tempi; val quanto dire di carlini sette e mezzo Napoletani (3). Vedendo lo stesso autore, che questo sentimento avrebbe molto diminuito il prezzo dell'oro di que' tempi, ed avanzato quello dell'argento, è caduto nella necessità di sostenere, che ne' secoli XI, XII, e XIII la

<sup>(1)</sup> V. la Prammatica de' 20 dicembre 1745 LIII de monesis.

<sup>(2)</sup> Opuscoli d'autori Siciliani tom. XVI pag. 231, c 232.

<sup>(3)</sup> Opulcoli suddetti tom. XVI pag. 321, e 322 nella nota.

Me 363 -

proporzione dell'oro all'argento era fino, come uno a sette, il che da niuno ancora è stato detto, nè immaginato. E finalmente lo stesso Schiavo ci assicura, che per pratica generale de' tribunali della Sicilia si osserva, che qualora nelle antiche carte si faccia menzione dell'once, tarì ec., questi sempre si stimano per once, e tarì moderni (1).

Or questo appunto è un inganno generale, e dirò ancora di somma conseguenza, il che sia detto con tutto il rispetto dovuto a quella sagace e dotta nazione. Quindi imprendo a dimostrare, che il valor legale delle monete Siciliane ne' secoli XI, XII, e XIII, ed anche prima era in tutto unisorme a quello delle nostre, ed erano esse, diciam così, una cosa stessa. E se oggi il denaro Siciliano vale la metà meno del nostro, è dipeso da una sconosciuta alterazione, che gli si è data, dopo che la Sicilia si sottrasse dal

dominio de' nostri sovrani. Eccone le pruove,

Primieramente si è già accennata la grande uniformità. che per lo spazio di più secoli vi è stata fra l'uno e l'altro regno. Essi, per così dire, ebbero comuni i natall, perchè in un secolo medesimo furono ridotti in principato. Dall' XI fino al XIII ebbero comuni i sovrani, i quali fissarono la loro sede in Palermo, dove anche risedevano i primari officiali della corona. Ebbero comuni parimente le leggi. In fomma fi dimesticarono tanto, e con sì amabil nodo si collegarono insieme, che l'uno comunicò all'altro il proprio nome: onde il nostro continente sino da quei tempi acquistò anche il nome di Sicilia. E benchè avessero avute separate le zecche; ciò non ostante parte per la vicinanza loro, parte per lo commercio delle due nazioni, e soprattutto per l'unità del governo, ebbero quasi tutte le monete uniformi, adoprandole cogli stessi nomi, e proporzione tra loro. Se l'oncia Napoletana valeva trenta

<sup>(</sup>z) Opuscoli Siciliani XVI pag. 249. Z z 2

tari, ed il tari venti grana; anche l'oncia Siciliana valeva trenta tari, ed il tari grana venti, ed altrettanto dicasi delle altre monete. Se in queste provincie si facevano i conti in once, tari, e grana; anche nelle regioni Sicule facevasi lo stesso. Dal che si ricava, che l'une e l'altre monete ebbero comune l'origine. E se surono unisormi ne' nomi, nella proporzione, e nel modo di conteggiarle, dovettero in conseguenza essere le stesse in

ambedue i regni.

Secondo perche alcuni principi di que primi secoli introdussero in ambedue i dominj alcune nuove monete. Il re Ruggiero, come avvisa Falcone Beneventano. c'introdusse i ducati ed i follari suoi; Monesam suam introduxit, unam vero, cui ducatus nomen imposuit, octo Romesinas valentem . . . . Induxit etiam tres follares ereos Romesinam unam appretiatos (1). Federico II c'introdusse gli agostari, come abbiamo dimostrato coll'autorità di Riccardo da Sangermano. Carlo I d'Angiò c'introdusse i carlini, che sono tuttavia in uso nell'uno e nell'altro stato. Or chi può persuadersi, che queste monete introdotte da' medesimi sovrani, in tempi che governavano l'uno e l'altro regno, nelle nostre provincie avessero avuto il doppio valore di quello, che avevano nella Sicilia? Questa sarebbe stata una cosa mostruosa, nè certamente si sarebbe taciuta dagli storici teste allegati.

Terzo si pruova dalle stesse costituzioni del regno. Il codice delle costituzioni, come ognun sa, su emanato da Federico non solo per le regioni di quà dal Faro, ma anche per le regioni di là, dove è tuttavia in osservanza. In dette costituzioni adunque si nominano varie specie di monete, che correvano in quei tempi in ambedue le parti, e queste vengono adoprate e nominate senza disserenza veruna;

<sup>(1)</sup> Falcone Beneventano cronic. anno 1140.

765 W

ond'è chiaro, che doveano essere le medesime. Mi spiegherò meglio coll'esempio di sopra allegato. Nella costituzione Quia numquam sciri potest, su stabilita, che il medico per due visite al giorno non poteva esigere più di mezzo tarì. o siano dieci grana. Or se le monete Siciliane di que' tempi valevano la metà meno delle nostre, si deve dire, che in virtù di una stessa legge i medici di questo regno riscuotevano dieci grana Napoletane al giorno, e quelli della Sicilia non ne potevano esigere più di cinque, posto che il tari di Sicilia fosse valuto dieci grana nostrali, come vale oggi. E lo stesso dicasi delle altre somme stabilite dalle costituzioni per gli notari, per gli subalterni, per gli contratti, per le pene pecuniarie ec., le qua i vengono determinate senza veruna distinzione nè di regno, nè di valore. Può dirsi cosa più assurda di questa; che le stesse leggi in una contrada dovessero eseguirsi in un modo, e nell'altra in modo diverso? Certo che nò. Dunque convien conchiudere, o che le costituzioni furono assurde, o che le monete dei due regni avevano in que' tempi ugual valore.

Ma lasciam da banda le ragioni di convenienza; io voglio addurvene una, che esclude ogni replica, dimostrando che in que' tempi le monete Siciliane e le nostre erano eguali non folo nel valore estrinseco, ma anche nell'intrinseco. I due diplomi del 1267 di Carlo I di Angiò, più volte allegati, mettono questa verità in tutto il lume. Si vede in essi, che le monete, che si battevano nella zecca di Messina, erano dello stesso peso, della stessa bontà, e dello stesso valore delle monete, che si coniavano nel nostro regno. Sarebbe quì di mestieri leggere intieramente la commissione diretta agli zecchieri di Messina, e quella indirizzata agli zecchieri di Barletta; ma dai corrispondenti squarci, che ho sopra recati dell'una e dell'altra commissione, si vede, che il tari nostrale era di carati 16 - d'oro, pesava acini 20, e valeva venti grana: e che tal quale era il tarì di Sicilia.. I mezzi reali, e mezzi agostari di

queste provincie erano di carati 20 ;, pesavano tre trappesi, e valevano tari tre, e grana quindici; e tali erano i mezzi reali, e mezzi agostari Siciliani. I reali, e gli agostari nostri erano di carati 201, pesavano sei trappesi, e si spendevano per tarì sette e mezzo: ed i reali, ed agostari coniati in Messina erano similmente di venti carati e mezzo, di trappesi sei, e si spendevano per sette tari e mezzo, come tutto viene precisamente spiegato ne' diplomi già detti. Ed io aggiungo ancora, che gli agostari nostri ed i Siciliani avevano il medesimo impronto, e l'iscrizione medesima: mentre l'agostaro di questo regno rapportato dal Vergara (1), dal Muratori (2), e da me poco innanzi, è similissimo all'agostaro di Sicilia rapportato dal Paruta (3). e dallo Schiavo (4). In somma tutte queste monete Siciliane, corrispondevano esattamente alle nostre tanto nell'estrinseco. quanto nell'intrinseco. Adunque per la necessaria proporzione, che le monete hanno fra loro, tutto il denaro Siciliano valeva lo stesso che il nostro. Può darsi pruova di questa più chiara? Se questa non merita titolo di dimostrazione, qual altra pruova così chiameremo? Quindi apparisce anche alle persone più grossolane, che la moneta di Sicilia ne' primi tre secoli della monarchia, aveva un valore eguale alla nostra. E se dopo di quel tempo le Siciliane sono valute la metà meno, è affolutamente dipeso da alterazion di prezzo, che loro fi è data.

In qual tempo poi fosse accaduta così fatta alterazione, non ardisco ancora diffinirlo. Stimo però, che ciò avvenisse in diverse volte, dopo che la Sicilia si separò da noi. Il secolo XIV, sotto il regno de' fratelli Ludovico e Federico III, su epoca molto calamitosa alla Sicilia per le guerre

<sup>(1)</sup> Vergara Monete di Napoli Tav. VI, Num. 6, 7.

<sup>(2)</sup> Muratori Antiq. medii aevi tom. II, n. 8, 9 pag. 637 e 638.
(3) Paruta Sicilia Numismatica P. III. tav. CXCIV. n. 5.

<sup>(4)</sup> Opuscoli degli Autori Siciliani tom. XVI pag. 239.

civili, e per le discordie de' conti di Chiaromonte, Palici, Mistretta, e di altri baroni, che si resero padroni di quasi tutta l'isola (1); onde le rendite si videro notabilmente minorare (2). Maggiori furono le miserie, che provo quel regno nel XV secolo, essendosi reso così povero, che per penuria di oro e di argento si facevano generalmente i pagamenti in piccioli (monete tenuissime, ognuna delle quali corrisponde a due calli de' nostri). Continui erano i romori e le discordie tra i contraenti: discordie, che richiamarono l'attenzione del governo, il quale con bando penale ordinò, che i pagamenti si facessero di tre quarti di moneta d'oro, o di argento, e di una quarta parte di piccioli. Ma la scarsezza de tempi non tollerò punto un tal rimedio. Quindi gli Ordini tutti del regno radunati in parlamento nel 1457 si videro obbligati di ricorrere al re Alfonso di Aragona, e fralle altre grazie dimandarono la rivocazione del bando, perchè il regno era tanto esausto, che appena vi si trovavano i soli piccioli. Infatti ottennero la permissione di potersi fare i pagamenti in qualsivoglia specie di denaro, come meglio riuscisse, e potessero i contraenti convenire (3). In mezzo a queste calamità io credo, che la moneta Siciliana dovette avanzare di prezzo, le non in una volta, almeno a poco a poco. In effetto ne ritrovo un esempio accaduto nel XIV secolo tra i privilegi della città di Palermo raccolti dal Vio (4). Altri più chiari ne ritrovo nel XV. Imperocchè nel 1457 gli Ordini di quel regno cercarono ad Alfonso la grazia di poter alterare il prezzo de' ducati Veneziani, e delle altre monete (5). E poiché quel sovrano prese tempo a deliberare, quindi è che

<sup>(1)</sup> Fazzello de Rebus Siculis Dec. II, cap. 5.

<sup>(2)</sup> Mongitore Privileg. Ecct. Panorm. pag. 186 ad 190.

<sup>(3)</sup> Capitula Regni Sichiae tom. I pag. 420 cap. 530.

<sup>(4)</sup> De Vio Privileg. Urb. Panorm. pag. 59.

<sup>(5)</sup> Capit ula Regni Siciliae tom. I pag. 407, 408.

nel 1458 appena succeduto al regno Giovanni d'Aragona, fu rinnovata la stessa domanda, e su già accordato di accrescersi il prezzo alla moneta, come si legge ne'capitoli di quel fovrano (1). Veggo infatti, che l'alfonfino, moneta d'oro, nello spazio di venti anni, cioè dal 1451 sino al 1471 dal valore di carlini 22, che prima aveva, fu accresciuto fino a carlini 26, e grana 2 (2). Questo è quanto ho potuto rinvenire in generale sull'accrescimento del valore delle monete Sicule. Ma lascio ben volentieri questo campo alle ricerche de' nazionali, contentandomi di avere scoperto

il vero valore delle monete di que' primi secoli.

Quì però convien che confessi, che questo cangiamento di valore è stato subodorato da due moderni autori, uno estero, e l'altro nazionale. Il Conte Carli, tra gli esteri, parlando dell'oncia Siciliana dice; Potrebbe benissimo essere, che un Fiorino ed un quarto equivalessero ad una moneta d'oro, che fosse la quarta parte d'altra moneta appellata Oncia da' Siciliani, e che noi non conoschiamo più (3). Il canonico Schiavo, ch'è l'unico che io sappia tra gli scrittori Siciliani, ha pure avvertito questo cangiamento. Ma questo valentuomo se conobbe l'errore de'suoi nazionali, non arrivò a conoscere il vero. Anzi per troppo discossarsi dal fallo comune, urtò in fallo più enorme. Laddove i Siciliani valutano l'oncia antica per tre ducati Napoletani, egli la quadruplicò, facendola di ducati dodici e mezzo. E questa, se io non m'inganno, è la principal cagione per cui le monete e zecche della Sicilia de' bassi tempi, non sono state molto considerate da' moderni autori, che han trattato delle zecche d' Italia. Il lodato principe di Torremuzza nella prefazione alle Memorie delle zecche di Sicilia

(3) Carli to m. III delle sue opere pag. 225.

<sup>(1)</sup> Ibidem Cap. 25 Reg. Ioann. pag. 444, 445. (2) V. Torremuz. Opusc. Sicil. tom. XVI pag. 321 a 324.

369

Sicilia si duole de' suddetti autori, e singolarmente del Conte Carli, i quali benchè avessero trattato generalmente delle monete d'Italia de' bassi tempi, ed anche di alcune oscure comunità, e di piccoli luoghi, pure nulla o ben poco hanno parlato delle monete, e zecche Siciliane. Ma questa omissione è scusabile, perchè i forestieri non han quegli ajuti che hanno i nazionali nel proprio paese.

Ecco intanto squarciato quel denso velo, che ha celato sinora la parte più essenziale delle monete Siciliane: velo assai pregiudiziale alla scienza numismatica de' bassi tempi. Conciosiacchè valutando le monete de' primi secoli della monarchia secondo l'odierno computo della Sicilia si cade in errori enormissimi. Così, a cagion d'esempio, li seicento Schisati, che l'antipapa Anacleto pretese dal re Ruggiero per l'investitura della Sicilia (1), se si valutano secondo l'antico e vero valore, formano la somma di 960 ducati Napoletani, ma secondo il computo Siciliano importano ducati 480. Così il censo de' cinquemila tarì, che nel 1160 su imposto a Caltagirone per la concessione di

Aaa

<sup>(1)</sup> Vedi la bolla di Anacleto negli annali del Baronio an. 1130. Due anni fa l'erudito Sig. Marchese di Breme inviato straordinario del re di Sardegna alla nostra corte, per bene intendere questo punto di storia, volle essere informato del valore dello Schifato. Io gli seci sapere, che valeva otto tarì d'oro, siccome si ricava da una carta del 1269 del re Corrado II, o sia Corradino, inscrita nella cronica di Leone Urbevetano pubblicata dal dottor Lami nel tom. IV pag. 271. Delic. eruditor: Patroni videlicet navium, vel lignorum pro mercatoribus O corum mercationibus, de toto carico navigii vel ligni schifatum unum auri, qui est tareni osto auri, semel tantum selvere debeant. Il canonico Schiavo nella sua opera più volte citata pag. 258 rapporta un privilegio di Giacomo re di Sicilia satto in Messina nel 1288, in cui appurisce, che anche in quell'ilola lo Schifato correva otto tari d'oro. Ma si è già provato, che il tari d'oro, valeva due carlini nostrali: dunque ogni Schifato corrispondeva a sedici carlini Napoletani.

Zatica (1), ragguagliato al giusto valore, importa 1000 ducati, ma secondo il computo de' Siciliani importa 500. Le trecento once d'oro, che Rederico II raccolse dalle terre della badia di S. Benedetto a fin di sloggiare i Saraceni dalla Sicilia (2), al conto nostro fanno ducati 1800, ma al conto Siciliano fanno 900. Le cinquecento once d'oro, che lo stesso Federico II lasciò in testamento alla cattedrale di Palermo, pro salute, come disse, animarum parentum nostrorum, & nostrae (3), calcolate al vero valore ragguagliano 3000 ducati, ed al conto de' Siciliani non ne fanno più di 1500. Questi, come ognun vede, sono sbalzi, che alterano tutta la storia, e le memorie di que' tempi. Lo stesso dicasi delle finanze, delle decime, delle dotazioni, de' contratti, e delle rendite di tanti feudi, chiese, badie, priorati, e padronati stabiliti in quell'isola dai principi Normanni, Svevi, ed Angioini. Indagato ora l'effertivo valore di quelle monete, s'intenderanno meglio infiniti punti di storia di que' tempi: e le antiche monete di questi due regni, che sinora si sono riputate diverse e separate, potranno da oggi innanzi riguardarsi come comuni, e promiscue; in modo che ad illustrar le medesime, potremo noi servirci de' monumenti Siculi, e potranno i Siciliani valersi a man franca de' nostri. Io non presumo per questa scoperta, qualora meritasse l'approvazione del pubblico, arrogarmi la gloria, che si guadagno Cicerone, allora quando scoprì a' Siciliani lo sconosciuto sepolero del loro Archimede: bramo soltanto, che le due Sicilie, che sioriscono oggi giorno sotto il principato di un comune PADRE, quasi due sorelle diansi amorevolmente le mani, ed a vicenda si ajutino nel coltivare le scienze, e nell'illustrare le patrie loro antichità.

<sup>(1)</sup> Memorie per la ftor, letter, di Sicil. T. I. P. V. pag. 49.

<sup>(2)</sup> Riccardo da Sangermano Cron. an. 1223.

<sup>(3)</sup> Caruso Biblioth. Histor. Sicil. Tom. 11 pag. 669.

# INDICE

## DELLE DISSERTAZIONI.

Discorso istorico preliminare di Pietro Napoli- Signorelli.	Pag.
- Fondazione della Reale Accademia.	XXI
- Storia dell' Accademia.	XXIII
- Lavori proposti alle quattro classi.	ivi
- Tentativi eseguiti prima de' tremuoti dell' anno	
1783.	XXXIV
-Tentativi eseguiti dopo de' tremuoti.	LXXVI
Dissertazioni e Memorie Matematiche.	I
I. Risoluzione di alcuni problemi ottici del Socio	•
Don Niccolò Fergola letta nella prima assemblea	
nel 1780.	ivi
II. Sopra le Caustiche di Girolamo Saladini	
Canonico Bolognese Accad. Pensionario comunicata	
all' Accademia l' anno 1781.	15
III. Compasso Sferico eseguito dal Sacerdote	- ,
Giampaolo Anderlini di Bologna colla direzione	
del Can. Saladini, Memoria trasmessa alla R. A.	
nel 1782.	39
IV. Sulla Stadera universale, Dissertazione del	37
Can. Saladini presentata alla R. A. nel 1783.	47
V. La Vera Misura delle Volte a spira, Dissertazione	-17
del Sig. Fergola letta nel 1785.	65
VI. Del salire dei corpi in aria per la loro	٠,
specifica leggerezza, Lezione del Can. Saladini	•
comunicata alla R. A. l'anno 1784.	85
Aaa a	,

372	
VII. Nuovo Metodo da risolvere alcuni problemi	
di sito e posizione del Sig. Fergola proposto	
alla R. A. nel 1786.	119
VIII. Continuazione del medesimo argomento di	_ /
D. Annibale Giordano recitato nella R. A. nel	
1786.	139
IX. Nuove Ricerche sulle risoluzioni dei problemi	
di sito e posizione del Sig. Fergola presentate	
alla R. A. nel 1787.	157.
Dissertazioni della II Classe.	179
X. Osservazioni Fisiche concernenti l'Elettricità,	•
il Magnetismo e la Folgore del Pensionario D.	
Giuseppe Saverio Poli lette nella R. A. nel 1784.	ivi
XI. Del Moto reciproco del sangue per le interne	
vene del capo Parte I Meccanismo del Pensionario	
D. Domenico Cotugno letta nella R. A. l' anno	
1782.	565
XII. Osservazioni sul Cytinus, sulla Stellera	
passerina e sulla Ceratonia del Pensionario Don	
Angiolo Fasano comunicate alla R. A. nel 1781.	235
XIII Saggio Geografico - fisico sulla Calabria	
Ulteriore del medesimo Sig. Fasano letto nella	
R. A. nel 1785.	251
Mezzana Antichità IV Classe.	313
XIV. Illustrazione delle Monete che si nominano	
nelle Costituzioni delle due Sicilie del Socio D.	•
Domenico Diodati letta nella R. A. in due	
assemblee nel 1784 e 1786.	ivi

## FINE.

```
GORREZIONI:
           ERRORI:
                      Nel Discorso e nella Storia
         verf.
               profesizioni
                                           profcrizioni
                                           co' prilmi
          30 co' primi
XIII,
               rimeff.
                                           rimeffi
LXIII,
          14
                                           illius
LXXVI,
              illus
          6
          in fine al richiamo
LXXX,
                                           Tal
                V Vicino
XCV.
                accademiecha
                                           accademiche
          26
                                           del mondo. Graami
                del mondo, Graam
XCVI,
          15
                                           Hercell
                Hechell
ivi
                         Nelle Differtazioni
               sfavillnnti
                                           sfavillanti
          10
    7,
               \sqrt{(a^2+2ab+2abc-c^2)}
                                             V(a+2ab+2bc---c
                                            V(a2+2ab+2b6---;2)(
          19 2\sqrt{(a^2+2bc-c^2)}
                                            armilla
               armilia
          22
     9,
                                            二少
         16
    12,
    13, 7,8 sarà direttamente come il
                                            sarà, essendo costante il di
                                               lei semidiametro, inversa-
                  di lei semidiametro, ed
                                               mente
                  inver samente
                                             ナッコ
    28,
                +1=
           17
                                             =+
           18
               二十
                                            APB.
               ABP
            7
    30,
                                            proporzionalità
               proporzionalità appunto
    51,
                                            pa:pa:: Md: Md, dal che
                                            ne viene p:p':: d':d', quella
                                             proporzione appunto
    65, nel titolo 1783
                                            1785
         I \sqrt{\frac{p^2x^2}{n^3}} + q

I y \sqrt{\frac{a^3q^3 + p^2X^2 + p^2y}{a^3q^4 + p^3y^2}}
                                            V\left(\frac{p^3x^3}{n^3}+q^3\right)
            13 diminuisca
    88,
    96, II =\frac{mcds}{z}=
   107, \quad 7 \quad \frac{m-nQ}{Q}
```


## ERRORI.

#### CORREZIONI.


	. 4	RICORI.	CORRECTORIA
Pag.	verf.	•	
	9	$\frac{Qn+m}{Q}$	$+\frac{m-mQ}{Q}$
		eke—es—k	$e^{ke^{-cs}-k}$ $\sqrt{(na-me^{cs})}$
		$\sqrt{na-me^{\epsilon s}}$	√ (na-me <sup>c, s</sup> )
161,	33	Evolendo	E volendo
237,	22	apicem. stili	apicem stili
C	25	Infundibuli forme	Infundibuliforme
238,	I	Tabulato campanulatuno	Tabulatocampanulatum
c	24	quadripartius	quadripartitus .
E	32	Oscuris .	oblcuri <b>s</b>
242 .	30	abbifognina	abbifognino
247,	19	quadripartus diu	quadripartitus: diu
	•	quadripartus diu virescentes . Herma- pbroditis .	virescentes, hermaphroditis
256,	9	fna	fuo
285,	19	globette	glebette
286,	19	non pik	non giù
288,	12	Musciddi ,	Muscieddi
:		e così altrove	
		occedata	acciecata
306,	18	designare	di legnare
320,	I	ideo	idem
ivi, v.	ult.	436 B	475 C
341,	20	tantam poens	tantum poena
342,	<b>7</b> ·	ban	ha

-

• . . 1 • • • . , • *.* : • ·




• . 



. • • • ٠. • ,

. : : : :





. • • • -•

. • . . •

• ì , -

•

.

:

.

• • f

.

• , • .

:


\*\*\*

صلز

•

•

. · . . 



• .

· -. , 

V.

•

.

•

₹.

•


. • |

Q

.

.

. . .



. i • 

V-7...

•

•

.

:

•

. • 1

• · • - ' •

. . . .


· ·

.

•

.

.



• • .

